

דוֹתַן-פּרופּלַנט® | Dotan-Proplant | דוֹתַן - בּרֹבְלַנְט

תרכיז נוזלי - S.L

קוטל פטריות סיסטמי מדביר מחלות הנגרמות ע"י פטריות מקבוצת הפיקומיצטס



לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"ם: לא מסווג

מיוצר ע"י: Arysta LifeScience

Benelux Sprl בלגיה

מכיל: Propamocarb- HCL 722 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 98/ה"צ/1530

אופן היישום:

ריסוס נוף להדברת מחלות כמפורט בטבלה

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ריכוז לד')	נפח תרסיס ל"/ד' (התאם לגודל הנוף)	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
תפוח אדמה	כימשון	150**	15-30	14	יש לשים לב טבלת השילובים
עגבנייה לתעשייה		300	30-50	3	
עגבניית מאכל					
מלפפון, מלון	כשותית הדלועיים	300	30-100		טיפול מניעה לפני הופעת המחלה מדי 4-12 ימים. לאחר הופעת המחלה בנגיעות נמוכה מדי 10 ימים.
חסה	כשותית החסה	200-300	30-50	14	
כרוב, כרובית, ברוקולי, קולורבי	כשותית המצליבים	200-300		3	

* הריסוסים יינתנו בצורה שתבטיח כיסוי מלא של נוף הצמחים

שילובים:

להדברת כימשון יש לשלב דותן עם אחד התכשירים הבאים. יש ליישם רק בגידולים המאושרים מטה, וע"פ הוראות התווית של אותם תכשירים. **בתפ"א, יש לשלב דותן עם באנג'ו פורטה ת.ר (100 סמ"ק/ד') או קריאל פלוס ג.ר (60 סמ"ק/ד') או סימוקסי טופ או ספינקס סופרה. בריסוס אווירי ניתן לשלב רק עם באנג'ו פורטה (נפח תרסיס 5 ליטר לדונם) ** בעגבנייה לתעשייה, יש לשלב דותן עם באנג'ו פורטה ת.ר (100 סמ"ק/ד') או קריאל פלוס ג.ר (60 סמ"ק/ד') או סימוקסי טופ או ספינקס סופרה. בעגבניית מאכל, יש לשלב דותן עם סימוקסי טופ או ספינקס סופרה.

הערות:

לריסוס מהאוויר יש לקבל היתר מהשירותים להגנת הצומח, ויש לפעול לפי ההוראות הבאות: לא יפזר אדם, במישרין או בעקיפין, רעל או כימיקל מזיק מכלי טיס
- מעל בית או במרחק של 120 מטרים ממנו;
- מעל דרך או במרחק 12 מטרים ממנה;
- כאשר הרוח נושבת מכיוון השטח המיועד לריסוס לכיוון בית או דרך; כיוון הרוח ייבדק לפני הריסוס ובמהלכו על ידי אבוקת עשן דולקת בשטח.

הערה: למרות שעד כה לא נמצאו השפעות פיטוטוקסיות של התכשיר במינוני הגמעה המומלצים, הרי בשל הרב-גוניות הרבה של הגידולים, הזנים ושיטות הגידול, אין אפשרות לערוב לבטיחות התכשיר בכל מקרה. לכן רצוי שהמגדל יבצע ניסוי מוקדם בצמחים בודדים לפני השימוש בדותן.

אופן היישום:

טיפול הגמעה למניעת פיתיום (מק-שורש)

טיפול הגמעה יש לעשות כאשר הקרקע רטובה

הגידול	מועד הטיפול	המינון	אופן הישימה	הערות
מלפפון	טיפול קרקע עם הזריעה או לאחר ההצצה או לאחר השתילה	0.3 סמ"ק לשתיל	בשליש האחרון של ההשקיה	במקרה והנגיעות נמשכת יש לחזור על הטיפול כעבור 2-4 שבועות.
בגוניה, בשמת, גיפסנית, פטוניה, חלבוב, פפרומיה	חיטוי המצע לפני מילוי כלי גדול	300 סמ"ק למטר מעוקב	פיזור מתוך 01 ליטר מים על גבי מצע הערבוב וגידול	יש לבצע את הטיפול כאשר המצע לח ולהקפיד על ערבוב טוב שלו לאחר פיזור התכשיר.
	טיפול קרקע לפני שתילה	115 ס"מ למ"ר	הגמעה בתוך 2-4 ליטר מים למ"ר	יש לחזור על הטיפול אחת ל-3 שבועות
	על גבי ייחורים וצמחים קיימים	תמיסה בריכוז 0.3%-0.15%	הגמעה להרווית קרקע בעומק השורשים	
	על גבי צמחים בעציצים	100 סמ"ק של תמיסה בריכוז 0.15% לעציץ בקוטר 10 ס"מ	הגמעה לפני השתילה להרווית הקרקע	יש לחזור על הטיפול אחת ל-3-4 שבועות.