

סקולאר® | Scholar | سکولار

תרכיז רחیف S.C

קוטל פטריות בטיפול אחר קטיפ בהדרים, אגס, תפוח, קיווי, אפרסק, נקטרינה, מנגו, רימון, גזר ואבוקדו למניעת הדבקת מלפפון בריקבון כתר הדלועים (פוזריום)

מכיל: Fludioxonil 230 g/l

דרגת רעילות: IV - מסוכן

מס' או"ם: 3077

מיוצר ע"י:  syngenta

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1925/ה"צ/08



לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	הפגע	מינון/ריכוז (% מנפח)	מינון בח"מ (PPM)	שיטת היישום	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיפ (ימים)
הדרים בבית האריזה לפני שלב הדינוג	עובש כחול (<i>Penicillium italicum</i>)	0.2% (2 ליטר ל-1 מ"ק מים)	500	טבילה במי התמיסה לאחר קטיפ טרם האחסון. יש לדאוג להפעיל את בוחש התמיסה במשך כל זמן הטבילה. (1) יש לטבול למשך 30 שניות ולאחר מכן לייבש את הפרי/ ירק (או לייבש בשמש)	אין להשאיר את הפרי/ ירק המטופל בשמש מחשש להתפרקות החומר. אין להשתמש בתמיסת הטבילה מעבר ליום עבודה אחדף	
תפוח, אגס, קיווי, אפרסק, נקטרינה (טיפול בבית האריזה)	עובש כחול בנשירים (<i>Penicillium spp</i>) עובש ירוק (<i>Penicillium digitatum</i>)	0.1% (1 ליטר ל-1 מ"ק מים)	250			
רימון (טיפול בבית האריזה)	עובש ירוק (<i>Penicillium digitatum</i>) עובש אפור (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.2% (2 ליטר ל-1 מ"ק מים)	500			
מנגו (טיפול בבית האריזה)	ריקבון העוקץ (<i>Lasiodiplodia theobromae</i>)	0.13% (31 ליטר ל-1 מ"ק מים)	300			
אבוקדו (טיפול בבית האריזה)	ריקבון עוקץ (<i>Lasiodiplodia theobromae</i>)	0.07% (007 סמ"ק תכשיר ל-1 מ"ק מים)	160			
גזר (טיפול בבית האריזה)	קשיונה גדולה	0.1% (0001 סמ"ק תכשיר ל-1 מ"ק מים)	250			
בטטה (טיפול בבית האריזה)	רקבון מיימי (<i>Rhizopus stolonifer</i>)	0.1% (0001 סמ"ק תכשיר ל-1 מ"ק מים)	250	טיפול בהתזה במערך האריזה לאחר תקופת האחסון.		
מלפפון	ריקבון כתר הדלועיים (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.06-0.04 סמ"ק לשטיל 60-40 סמ"ק (לכל 1.000 שתילים)		בהגמעה לבית השורשים ⁽²⁾	3-5 טיפולים בהתאם לעונה ולרגישות הזן	7