

מאסטרקופ® | Mastercop | מאסטרקוב

תרכיז רחיק C.S

להדברת מחלות במטעים ובירקות



לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082
מיוצר ע"י: Ingenieria Industrial
מקסיקו (מקב' אדמה)

מכיל: copper sulfate pentahydrate 21.6% w/w
אקוויוולנטי ל-5.5% נחושת מתכתית
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4371/ה"צ/2017
רישיון השירותים להגנת הצומח חקלאות אורגנית: 7565/ה"צ/2022

אופן היישום:

הגידול	הפגע	ריכוז/מינון (% או סמ"ק/ד')	נפח תרסיס ⁽¹⁾ (ל'/ד')	ימי המתנה לפני קטיף (ימים)
דובדבן	כתמת (צרקוספורה) (יעילות בינונית)	0.25%	100-200	7
זית	עין טווס		100-400	
הדרים	ריקבון חום, כתמי חלפת		5-40	
תפוח אדמה	כימסון	300	30-120 בהתאם לגודל הצמח	
עגבנייה		300 בנפח תרסיס של 100 ל'/ד', יש לרסס במינון 0.3%	300-80 בהתאם לגודל העץ	
מנגו	השחרה חיידקית	0.25%	200-80 בהתאם לגודל העץ	
אגס ⁽²⁾	חירכון	0.1%	130-50	
גפן	כשותית הגפן	0.25%	60-30	
ברוקולי	חלפת המצליבים	250	60-180	
אבוקדו ⁽³⁾	מללת (בוטריוספורה) הגורמת להפלת חנטים	0.25% שני ריסוסים עוכבים בהפרש של 14 יום ⁽⁴⁾		

שילובים:

רק בהתאם להנחיות התווית של התכשיר, ורק בגידולים ובחומרים המפור-
טים מטה:

הדרים – מאסטרקופ 0.25% עם תיוביט גר בריכוז 0.5-0.75% בנפח
תרסיס 300-500 ל' לדונם, למניעת ריקבון חום ולטיפול
באקרית חלודה.

1. נפח תרסיס יקבע בהתאם לגודל הצמח, יש להקפיד שהריסוס יגיע לכל חלקי הצמח.
2. בתנאים מסוימים עלולים להיווצר סימני חספוס על פירות אגס
3. באבוקדו נוסה רק בזני האס ואטינגר.
4. יישום ראשון 50% פריחה, יישום שני ב- 100% פריחה (בצד המקדים של העץ, בכל
אשכול פריחה יש פרחים פתוחים).
אין ליישם בריכוז גבוה מ- 0.25%.