



סימשפָּר 20® | Cimeshupar 20®

תרכיז מתחלב C.

הדברת מזיקים בכוותנה, בחיטה, במטע, בגפן, בירקות ובפרחים



דרגת רעלות: III - מסוכן לבリアות

מכיל: Cypermethrin 200 g/מ"ל

מספר או"ם: 3082

מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

רישיון השירותים להגנת הצומח מט': 01/ה"צ/1642

לפניהם יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	המזיק	רכיב או מינון (%/סמ"ק/ד')	טיפול אחרון לפני האסיף (ימים)
គוותנה	בוגרי כינמת עש הטבק, זחל הלקט הורוד	75	3
תפוח	ציקדות	0.05%	21
גפן	זבוב התסיסה, עש האשכים	0.05%	21
תפוח אדמה, גזר	בוגרי כינמת עש הטבק	50-75 סמ"ק בリスト אוווי 30-50 סמ"ק בリスト קראק	21
עגבניות	הדברת כינמת עש הטבק מנייעת העברה של וירוס צחובן האמיר	0.15% בנפח תריסים של 50-20 ל"ד/ד', כנדרש לכיסוי מלא של גוף הצמחים	14
בצל, שום	תריפס הטבק	50	21
מלפפון, מלון (בשדות גלויים בלבד)	cinemat עש הטבק, תריפס הטבק	50	14
חציל, פלפל, קישוא (1)	תריפס הטבק, cinemat עש הטבק	50-30 סמ"ק לפי גודל הצמחים	14
חיטה	צՐעת הדגן	75	30
פרחים: עדען, ציפורן(2)	תריפס, זבל הפרחים	50	3
גרברה (2)	תריפס, כינמת עש הטבק	50	3
לייטריס (2)	תריפס	50	3
רוזקס (2)	תריפס	50	3

(1) בחלקות בשלבי הצאה, בעונה בה יש חשש להעברת הוירוס, מרסטים החל מהצעת הנבטים הראשוניים ועד שבועיים לאחר הצעה, מדי יומיים. בחלקות שתולות, מטפלים מיום השטילה, ואם אין ממטרות, חוזרים על הפעולה מיד לאחר כל המטריה. משבועיים לאחר הצעה או שתילה, וכן בחלקות מבוגרות, מטפלים מדי 3 ימים.

(2) בפרחים בשל ריבוי זנים, מומלץ לבדוק לפני השימוש, את בטיחות התכשיר לגבי זנים חדשים.

הערות:

(1) ניתן לרסט את התכשיר בリスト אוווי ובצד קראק, בריסוס נגירה או בנפח נמוך, לתכשיר לחץ אדים נמוך והוא אינו מושע ברקמות הצמחים, אך יש להקפיד על כיסוי מיטבי של הצמח. (2)リストים חזרים בסימשפָּר 20 עלולים לגרום לריבוי אקריות בגידולים המטפלים ובגידולים שכנים, אפילו אם ידועים כפונדקאים מוגדים של מזיקים אלה.

שילובים:

אין לשלב עם חומרים נוספים