

מאבריק® | Mavrik | مافريك

תרכיז שמן במים E.W



מכיל: Tau-fluvalinate 240 g/l

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות

מס' או"ם: 3082

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4030/ה"צ/2011

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	הפגע	הריכוז (%)	נפח תרסיס (ל"/ד') ¹	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
מלפפון ²	תריפס הטבק ³	0.12%	45-80	3
אפרסק, נקטרינה, שזיף	מש' הצידקניים (ציקדות), אפיד הכותנה (כנימות עלה הדלועיים), קמבית השקד (חיפושית הקליפה), פרי זבוב ים תיכוני (זבוב הפירות הים תיכוני)	0.05%	80-300	14
	תריפס ⁴	0.1%	80-200	
משמש	קמבית השקד (חיפושית הקליפה)	0.05%	80-300	
שקד ⁵	צרעת השקד, מש' הצידקניים (ציקדות), אפיד הכותנה (כנימות עלה הדלועיים), קמבית השקד (חיפושית הקליפה)			
רימון	מש' הצידקניים (ציקדות), אפיד הכותנה (כנימות עלה הדלועיים)			
תפוח עץ ⁵	עש התפוח זבוב הפירות הים תיכוני	0.05%	80-300	10
	חשנית הורדניים (חדקונית) ⁶	0.05%	80-200	
גפן	מש' הצידקניים (ציקדות)	0.05%	70-150	7
הדרים	מש' הצידקניים (ציקדות), אפיד הכותנה (כנימות עלה הדלועיים)	0.05%	100-400	14
	פסילת ההדר האסייתית	0.05% בשילוב עם שמן EOS בריכוז 1%	80-300	
מנגו	תריפס הקיקיון	0.1%	50-200	יישום לאחר קטיף ולפני הפריחה

1 - נפח תרסיס יקבע בהתאם לגודל הצמח, יש להקפיד שהריסוס יגיע לכל חלקי הצמח.

2 - יישום בודד בעונה.

3 - מומלץ להתחיל לרסס בנגיעות נמוכה של עד חמישה פרטים לעלה.

4 - מועד היישום: בסוף הפריחה ובתחילת החנטה.

5 - ניתן ליישם עד פעמיים בעונת גידול. בין הריסוסים יש ליישם שני טיפולים בתכשירים מקב' כימית שונה להדברת אותו צירוף גידול-פגע.

6 - מועד היישום: בשיא פריחה או בשלב נשירת עלי הכותרת.

שילובים מותרים:

רק בהתאם להנחיות התווית של התכשיר, ורק בגידולים ובחומרים המפורטים מטה: - אפרסק, נקטרינה, שזיף, שקד וגפן – ניתן לשלב מאבריק עם אפלורד.

בשקד ניתן לשלב מאבריק בריכוז 0.05 % עם אזימוט בריכוז 0.03%.