

קוהינור® | Kohinor | کوہینور

תרכיז רחיף S.C
תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082
מיוצר ע"י: אדמה מכתשים בע"מ

מכיל: Imidacloprid 350 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 05/ה"צ/1833

אופן היישום:

גידולי שדה, כותנה וירקות

לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

הגידול	מזיק	מינון (סמ"ק/ד")	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת האפון, כנימת הדלועיים.	30	ריסוס	30
תירס מתוק	כנימת עלה התירס	40	יישום דרך מערכת טפטוף במהלך השליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות	30
תות שדה	כנימות עלה הדלועים ואפרסק	50	בהגמעה בתקופת הפריחה	14
מלון, אבטיח	כנימות עלה הדלועיים	40	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ-2 טפולים בעונה.*	30
מלפפון, קישוא	כנימת עש הטבק	100	מלפפון וקישוא: בשטח גלוי וחסוי. אבטיח: בשטח גלוי בלבד.	14
עגבניה, פלפל	כנימת עש הטבק	100	בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ-2 טפולים בעונה	3
	כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת הדלועיים	40		
כותנה	כנימות עלה: כנימת הדלועיים, כנימת האפון, כנימת הקטניות	40	יישום דרך מערכת טפטוף במהלך השליש השני של ההשקיה במערכות מנותקות.	3
	כנימת עש הטבק	100		
גזר	פסילת הגזר	100	ריסוס	40

* דלועים שקיבלו טפול זרעים בגאוצ'ו יש לטפל רק פעם בעונה.

קוהינור® | Kohinor | كوهينور

הדרים ומטעים

הגידול	מזיק	מינון (סמ"ק/ד")	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
הדרים*	עש מנהרות ההדר	1	במשתלות הדרים. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.	30
		3-2	לעצים צעירים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.	
		10-4	לעצים בוגרים בפרדס, המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.	
תפוח*	כנימות עלה: כנימת התפוח הירוקה, כנימת הדלועיים, כנימת הספיראה	0.05%	ריסוס עד נגירה.	30
		1	לשתול במשתלה בהגמעה בשליש השני של ההשקיה.	
		10-2	לעצים בוגרים במטע בהתאם לגודל העץ.	
	כנימת הדם	10	טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.	
	ליטוקולטיס	5-1	לעצים במטע עד גיל 4 שנים, המינון בהתאם לגודל העץ.	
אגס*	אפנוסטיגמה	10-5	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה עם תחילת הלבוב.	30

*פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה.
שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.

מטעים וגפן

הגידול	מזיק	מינון (סמ"ק/עץ)	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
גפן*	כנימת קמחית הגפן	2-1 סמ"ק לגפן	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה עם תחילת הלבוב. רמת המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות.	3
	ציקדות	0.5-0.3 סמ"ק לגפן		
אפרסק, שקד, שזיף*	ציקדה ירוקה	0.05%	ריסוס עד נגירה	30
		1 סמ"ק לעץ	לשתיל במשתלה טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב. ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.	
		10-2 סמ"ק לעץ	המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה.	

>> השמך מעמוד הבא

קוהינור® | Kohinor | كوهينور

מטעים וגפן

הגידול	מזיק	מינון (סמ"ק עץ)	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
פקאן*	כנימת הפקאן הצהובה	0.05%	ריסוס עד נגירה.	40
		15 סמ"ק לעץ מבוגר	בהגמעה ליד הטפטפות או מתזים ואח"כ יש לבצע השקיית החדרה.	
זית*	כנימה אדומה	10 סמ"ק לעץ	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה בסתיו או באביב	30
בננה*	כנימת הפנטלוניה	100 סמ"ק לדונם	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה. יש לתת את החומר כאשר במטע 20% מהאשכולות מגיעים לפריחה, ובתנאי שנצפתה נוכחות משמעותית של הכנימה במטע, בהתאם להנחיות המדריך האיזורי.	7
תמר*	ציקדת הדבש	5 סמ"ק לעץ	בהגמעה בשליש השני של ההשקיה בסתיו או באביב.	14

*פעילות התכשיר במטעים מתחילה 10-14 יום אחרי היישום בהגמעה.
שטח המיועד לטיפול בהגמעה צריך להיות נקי מעשבים.

פרחים

הגידול	מזיק	מינון	הערות ושיטות היישום	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
פרחים וצמחי נוי*: חרצית, גרברה, ורוניקה, היביסקוס, ורדים, לימוניום יפני, סולידסטה, סולידגו, חלבוב הדור, ליזאנטוס, גיפסנית, אגרטום	כנימת עש הטבק	100 סמ"ק/ד'	הגמעה תבוצע במהלך השליש השני של ההשקיה. אין להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ובמרווח שאינו קטן מחודש. מיועד לגידולים בקרקע בלבד.	3
	כנימות עלה: כנימת הדלועיים, כנימת האפרסק, כנימת הספיראה.	40 סמ"ק/ד'		
פרח שעווה	צרעת העפצים	3 סמ"ק/צמח	-	
נרקיס	זבוב הנרקיס קטן וגדול.	0.05%	טבילת הפקעות לאחר איסוף בתמיסה בעלת ריכוז של 0.05% במשך 10 דקות.	
דקל קנרי	חדקונית הדקל האדומה	0.2% השילוב עם קרטה מקס 0.3%	יש ליישם בהגמעת כתר בנפח 15-20 ליטר לעץ	

* בשל מגוון הזנים הרב של הפרחים הנ"ל אין לנו אפשרות לבדוק בטיחות התכשיר לכל זני צמחים.
אם טרם התנסית בתכשיר בזנים השונים, יש לנסות תחילה על מספר מצומצם של צמחים.

שילובים:

בתפוז"א ניתן לשלב עם מנצידן, אודאון. בדקל קנרי, ניתן לשלב קוהינור 0.2% עם קרטה מקס 0.3%.