

פריורי אקסטרה® | Priori Xtra | بريوري اكسترا

תרכיז רחיק - S.C

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטעים



syngenta

מכיל: conazole 80 g/l וקטל רעילות: IV - מסוכן

3082 :אז"מ xystrobin 200 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס' 07/ה"צ/1908

אופן היישום:

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ד") בנפח קטן (עד 100 ל"ד")	ריכוז (%) בריסוס נגירה (מעל 100 ל"ד")	ריסוס אחרון לפני קטיפה (ימים)
חיטה, שיבולת שועל	מיני חלדונות (עלה, צהוב), ספטוריה, קימחון	30		גרורים 60 מספוא 30
	כתם עדשתי (הלמינטוספוריום)	30		7
חמנית	קימחון החמנית, חילדון החמנית	25		60
עגבניה ⁽²⁾ בשדה פתוח בלבד	קמחונית	40	0.04	10
עגבניה, חציל	קמחונית	100 בהגמעה ⁽³⁾		3
אפרסק, שזיף יפני, שזיף אירופאי, שקד	חלדון הגלעיניים		0.03	21
אפרסק, נקטרינה	קימחון האפרסק		0.03	21
טרגון	חלדון הטרגון	40		17
שום	חלדון השום, כמשון שקעים (סטמפיליום)	25		15

(1) בתירס נבדק בזנים רויאלטי וג'ובילי. מוגבל ליישום אחד בעונה.

(2) בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד.

(3) יישום ראשון לא לפני 40 יום משתילה ולא לפני התחלת חנטה. עד 2 ישומים בעונה בהפרש של 40- יום. אין ליישם במצע מנותק או בעת עקה (מים, חום, אור וכיו"ב). בערבה יש להמתין לפחות 10 ימים לאחר הסרת רשתות צל). יש לטפל לפני הופעת המחלה. כמו כל תכשיר המיושם בקרקע, חשוף פריורי אקסטרה להתפתחות תופעת "פרוק מיקרוביאלי מואץ". כדי למנוע התפתחות תופעה זו מומלץ לא לטפל ברציפות בפריורי אקסטרה.

נבדק בזנים:

עגבניה - 1125, 1912, 540, איקרום, אנטולה, 8892, ניקוס.

חציל - סינטיה, קלאסיק, 1726.

בזנים שלא נבדקו, יש לבדוק בטיחות על קטע קטן לפני הישום המסחרי. אין לשלב עם עוד תכשיר.

יש להזהיר למערכת טפטוף מנותקת אוויר באמצעות משאבת דישון לאורך 2/3 האחרונים של השקיה בת 4-6 מ"ק/ד'.

בסיום היישום יש לשטוף את המערכת בו-קוב' מים.