

אינסגר® | Insegar | إنسجار

גרגרים רחפים W.G
קוטל חרקים בעצי פרי ובגפן



דרגת רעילות: IV - מסוכן

מס' או"ם: 3077

מיצור ע"י: **syngenta**

מכיל: Fenoxycarb 25%

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4663/ה"צ/22

לפני השימוש יש לקרוא את
ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

אופן היישום:

הגידול	המזיק	מועד הטיפול	הריכוז	נפח תרסיס (ל'/ד')	טיפול אחרון לפני קטיף/בציר (ימים)
תפוח: בזנים המקדימים (לבלב (כדוגמת ענה)	פרלטוריה	בחודש מרס, בצמוך לבקיעת הביצים וחודש אח"כ	0.15%*	100-200 לפי גודל העצים	21
אגס, תפוח למעט בזנים המקדימים לבלב	פרלטוריה	במועד המומלץ לריסוס בשמן חורפי*	0.15%*	100-200 לפי גודל העצים	21
	עש התפוח	לפי לכידת בוגרים במלכודת הפרומון**	0.1%	150-200	21
	ליתוקולטיס	בסף הנגיעות המומלץ לטיפול	0.025%	100	21
	סם הנמר	בחודש מאי ועד לגמר פעילות המזיק	0.1%	150-200	21
אגס	פסילת האגס	במועד המומלץ לריסוס בשמן חורפי* ועד גמר פעילות המזיק	0.1% *	150-200	21
גפן	כנימת הפוליוניריה	עם הופעת זחלים בדרגה 1 על שיחי הגפן	0.15%	עד נגירה	8

* בדבר שילוב בשמן חורפי או בשמן קייצי בהתאם לצורך יש להיוועץ במדריך ולהתעדכן עפ"י ההמלצות העונתיות התקפות. בכל מקרה, עקב מגוון סוגי השמנים יש לבצע בדיקה מקדימה בקנה מידה מצומצם לפני שילוב אינסגר בשמנים חורפיים או בשמנים קייצים.

** השימוש מוגבל למטעים שבהם מוצבות מלכודות פרומון להדברת דור ראשון מטפילים מהגיע העץ לשלב פקע ורוד, כאשר מוציאים לכידות במלכודות פרומון. הטיפול הבא עם הופעות דור חדש במלכודות. במטע הידוע כנגוע בעש או במטעים שבהם נמצאה לכידה רבה של בוגרים לפני הופעת פקע ורוד, יש לטפל בתכשיר קוטל זחלים שבוע לאחר הטיפול באינסגר: ניתן לרסס אינסגר עד 3 פעמים בעונה בלבד.

שילובים:

בתפוח - ניתן לשלב אינסגר עם מרפאן.

באגס - ניתן לשלב עם מרפאן.

כפוף להוראות, למגבלות ולאמצעי הזהירות המפורטים בתווית שלהם.