

**אינסגר ®  
Insegar | إنسيجار**



**ORGANIC PESTICIDE  
W.G.  
КОУТЕЛ ЧОРКІМ БУЦІ ФРІ ВБАГЕН**

**דרגת רעליות:** V - מסוכן

**מס' או"ם:** 3077

**מיוצר ע"י:** syngenta

**מכיל:** Fenoxyxcarb 25%

**רשיון השירותים להגנת הצומח מס':** 22/ה"צ/4663

**כללי:**

איןסגר קווטל את החרקים הרגיסטרים לו על ידי שיבוש תהליכי הגידלה, מניעת המעבר לדרגות התפתחות מתקדמות ופגיעה בפוריות הבוגרים והביצים. איןסגר פועל במגע ובבליעה, לתכשיר יש כושר תנועה טרנסלמינריית בצמח (אך הוא אינו סיסטמי). איןסגר אינו פוגע באקריות עורפות ובצרעות טפיליות, ולכן הפרת המאזן הביולוגי מעטה יחסית.

## אופן היישום:

הגידול	המזיק	מועד הטיפול	הרכico	נפח טרסיס (ל'/'ד')	טיפול אחרון/ בציר (ימים)
תפוח: בזנים המקדימים ללבלב (כדוגמת ענה)	פרלטoria	בחודש מרס, לצמוך לבקיעות הביצים וחודש א'ח'כ	*0.15%	200-100 ל'פי גודל העצים	21
	פרלטoria	במועד המומלץ לרייסוס בשמן חורפי*	*0.15%	200-100 ל'פי גודל העצים	21
	עש התפוח	לפי לכידת בוגרים במלכודות הפרומן**	0.1%	200-150	21
	ליותוקולטיס	בסך הנגיעהות המומלץ לטיפול	0.025%	100	21
	סם הנמר	בחודש מאי ועד לגמר פעילות המזיך	0.1%	200-150	21
	פסילת האגס	במועד המומלץ לרייסוס בשמן חורפי* ועד גמר פעילות המזיך	* 0.1%	200-150	21
	גפן	עם הופעת זחלים בדרגה 1 עד גנייה הגפן	0.15%	עד גנייה	8

\* בדבר שילוב בשמן חורפי או בשמן קייצי בהתאם לצורך יש להיוועץ במדרך ולהתעדכן עפ"י המלצות העונתיות התקיפות. בכל מקרה, עקב מגוון סוגיו השמנים יש לבצע בדיקה מקדימה בקנה מידה מצומצם לפני שילוב אינסיגר בשמנים חורפיים או בשמנים קייציים.

\*\* השימוש מוגבל למטעים שבהם מוצבות מלכודות פרומן להדברת דור רاشון מטפילים מהאגע העץ לשלב פקע ורוד, כאשר מוצאים לכידות במלכודות פרומן. הטיפול הבא עם הופעת דור חדש במלכודות. במטע הידוע כנגוע בעש או במטעים שבהם נמצאה לכידה רבה של בוגרים לפני הופעת פקע ורוד, יש לטפל בתכשיר קוול זחלים שבוע לאחר הטיפול באינסיגר. ניתן לרסס אינסיגר עד 3 פעמיים בעונה בלבד.

## שילובים:

בתפוח - ניתן לשלב אינסיגר עם מרפאן.

באגס - ניתן לשלב עם מרפאן.

כפוף להוראות, למוגבלות ולאמצעי זהירות המפורטים בחוויות שלהם.

לפני השימוש יש לקרוא את ההוראות המופיעות בחוויות התכשיר