

גרגרים רחיפים W.G
קוטל חרקים בעצי פרי ובגפן

יבוא מקביל

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: 3077
מיוצר ע"י: **syngenta**



אינסגר®
Insegar | إنسجار

מכיל: Fenoxycarb 25%
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 19/ה"צ/9097

כללי:

אינסגר קוטל את החרקים הרגישים לו על ידי שיבוש תהליכי הגדילה, מניעת המעבר לדרגות התפתחות מתקדמות ופגיעה בפוריות הבוגרים והביצים. אינסגר פועל במגע ובבליעה, לתכשיר יש כושר תנועה טרנסלמינרית בצמח (אך הוא אינו סיסטמי). אינסגר אינו פוגע באקריות טורפות ובצרעות טפיליות, ולכן הפרת המאזן הביולוגי מעטה יחסית.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

אופן היישום:

טיפול אחרון לפני קטיף/ בציר (ימים)	נבח תרסיס (ל'/'ד')	הריכוז	מועד הטיפול	המזיק	הגידול
21	200-100 לפי גודל העצים	*0.15%	בחודש מרס, בצמח לבקיעת הביצים וחודש אח"כ	פרלטוריה	תפוח: בזנים המקדימים לבלב (כדוגמת ענה)
21	200-100 לפי גודל העצים	*0.15%	במועד המומלץ לריסוס בשמן חורפי*	פרלטוריה	אגס, תפוח למעט בזנים המקדימים לבלב
21	200-150	0.1%	לפי לכידת בוגרים במלכודת הפרומון**	עש התפוח	
21	100	0.025%	בסוף הנגיעות המומלץ לטיפול	ליתוקולטיס	
21	200-150	0.1%	בחודש מאי ועד לגמר פעילות המזיק	סם הנמר	
21	200-150	*0.1%	במועד המומלץ לריסוס בשמן חורפי* ועד גמר פעילות המזיק	פסילת האגס	אגס
8	עד נגירה	0.15%	עם הופעת זחלים בדרגה 1 על שיחי הגפן	כנימת הפולווינריה	גפן

* בדבר שילוב בשמן חורפי או בשמן קייצי בהתאם לצורך יש להיוועץ במדריך ולהתעדכן עפ"י ההמלצות העונתיות התקפות. בכל מקרה, עקב מגוון סוגי השמנים יש לבצע בדיקה מקדימה בקנה מידה מצומצם לפני שילוב אינסגר בשמנים חורפיים או בשמנים קיציים.

** השימוש מוגבל למטעים שבהם מוצבות מלכודות פרומון להדברת דור ראשון מטפילים מהגיע העץ לשלב פקע ורוד, כאשר מוציאים לכידות במלכודות פרומון. הטיפול הבא עם הופעת דור חדש במלכודות. במטע הידוע כנגוע בעש או במטעים שבהם נמצאה לכידה רבה של בוגרים לפני הופעת פקע ורוד, יש לטפל בתכשיר קוטל זחלים שבוע לאחר הטיפול באינסגר. ניתן לרסס אינסגר עד 3 פעמים בעונה בלבד.

שילובים:

בתפוח - ניתן לשלב אינסגר עם מרפאן.

באגס - ניתן לשלב עם מרפאן.

כפוף להוראות, למגבלות ולאמצעי הזהירות המפורטים בתווית שלהם.



ADAMA
מכשירים