

תרכיז נוזלי S.L.

מכיל: Metalaxyl-M 480 g/l



מס' או"ם: לא מסווג

syngenta מיוצר ע"י:

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 07/ה"צ/1924

אופן היישום:

הגידול	המחלה	המינון / הריכוז	צורת היישום	ימי המתנה	הערות
גזר	כתמים שקועים	130 סמ"ק/לדונם	ריסוס	21	מרססים בנפח תרסיס של 30-50 ליטר לדונם, 35-40 יום לאחר הצצת הגזר) אשרוש בגודל עפרון, תחילת הופעת צבע כתום). לאחר הריסוס ממטירים 30-40 מ"ק מים לדונם.
הדרים במשתלה	רקבון שורשים (פיטוטורה)	40 סמ"ק ל-100 ליטר מים (0.04%)	הגמעה		יש להגמיע בכמות תמיסה של בין 5 סמ"ק (לשתילון) ועד 50 סמ"ק (לשתיל בן שנה).
שתילים צעירים (בגיל 1-3 שנים)			הגמעה מתחת לטפטפת	יש להגמיע בכמות תמיסה של 150 (לשתיל בן שנה), 250 סמ"ק (לשתיל בן 2) 500- סמ"ק (לשתיל בן 3).	
תות שדה	רקבון כתר (פיטוטורה)	80 סמ"ק/לדונם	הגמעה		יש לערבב את הכמות המתאימה ב-50 סמ"ק מים לשתיל. מטפלים בצמחים צעירים לאחר שתילה. ניתן להגמיע גם דרך מערכת טפטוף מנותקת בכמות מים של 2-3 מ"ק לדונם.
פלפל	מקמקת (פיתיום)	40 סמ"ק/לדונם (0.01 סמ"ק לשתיל)	הגמעה	3	
מלפפון		50 סמ"ק/לדונם (0.02 סמ"ק לשתיל)		7	מטפלים מיד לאחר קליטת השתיל או עם הופעת שתילים נגועים בחלקה. לאחר הטיפול עלולה להופיע הצהבה בשולי העלים. הצהבה זאת נעלמת בהמשך