

תרכיז רחיף S.C
קוטל עשבים כללי



אוקסיפסט®

אוקסיפאסט | Oxifast

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג
מיוצר ע"י: אדמה אגן בע"מ

מכיל: 480 g/l מלח איזופרופיל אמין של Glyphosate, מתאים ל- 360 g/l אקוויוולנט- חומצה ו-30 g/l Oxyfluorfen. השאר חומרי דילול והרטבה.

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 11/ה"צ/4119
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

אוקסיפסט הינו קוטל עשבים משולב סיסטמי לא בררני, בעל פעילות מהירה, המיועד להדברת עשבים קיימים. התכשיר נקלט ע"י העלוה הירוקה ומובל כלפי מטה גם לחלקים התת קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים. כדי לקבל הדברה מרבית צריך לרסס על צמחים ירוקים רעננים. פעילות האוקסיפסט מהירה, תוצאות ניתן לראות תוך ימים ספורים מהריסוס. אוקסיפסט מדביר את מרבית העשבים החד-שנתיים הקיימים פרט לקייצת מפותחת ולשישית הצבעים.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577



אופן היישום:

הגידול	העשבים המודברים	המינון (סמ"ק/ד')	הערות
הכנת שטחים לפני זריעה או שתילה של כותנה, אבטיח, חמניות, עגבניות לתעשייה. (בעגבניות ניתן לרסס עד שבועיים לפני השתילה.)	חד-שנתיים עד גובה 40 ס"מ	200	לפני הזריעה או לאחריה וכן לקראת שתילה. אין לרסס לאחר השקיית ההנבטה. אין לרסס בקרקעות חוליות המכילות פחות מ- 10% חרסית.
בעצי פרי מגיל שנה ואילך: הדריס, אבוקדו, פקאן, תפוח, אגס, חבוש, משמש, אפרסק, נקטרינה, שיזף, גודגדן, מנגו, גפן, זית, שסק, אפרסמון, קיווי, תמר, אנונה, גואיבה.	חד-שנתיים עד גובה 40 ס"מ	300-200	למניעת הצצה של עשבים ח"ש ניתן לשלב סימנקס* ת.ה. לפי הגידולים המורשים.
צדי דרכים, סביב מבנים ולאורך קווי מים	חד-שנתיים עד גובה 40 ס"מ	300-200	למניעת הצצה של עשבים ח"ש ניתן לשלב סימנקס* ת.ה.

* להפעלת הסימנקס דרוש גשם או המטרה תוך 2-3 שבועות לאחר הריסוס.

