

**תרכיז מתחלב (E.C) של חומצת-2,4-D
קוטל עשבים בררני
להדברת עשבים רחבי עלים**



אלבר סופר®
Albar Super | البير سوپر

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: לא מסווג
מיוצר ע"י: Adama manufacturing,
פולין

מכיל: 335 g/l 2,4-D acid
(2,4-Dichlorophenoxy acetic acid)
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 98/ה"צ/82
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

אלבר סופר קוטל עשבים בררני להדברת עשבים רחבי עלים. עשבים מודברים: אלבר סופר מדביר ביעילות צמחים רחבי עלים, אך אינו מדביר עשבים ממשפחת הדגניים. (חלמית - לא יאוחר משלב פנולוגי של 2-4 עלים). יעילות הטיפול אינה נפגעת ע"י גשם היורד מספר שעות לאחר הטיפול, אך יש להמנע מריסוס אם צפוי גשם מידי. אין ליישם יותר משלושה טיפולים בעונה. חל איסור לרסס אחרי, בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב, קרה וכו') ו/או על גידולים השרויים בעקה. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.

שילובים:

ניתן לשלב את התכשיר עם דו קטלון ודיאורקס. בתפוח, אגס, אפרסק, משמש, הדורים ואבוקדו, להדברת עשביה קיימת ניתן לשלב 1.5% אלבר סופר עם 1% ראונדאפ, בנפח תרסיס 20 ל'ד'. להכנת שטחים המיועדים לדגני חורף בעונה העוקבת, ניתן לשלב 300 סמ"ק/ד' אלבר סופר עם 300-500 סמ"ק/ד' ראונדאפ אין לשלב עם תכשירים אחרים. בכל שילוב יש לפעול בכפוף להוראות התכשיר המשולב.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577



אופן היישום:

הגידול	העשבים המודברים	ריכוז לריסוס כתמים	מיגון בסמ"ק לדונם לריסוס בשטח מלא	הערות
שטחים מרוחקים מצמחיה תרבותית	ינבוט, הגא, טיון, חבלבל, ארכובית ורחבי עלים נוספים	-	750	יש להתחיל בריסוס הראשון על העשביה לא לפני חודש מאי. הריסוס השני ינתן עם התחדשות העשביה- בשלושה חודשים מהריסוס הראשון.
תפוח, אגס ⁽¹⁾ (18 חודשים לאחר הנטיעה)	חבלבל, טיון, פטל, ינבוט ורחבי עלים קשי הדברה אחרים	1.0-0.5%	400-300	אפשר לרסס במשך כל תקופת הצימוח של החבלבל, סמוך לפריחה התוצאות טובות יותר.
אפרסק, משמש (3 שנים לאחר הנטיעה) ⁽¹⁾	חבלבל, טיון, פטל, ינבוט ורחבי עלים	1.0-0.5%	400-300	-
הדרים ⁽¹⁾ (18 חודשים לאחר הנטיעה)	חבלבל, טיון, פטל, ינבוט ורחבי עלים נוספים	0.5-0.4%	300-250	-
אבוקדו, גויאבה, שסק, אנונה ⁽¹⁾ (3 שנים מנטיעה)	חבלבל, טיון, ינבוט, פטל ורחבי עלים נוספים	-	220-180	אין לטפל לפני חודש יוני.
שעורה ^(2,4) (החל מהופעת העלה החמישי)	עשבים רחבי עלים	-	220-180	-
חיטה ^(2,3,4)	עשבים רחבי עלים	-	200	מועד הריסוס מראשית ההפרקה (כ-7-6 עלים) עד שבועיים לפני ההשתבלות.

(1) במטעים אין לרסס בזמן הפריחה.

(2) אין לרסס כאשר החיטה או השעורה נמצאים בעקה (יובש, קרה וכו'). עקת יובש לפני ואחרי הריסוס עלולה לגרום לפגיעה בגידול. בזמן הריסוס עתודות המים בקרקע צריכות להספיק ל-3 שבועות.

(3) יש להיזהר במועד הריסוס בזנים אפילים המאחרים להפריק.

