

**תרכיז נוזלי - S.L**  
**קוטל פטריות סיסטמי מדביר מחלות**  
**הנגרמות ע"י פטריות מקבוצת הפיקומיצטס**



**דוֹתַן-פְּרוֹפְלַנְט®**  
Dotan-Proplant | بروبلانت

**דרגת רעילות: III** - מסוכן לבריאות  
**מס' או"ם:** לא מסווג  
**מיוצר ע"י:** Arysta LifeScience  
Benelux Sprl  
בלגיה

**מכיל:** Propamocarb- HCL 722 g/l  
**רשיון השירותים להגנת הצומח מס':** 1530/ה"צ/98  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

### **כללי:**

דוֹתַן פְּרוֹפְלַנְט הינו מדביר מחלות מקבוצת הקרבמטים, התכשיר מדביר מחלות הנגרמות על ידי פטריות מקבוצת הפיקומצטס. אין לטפל בתכשיר זה יותר משני יישומים עוקבים. לפני החזרה לשימוש בתכשיר, יש ליישם שני טיפולים בתכשיר בעל חומר פעיל שונה, רצוי שיהיה מקבוצה כימית שונה או בעל מנגנון פעולה שונה, להדברת אותו צירוף גידול פגע.

### **שילובים מותרים:**

בתפוז"א ניתן לשלב את הדוֹתַן עם מנצידן, סימוקסי טופ וספינקס סופרה. בעגבנייה, ניתן לשלב דוֹתַן עם וולבון 160 ג'ד', סימוקסי טופ וספינקס סופרה.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

## אופן היישום:

### ריסוס נוף להדברת מחלות כמפורט בטבלה

הגידול	המחלה	מינון (סמ"ק/ק' ריכוז לד')	נפח תרסיס 'ל/ד' (התאם לגודל הנוף)	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
תפוח אדמה	כמשון	300-200	50-30	14	לאחר הופעת המחלה בנגיעות נמוכה מטפלים עם פרופלנט 200 סמ"ק/ד'. הטיפולים בפרופלנט ינתנו מדי 10-14 ימים כאשר ביניהם ינתן טיפול באחד התכשירים הפרוטקטנטיים המומלצים. בנגיעות גבוהה מגדילים את כמות הפרופלנט ל-300 סמ"ק/ד'.
עגבנייה	כמשון	300	50-30	3	
מלפפון, מלון בשדה הפתוח ותחת כיסוי	כשוטית הדלועיים	300	100-30*	3	טיפול מניעה לפני הופעת המחלה מדי 4-12 ימים. לאחר הופעת המחלה בנגיעות נמוכה מדי 10 ימים. בנגיעות גבוהה 2 טיפולים עוקבים במרווח של 6 ימים ואח"כ שוב מדי 10 ימים.
חסה	כשוטית החסה	300-200	50-30	14	
כרוב, כרובית ברוקולי, קולורבי	כשוטית הכרוביים	300-200	50-30	2	

הריסוסים ינתנו בצורה שתבטיח כיסוי מלא של נוף הצמחים.  
הערה: למרות שעד כה לא נמצאו השפעות פיטוטקסיות של התכשיר במינוני הגמעה המומלצים, הרי בשל הרב גוניות הרבה של הגידולים, הזנים ושיטות הגידול, אין אפשרות לערוך לבטיחות התכשיר בכל מקרה. לכן רצוי שהמגדל יבצע ניסוי מוקדם בצמחים בודדים לפני השימוש בדותן.

# דוּתֵן-פּרוּפּלֵנֵט®

## אופן היישום:

טיפול הגמעה למניעת פיתיון (מק-שורש) - טיפולי הגמעה יש לעשות כאשר הקרקע רטובה

הגידול	מועד הטיפול	המינון	אופן הישימה	הערות
מלפפון (בשדה הפתוח וחתך כיסוי)	טיפול קרקע עם הזריעה או לאחר ההצצה או לאחר השתילה	0.3 סמ"ק לשתיל	בשליש האחרון של ההשקיה	במקרה והנגיעות נמשכת יש לחזור על הטיפול כעבור 2-4 שבועות
בגוניה, בשמת, גיפסנית, פטוניה, חלבוב פפרומיה	חיטוי המצע לפני מילוי כלי גדול	300 סמ"ק למטר מעוקב	פיזור בתוך 10 ליטר מים על גבי מצע הגידול וערבוב	יש לבצע את הטיפול כאשר המצע לח ולהקפיד על ערבוב טוב שלו לאחר פיזור התכשיר
	טיפול קרקע לפני שתילה	15 ס"מ למ"ר	הגמעה בתוך 2-4 ליטר מים למ"ר	יש לחזור על הטיפול אחת ל-1-3 שבועות
	על גבי יחורים וצמחים קיימים	תמיסה בריכוז 0.15%-0.3%	הגמעה להרווית קרקע בעומק השורשים	
	על גבי צמחים בעציצים	100 סמ"ק של תמיסה בריכוז 0.15% לעציץ בקוטר 10 ס"מ	הגמעה לפני השתילה להרווית הקרקע	יש לחזור על הטיפול אחת ל-3-4 שבועות

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר