

תרכיז רחף S.C
מסווג כקבוצה E

אקופרט®
Ecopart | اکوبارت



דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082
מיוצר ע"י: Nihon Nohyaku CO.LTD,
יפן

מכיל: Pyraflufen-ethyl 20 g/l
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1758/ה"צ/04
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

תכשיר קוטל מגע המיועד להדברת עשבים רחבי עלים. מסווג כקבוצה E. מנגנון פעולה: עיכוב האנזים Protoporphyrinogen-IX xidas (PROTOX) - לאחר היישום התכשיר נקלט לרקמות הצמח, בנוכחות אור יופיעו סימני נקרוזה ע"ג העלים והגבעולים. יעילות טובה מושגת כאשר העשבים המודברים בגיל עד 4 עלים. מאחר ומנגנון הפעולה הוא קטילת מגע, יש לדאוג לכיסוי מרבי של נוף העשבים. לפני יישום אקופרט, יש לשטוף היטב את מיכל הריסוס. שאריות חומרי ההדברה ולו הנמוכות ביותר, עלול לפגום בבררנות התכשיר ולפגוע בגידול התרבותי.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577



אופן היישום:

הגידול	מינון או ריכוז (סמ"ק/ד') ⁽¹⁾	נבח תרסיס (ל"ד')	הערות
חיטה 3-5 עלים ⁽¹⁾	100+45 אלבר מ'	15-30	עשבים עד 4 עלים
הכנת שטחים ⁽²⁾	300+45 ראונדאפ	20-30	
מטעים: תפוח, אגס, אפרסק ונקטרינה ⁽²⁾	45 או 0.15% בשילוב ראונדאפ 1%	20-30	החל מגיל 3 שנים של הגידול ליישום במטעים בשלכת בלבד לפני תחילת תפיחת פקעים
תמר ⁽²⁾			
בקיה (שדות, פופוני) ⁽³⁾	75+45 בזאגרן	20-30	החל מגובה 10 ס"מ של הבקיה
בצל זרוע (שאינו מיועד לשיווק כבצל ירוק) ⁽⁴⁾	45	20-30	ליישום על בצל זרוע בשלב 2-4 עלים אמיתיים, לפחות 30 יום מהאסיף
אגוזי אדמה	45	20	לפחות 14 יום מהאסיף

- (1) זנים: גליל, נגב, נירית, אריאל, בית השיטה, גדרה 152.
 (2) לאחר הצצת העשביה. עשביה גבוהה וצפופה יש לכסח לפני הריסוס. יש להימנע מריסוס על הגידול.
 (3) אין ליישם את התכשיר בסמיכות של עד 5 ימים לפחות מקוטלי דגניים בבקיה.
 (4) לאחר הריסוס עלולות להופיע צריבות קלות בעלוות הגידול אשר תעלמנה תוך זמן קצר. לתופעה זו אין השפעה על היבול.

שילובים נוספים מותרים עם אקופרט:

בחיטה ניתן לשלב עם דופלוזן 100 KV סמ"ק לדונם להדברת: מצליבים, חרצית וסלק.
 ניתן לשלב עם דרבי 3 גרם/דונם או אקספרס 1 גרם/דונם להדברת: תלתן, אמיר, קדד.
 באגוזי אדמה, ניתן לשלב את בזאגרן במינון 150 סמ"ק/ד'.