



רידומיל גולד® נוזלי

RidomilGold SL | ريدوميل جولد سائل

תרכיז נוזלי S.L
קוטל פטריות סיסטמי להדברת כתמים
שקועים (כתמי בית שאן) בגזר,
מקמקת (פיתיום) בפלפל ובמלפפון
ורקבון שורשים (פיטופטורה)
בהדרים ובתות שדה

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג
מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: Metalaxyl-M 480 g/l
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1924/צ/07
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

רידומיל גולד, קוטל פטריות להדברת כתמים שקועים ("כתמי בית שאן") בגזר, מקמקת (פיתיום) בפלפל ומלפפון, רקבון שורשים (פיטופטורה) בהדרים ותות שדה. התכשיר מכיל את האיזומר הפעיל של החומר: Metalaxyl (Metalaxyl-M קבוצה 4-PhenylAmides) והוא החומר הפעיל בתכשיר.



אופן היישום:

הגידול	המחלה	המינון / הריכוז	צורת היישום	ימי המתנה	הערות
גזר	כתמים שקועים	130 סמ"ק/ לדונם	ריסוס	21	מרססים בנפח תרסיס של 30-50 ליטר לדונם, 35-40 יום לאחר הצצת הגזר/אשרוש בגודל עפרון, תחילת הופעת צבע כתום). לאחר הריסוס ממטירים 30-40 מ"ק מים לדונם.
הדרים במשתלה	רקבון שורשים (פיטוטורה)	40 סמ"ק ל-100 ליטר מים (0.04%)	הגמעה		יש להגמיע בכמות תמיסה של 5 סמ"ק (לשתילון) ועד 50 סמ"ק (לשתיל בן שנה).
שתילים צעירים (בגיל 1-3 שנים)			הגמעה מתחת לטפטפת		יש להגמיע בכמות תמיסה של 150 (לשתיל בן שנה), 250 סמ"ק (לש-תיל בן 2) ו-500 סמ"ק (לשתיל בן 3).
תות שדה	רקבון כתר (פיטוטורה)	80 סמ"ק/לדונם	הגמעה		יש לערבב את הכמות המתאימה ב-50 סמ"ק מים לשתיל. מטפלים בצמחים צעירים לאחר שתילה. ניתן להגמיע גם דרך מערכת טפטוף מנותקת בכמות מים של 2-3 מ"ק לדונם.
פלפל	מקמקת (פיתיום)	40 סמ"ק/לדונם (0.01 סמ"ק לשתיל)	הגמעה	3	
מלפפון				7	מטפלים מיד לאחר קליטת הש-תיל או עם הופעת שתילים נגועים בחלקה. לאחר הטיפול עלולה להופיע הצהבה בשולי העלים. הצהבה זאת נעלמת בהמשך.

