

גרגרים רחיפים W.G
קוטל פטריות להדברת קימחונית
בפלפל ובחציל, קימחונית ואקרית חלודה
בעגבניה, קימחון בתות שדה, בדלועיים,
בנקטרינה ובגפן וכן אקרית חלודה בהדרים

יבוא מקביל

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג
מיוצר ע"י: **syngenta**



תיוביט®

ThiovitJet | تیوبیت

מכיל: Sulfur 80%

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 19/ה"צ/9081
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

תיוביט קוטל את הפגע הרגיש לו הן במגע והן באמצעות פאזה גזית.
תיוביט משווק בתוארית של גרגרים רחיפים המתרחפים בקלות ובמהירות במי התרסיס.
חלקיקי הגופרית הזעירים בתוארית הגרגרית מאפשרים פיזור אופטימלי על העלווה והפירות
באמצעי הריסוס המקובלים. תיוביט מתאים לריסוס במתכונת של הדברה משולבת (IPM)
בהתאם להמלצות ולמגבלות המפורטות בדפי המידע.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

הגידול	הנגע	ריכוז או מינון*	נפח התרסיס**	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
עגבניה למאכל בהדליה בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 1402, 906, 870, 819, נסיכה, שרי, 1335	קימחונית, אקריית החלודה של העגבניה	1.0%-0.5%	100-50 ל'ד'	7	מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים.
עגבניה למאכל ולתעשייה בגידול משתרע בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 4303, 9176, AB-8, 9665, 9557, 3155, 9382, 3060		300 גר'ד'	40-30 ל'ד'		
פלפל מהזנים: אוהד, קליבר, קריזמה, מנטה, 4408, מאור	קימחונית	1.0%-0.5%	100-50 ל'ד'		
חציל מהזנים: 1726 (קלסיק)	קימחונית	1% (-800- 400 גר'ד') בהתאם לעוצמת הנגיעות	80-40 ל'ד' בהתאם לגודל הגוף. במרסס רובים או במרסס מפוח	7	
תות שדה מהזנים: 328 (תמר), 329 (יעל), חרות, 543	קימחון	200-300 גר'ד'	50-30 ל'ד'	7	
אבטיח מהזנים: 313, 5244, 1262, 8003, 616, 740 קרימזון מלון מהזנים: 6004, אופיק, 6407, דלנו, 6402, מגנטה קישוא מהזנים: ארליקה, 413, צוק	קימחון	200-100 גר'ד'	50-30 ל'ד'	7	
		200-300 גר'ד'			
		200-300 גר'ד'			
גפן יין מהזנים: קריניאן, סוביניון-בלאנק	קימחון	0.5%	100-200 ל'ד' (עד נגירה)	7	
נקטרינה מהזנים: רד רובי, RC-338, W-835, סנו קווין, 515, 192, 320ee, קווין ג'אינט	קימחון	0.5%	100-200 ל'ד' במרסס מפוח בטיפות קטנות	7	אין לרסס בזמן פריחה. אין לרסס בטמ' מעל 28°C. אין לרסס עד נגירה.
הדרים מהזנים: אשכולית לבנה, פומלו (גולית), פומלית, טבורי (ניו הול, ליין לייט, וושינגטון), ולנסיה, שמוטי, לימון, סצומה, ראשון, נובה, מינואלה, וינולה, מיכל, אורה, אור 1, מוה, מירב, מורקוט, טופז	אקריית החלודה של ההדר		במרסס מפוח: 300-500 ל'ד' בהתאם לגודל העץ ברובים או ברנדל: עד נגירה	7	מועד ההדברה כמפורט בתוכנית ההדברה של אקריית חלודה בהדרים. אין לשלב בשמן - כמפורט בסעיף שילובים

*מרססים בריכוז הנמוך ברמת נגיעות נמוכה ובריכוז הגבוה בנגיעות גבוהה.
**יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות, בהתאם לגובה הנוף, שיטת הריסוס, ומיקום הפגע.

שילובים:

בהתחשב במגוון התכשירים והתואריות, בתנאי אקלים משתנים, במגוון שנית ושיטות גידול, על המגדל לבצע בדיקת שילובים מקדימה בקנה מידה קטן לפני יישום משקי נרחב.
בכל מקרה של שילוב יש להכניס תיוביט ראשון למיכל המרסס. אין לשלב תיוביט בתכשירים אלקליים (בסיסיים) כגון: מרק בורדו וכן עם שמנים, או עם תכשירים בתואריות המכילות שמנים.

יתרה מזאת על פי המלצת היצרן - בירקות יש להמתין לפחות 14 יום בין ריסוס שמן לבין ריסוס תיוביט ולהפך. בהדרים תקופת ההמתנה תהיה 21 יום לפחות.