

תרכיז רחיף S.C  
להדברת מחלות במטעים ובירקות



מאסטרקופ®  
Mastercop | ماستيركوب

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות  
מס' או"ם: 3082  
מיוצר ע"י: Ingenieria Industrial,  
מקסיקו (מקב' אדמה)

מכיל: copper sulfate pentahydrate 21.6% w/w  
אקוויוולנטי ל-5.5% נחושת מתכתית  
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4371/ה"צ/2017  
רשיון השירותים להגנת הצומח חקלאות אורגנית:  
ה7565/ה"צ/2022  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

תכשיר המבוסס על נחושת, בתוארית נוזלית להדברת מחלות במטעים, ירקות וכרם.



לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

## אופן היישום:

| ימי המתנה לפני קטיף (ימים) | נפח תרסיס (1) (ל/ד')    | ריכוז/מינון (% או סמ"ק/ד')                              | הפגע*                             | הגידול                |
|----------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 7                          | 100-200                 | 0.25%   | כתמת (צרקוספורה) (יעילות בינונית) | דובדבן                |
|                            | 400-100                 |   | עין טווס                          | זית                   |
|                            |                         |   | ריקבון חום, כתמי חלבת             | הדרים                 |
|                            | 40-5                    | 300   | כימסון                            | תפוח אדמה             |
|                            | 120-30 בהתאם לגודל הצמח | 300 בנפח תרסיס של 100 ל/ד', יש לרסס במינון 0.3%         |                                   | עגבנייה               |
|                            | 300-80 בהתאם לגודל העץ  | 0.25%   | השחרה חיידקית                     | מנגו                  |
|                            | 200-80 בהתאם לגודל העץ  | 0.1%  | חירכון                            | אגס <sup>(2)</sup>    |
|                            | 130-50                  | 0.25%   | כשותית הגפן                       | גפן                   |
|                            | 60-30                   | 250   | חלבת המצליבים                     | ברוקולי               |
|                            | 60-180                  | 0.25% שני ריסוסים עוכבים בהפרש של 14 יום <sup>(4)</sup> | מללת (בוטריוספרה)                 | אבוקדו <sup>(3)</sup> |

1. נפח תרסיס יקבע בהתאם לגודל הצמח, יש להקפיד שהריסוס יגיע לכל חלקי הצמח.
2. בתנאים מסוימים עלולים להיווצר סימני חספוס על פירות אגס.
3. באבוקדו נוסה רק בזני האס ואטינגר.
4. יישום ראשון 50% פריחה, יישום שני ב-100% פריחה. אין ליישם בריכוז גבוה מ-0.25%.