



ADAMA

STOPPER® P

Diserbo di pre e post emergenza precoce per il controllo di infestanti mono e dicotiledoni per cereali a paglia.



Caratteristiche

- ▶ È la soluzione ADAMA per il controllo contemporaneo di mono e dicotiledoni per i cereali a paglia in pre e post emergenza.
- ▶ A base di *diflufenican* e *pendimetalin*, combina due principi attivi con due diversi meccanismi d'azione, garantendo l'ottimale controllo di infestanti resistenti agli ALS, ormonici, *fop* e *dim*.

- ▶ Consente il controllo precoce delle infestanti, eliminando da subito la competizione con la coltura e assicurando a questa maggiore disponibilità di acqua, luce e sali minerali necessari ad un ottimale sviluppo.

DICOTILEDONI

Attaccamani (<i>Galium aparine</i>)	Yellow
Camomilla comune (<i>Matricaria chamomilla</i>)	Green
Centocchio (<i>Stellaria media</i>)	Green
Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>)	Green
Papavero (<i>Papaver rhoeas</i>)	Green
Viola (<i>Viola</i> spp.)	Green
Veroniche (<i>Veroniche</i> spp.)	Green
Crucifere	Green
Polygonacee	Green
Ombrellifere	Red

GRAMINACEE

Avena (<i>Avena</i> spp.)	Red
Cappellino dei campi (<i>Apera spica-venti</i>)	Green
Coda di volpe (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	Green
Falaride (<i>Phalaris</i> spp)	Red
Fienarola annuale (<i>Poa annua</i>)	Green
Fienarola comune (<i>Poa trivialis</i>)	Green
Loglio (<i>Lolium</i> spp.)	Yellow

- Infestanti sensibili
- Infestanti mediamente sensibili
- Infestanti resistenti



Punti di forza

- ▶ Impiegabile in pre e post emergenza precoce, fino ad inizio accestimento (ininterrottamente).
- ▶ Ottima efficacia nei confronti di popolazioni di papavero resistenti agli ALS.
- ▶ Autorizzato su frumento tenero, frumento duro, orzo, segale e triticale.
- ▶ Ottima efficacia nei confronti di veroniche, fumaria e viola.
- ▶ Nessun problema di selettività varietale.
- ▶ Ideale per la gestione di graminacee resistenti come *Alopecuro* spp. e *Lolium* spp.



Papaver rhoeas



Viola spp.




Alopecuro spp.



Lolium spp.




Veronica spp.



Fumaria officinalis

Raccomandazioni per il corretto impiego

- ▶ **STOPPER® P** va applicato su terreno finemente lavorato (senza zolle) e livellato, al fine di evitare possibili ristagni idrici che possano originare fenomeni di fitotossicità.
- ▶ La semina deve essere eseguita ad una profondità regolare, senza lasciare seme scoperto in superficie.
- ▶ Al fine di ottenere un buon esito del trattamento, è opportuno che si verifichino eventi piovosi entro qualche settimana dall'applicazione.

N. Registrazione	n° 15229 del 28.10.2013
Composizione	PENDIMETALIN 400 g/l + DIFLUFENIICAN 40 g/l
Formulazione	Sospensione concentrata (SC)
Classificazione CLP	
Colture	Frumento tenero e duro, Orzo, Segale e Triticale
Epoca di impiego	Pre-emergenza e/o post-emergenza precoce
Dose/ha	1,5-2,5 l/ha

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.