

## MIRADOR TURBO

Registrazione Ministero della Salute n. 17824 del 01/04/2021

### Composizione:

100 ml di prodotto contengono:

Azoxystrobin puro	11,03 g (=120 g/l)
Tebuconazolo puro	18,4 g (=200 g/l)
coformulanti q.b.a	g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H302 – Nocivo se ingerito. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 – Contiene 1,2 benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi e il viso. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

### ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio,  
Bergamo – Tel. 035 328811

### Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd. - P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele  
ADAMA Agricolture España SA 8970 - Humanes Madrid (Spagna)

### Stabilimento di confezionamento:

CHEMARK Zrt. – 8182 Peremarton – Ungheria

### Distribuito da:

Syngenta Italia S.p.A. – Milano

SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Milano (MI)

**Contenuto:** 1 – 5 – 10 – 15- 20 l

Partita n° vedi timbro



**ATTENZIONE**

# MIRADOR TURBO

**FUNGICIDA FOGLIARE SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELLE  
PATOLOGIE DI CEREALI, VITE E ORTICOLE (IN SERRA)  
(sospensione concentrata)**

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

In caso di applicazioni in pieno campo, per proteggere gli organismi acquatici non applicare in una fascia vegetata di:

- 5 m per cereali primaverili in terreni con pendenza inferiore al 4% e di 10 m in terreni con pendenza superiore al 4%;
- 10 m per cereali invernali in terreni con pendenza inferiore al 4% e di 20 m in terreni con pendenza superiore al 4%;
- 10 m in caso di applicazioni su vite.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

In caso di applicazione del prodotto con:

- specifica attrezzatura (barra irroratrice/atomizzatore), durante la preparazione della miscela, il caricamento e l'applicazione munirsi di guanti in gomma, indumenti protettivi e robuste calzature.
- mediante pompa a spalla munirsi di guanti in gomma e tuta protettiva durante le fasi di preparazione, caricamento e applicazione.
- in serra munirsi di guanti in gomma durante la preparazione della miscela e il caricamento del prodotto.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

AZOXYSTROBIN 12% e TEBUCONAZOLO 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

AZOXYSTROBIN: terapia sintomatica

TEBUCONAZOLO: terapia sintomatica

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza: consultare un centro antiveneni.**

### CARATTERISTICHE

MIRADOR TURBO è un fungicida fogliare translaminare e sistemico. MIRADOR TURBO esplica attività protettiva, curativa ed eradicante. Il prodotto contiene azoxystrobin e tebuconazolo, molecole che appartengono a due diverse famiglie chimiche (strobilurine e triazoli), con diverso meccanismo d'azione. MIRADOR TURBO è indicato per il controllo delle principali patologie del grano, per l'oidio delle colture orticole e della vite: entrambe le sostanze attive contenute esplicano una spiccata azione anti-oidica e tebuconazolo esercita una azione di controllo delle fusariosi nei cereali.

### MODALITA' D'IMPIEGO

MIRADOR TURBO va utilizzato preventivamente. Si consiglia di utilizzare MIRADOR TURBO nei periodi critici di sviluppo delle patologie delle colture. Si consiglia l'impiego di MIRADOR TURBO in un programma di difesa che preveda l'alternanza delle sostanze

attive con diverso meccanismo d'azione. In caso di elevata pressione delle malattie, impiegare la dose/ha più elevata indicata.

### DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

Si consiglia di fare riferimento alle dosi/ha.

Coltura	Patogeno	Dosi di impiego (l pf/ha)	Volumi d'acqua (l/ha)	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° max applicazioni /anno
<b>Grano tenero e duro, Triticale</b>	Fusariosi ( <i>Fusarium</i> spp.); Oidio ( <i>Erysiphe</i> spp.); Ruggini ( <i>Puccinia</i> spp.); Septoria ( <i>Septoria</i> spp.)	1 – 1,25	100-500	14 – 21	2
<b>Orzo</b>	Oidio ( <i>Erysiphe</i> spp.); Ruggini ( <i>Puccinia</i> spp.); Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium</i> spp.); Elmintosporiosi ( <i>Pyrenophora</i> spp.)	1 – 1,25	100-500	14 – 21	2
<b>Cetriolo, Zucchini (Uso in serra)</b>	Oidio ( <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)	0,5 – 1	500-1000	10 – 14	3
<b>Melone (uso in serra)</b>	Oidio ( <i>Erysiphe</i> spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	3
<b>Pomodoro Melanzana (uso in serra)</b>	Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	3
<b>Peperone (uso in serra)</b>	Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> , <i>Sphaerotheca</i> spp., <i>Erysiphe</i> spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	2
<b>Aglio, Cipolla (uso in serra)</b>	Ruggini ( <i>Puccinia</i> spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	2
<b>Vite*</b>	Oidio ( <i>Uncinula necator</i> )	0,75	500-1000	10-14	2

\* dalle fasi iniziali di sviluppo vegetativo fino a pre-chiusura grappolo.

**FITOTOSSICITA'**

MIRADOR TURBO, applicato da solo, non ha causato alcun sintomo di fitotossicità sulle diverse varietà testate.

**AVVERTENZA**

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA**

<b>Coltura</b>	<b>Numero giorni</b>
Grano tenero e duro, Triticale, Orzo	35
Cetriolo, Zucchini	3
Melone	7
Pomodoro, Melanzana, Peperone	3
Aglio, Cipolla	21
Vite	21

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE  
ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**