ADAMA

FUNGICIDI

Banjo®

La protezione massima per le tue colture.



Melo



Pero



Vite



Patata

Fungicida riconosciuto per la sua efficacia negli interventi preventivi e per la resistenza al dilavamento.

Punti di forza

- **Performance elevate contro le principali malattie delle pomacee: ticchiolatura, alternaria e maculatura bruna.**
- **Importante attività preventiva di copertura e meccanismo d'azione multisito a basso rischio di resistenze.**
- **Ottima resistenza al dilavamento e protezione duratura.**
- **Partner di riferimento nelle strategie di difesa integrata.**

Caratteristiche


La formulazione in sospensione concentrata consente notevole semplicità nella preparazione della miscela, elevata uniformità di copertura della vegetazione e un incremento della resistenza al dilavamento rispetto alle formulazioni tradizionali.

Le patologie

BANJO® è un fungicida efficace nei confronti della Ticchiolatura, dell'Alternaria e della Maculatura Bruna del Pero. Su Melo BANJO® ha un'eccellente attività contro l'alternariosi oltre che contro la ticchiolatura.



Danni da Ticchiolatura su Melo



Danni da Alternaria su Melo



Danni da Ticchiolatura su Pero



Danni da Maculatura su Pero

Dosi e modalità di impiego

Le quantità indicate si riferiscono a volumi di acqua di 1000-1500 L/ha per melo e pero, 200-1000 L/ha per vite e 100-600 L/ha per la patata.

FORMULAZIONE	COMPOSIZIONE	N. REGISTRAZIONE
Sospensione concentrata	Fluazinam puro 40,2% (500 g/L)	13905 del 09-12-2010

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INT. SICUREZZA
Melo	Ticchiolatura e Alternaria	70-100 ml/hl	Massimo 3 trattamenti/anno. Iniziare i trattamenti dopo la fase di bottoni rosa. In periodi senza pioggia l'intervallo tra le applicazioni è di 14 giorni.	60 giorni
Vite da vino	Botrite e Peronospora	100-150 ml/hl	Massimo 1 trattamento/anno.	21 giorni
Patata	Peronospora	0,3-0,4 l/ha	Massimo 10 trattamenti/anno. Intervenire prima della comparsa della malattia (normalmente quando le piante hanno raggiunto i 10-15 cm di altezza), ripetendo il trattamento ogni 7-10 giorni, in funzione della piovosità.	7 giorni
Pero	Ticchiolatura, Alternaria e Maculatura bruna	70-100 ml/hl	Massimo 3 trattamenti/anno. Iniziare i trattamenti dopo la fase di bottoni rosa. In periodi senza pioggia l'intervallo tra le applicazioni è di 14 giorni.	60 giorni

Avvertenze:
Il prodotto non è compatibile con la Dodina. Rispettare un periodo di 14 giorni sia prima che dopo applicazioni con olio.



Indicazioni di pericolo:
H361d, H410, EUH208, EUH401

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.