

# CLEAVE®

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro,  
orzo, avena, segale e triticale  
efficace contro infestanti dicotiledoni in post-emergenza  
(SUSPO-EMULSIONE)

MECCANISMO D'AZIONE (HRAC) : GRUPPO 2 (B) e  
GRUPPO 4 (O)

## CLEAVE

Registrazione n. 16475 del Ministero della Salute del  
21/06/2022

### Composizione

Florasulam puro 0.25 g (=2.50 g/l)  
Fluroxypyr (ester 1-methylheptyl) 10 g (=100 g/l)  
Coformulanti q.b a 100 g

Contiene **Idrocarburi, C10, aromatici, <1%  
naftalene, 1,2,-Benzisotiazol-3(2H)-one**

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H315 - Provoca  
irritazione cutanea. H317 - Può provocare una reazione  
allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione  
oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con  
effetti di lunga durata.

**EUH401** – Per evitare rischi per la salute umana e per  
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 – Tenere fuori dalla  
portata dei bambini. P333+P313 - In caso di irritazione  
o eruzione della pelle: consultare un medico.  
P362+P364 - Togliere gli indumenti contaminati e  
lavarli prima di indossarli nuovamente. P302+P352 In  
caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con  
acqua. P305+P351+P338 – In caso di contatto con gli occhi  
Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le  
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a  
sciacquare. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i  
gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 - Lavare  
accuratamente le mani dopo l'uso. P280 - Indossare  
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità  
alla regolamentazione nazionale. P403 + P233 –  
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato

**ADAMA Italia S.r.l.**

Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)  
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:



**ATTENZIONE**

ADAMA AGAN Ltd - 77102 Ashdod, Israele  
Kollant S.r.l. - Vigonovo (VE)  
ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S. Colombano Al Lambro (MI)  
I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)  
Chemark Zrt – Peremarton, Ungheria  
Taglie autorizzate: 1 – 5 – 10 L

Partita n. Vedere sulla confezione

CLEAVE® è marchio registrato ADAMA GROUP

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il  
prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in  
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i  
sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non  
rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente  
asciutta. In caso di rientro per svolgere un'attività che richiede il contatto  
diretto con il fogliame indossare una tuta completa e guanti adatti.

Durante la manipolazione del concentrato, nelle fasi di miscelazione e  
carico del prodotto, usare guanti adatti ed occhiali di protezione.

Per la protezione degli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza  
vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per le  
applicazioni primaverili (dopo il riposo vegetativo) sui cereali invernali.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza  
non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

Non permettere il rientro del bestiame al pascolo prima che siano trascorsi  
14 giorni dall'ultimo trattamento.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare un medico per i consueti interventi  
di pronto soccorso.

**Consultare un centro antiveleni**

### CARATTERISTICHE

CLEAVE è un erbicida selettivo di post-emergenza per cereali  
invernali e primaverili.

CLEAVE è una specialità a base di fluroxypyr, principio attivo  
appartenente alla famiglia delle piridine dell'acido carbossilico,  
e florasulam, appartenente alla famiglia delle  
triazolopirimidine. Le due sostanze agiscono per assorbimento  
fogliare: fluroxypyr interferisce con la regolazione dell'auxina  
(gruppo HRAC: O) mentre florasulam inibisce l'enzima  
acetolattato sintasi (ALS) (gruppo HRAC: B).

### Infestanti sensibili:

*Aphanes arvensis* (Ventagliana dei campi); *Arabidopsis  
thaliana* (arabetta comune); *Brassica napus* (Colza  
selvatica); *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore);  
*Cyanus segetum* (Fiordaliso); *Cerastium glomeratum*  
(Peperina dei campi); *Chenopodium album* (Farinello

comune); *Chrysanthemum segetum* (Crisantemo campestre);  
*Daucus carota* (Carota); *Galium aparine* (Attaccamano);  
*Lamium purpureum* (Falsa ortica purpurea); *Matricaria spp.*  
(Camomilla); *Mercurialis annua* (Marcorella comune); *Myosotis  
arvensis* (Vaniglia selvatica); *Polygonum spp.* (Poligoni);  
*Sinapis arvensis* (Senape selvatica); *Spergula spp.* (Spergola);  
*Stellaria media* (Centocchio); *Tribulus terrestris* (Vite puntura).

### Infestanti mediamente sensibili:

*Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda); *Atriplex patula* (Erba  
correggiola); *Geranium dissectum* (Geranio selvatico);  
*Hypocoum spp.* (Cornacchina); *Lapsana communis* (lassana);  
*Papaver rhoeas* (Papavero comune); *Ranunculus spp.*  
(Ranuncolo); *Sonchus oleraceus* (grespino comune); *Viola  
arvensis* (viola).

### COLTURE, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Per il controllo delle malerbe a foglia larga in **frumento tenero e  
duro, orzo, avena, segale e triticale** è consentita una sola  
applicazione l'anno in primavera, dallo stadio fenologico di inizio  
accestimento fino a quello di secondo nodo visibile, alla dose di:

**1,5 – 1,8 l/ha** in 200-400 litri d'acqua.

Si consiglia di intervenire quando le infestanti sono nei primi stadi  
vegetativi.

### AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Grazie al differente meccanismo d'azione dei principi attivi  
fluroxypyr e florasulam, CLEAVE presenta un basso rischio di  
insorgenza di malerbe resistenti. Si consiglia comunque l'impiego  
di idonee pratiche agronomiche.

In caso di fallimento della coltura dopo il trattamento con il  
prodotto, la semina di barbabietola da zucchero può essere  
effettuata solo a seguito di aratura.

### COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente  
un test di compatibilità.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati devono  
essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti  
più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere  
osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero

casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA':**

CLEAVE può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**