



ERBICIDI


FEINZIN® 70 DF ACTIVUS® ME

Sospensione
concentrataMicrogranuli
idrodispersibiliSospensione acquosa
concentrata di capsule

Linea di pre-emergenza

STRATEGIA ANTI-RESISTENZA

Prevalenza: Dicotiledoni in genere + Setaria.



FEINZIN® 70 DF + ACTIVUS® ME

FEINZIN® 70 DF

DOSI	NOTE
0.25 kg/ha	Porre attenzione nei terreni scolti.

ACTIVUS® ME

DOSI	NOTE
2 l/ha	Effettuare una sola applicazione per ciclo colturale. Applicazione in pre-emergenza. In miscela.

SPETTRO D'AZIONE DELLE MISCELA FEINZIN® 70 DF E ACTIVUS® ME

DICOTILEDONI	
Acalifa (<i>Acalypha virginica</i>)	
Amaranto (<i>Amaranthus</i> spp.) ecotipo resistente trattare entro la 4ª foglia dell'infestante.	
Cencio molle (<i>Abutilon theophtasti</i>)	
Erba calderina (<i>Senecio</i> spp.)	
Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>)	
Erba porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>)	
Farinaccio (<i>Chenopodium</i> spp.)	
Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>)	
Grespino comune (<i>Sonchus oleraceus</i>)	
Persicaria (<i>Persicaria laphthifolia</i>)	
Poligonacee	
Ravanello selvatico (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
Senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>)	
Veronica (<i>Veronica</i> spp.)	
GRAMINACEE	
Falso panico (<i>Setaria</i> spp.)	
Giaovone comune (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
Sorghetta da seme (<i>Sorghum halepense</i>)	

Infestanti sensibili

Infestanti mediamente sensibili

FEINZIN® 70 DF

ANTIGRAM® GOLD

Sospensione
concentrata



Microgranuli
idrodispersibili




Concentrato
emulsionabile



Linea di pre-emergenza

STRATEGIA ANTI-RESISTENZA

Prevalenza amaranto e graminacee estive.



FEINZIN® 70 DF + ANTIGRAM® GOLD



ANTIGRAM GOLD:
in caso di forte pressione
di Graminacee.

FEINZIN® 70 DF

DOSI	NOTE
0.25 kg/ha	Porre attenzione nei terreni scolti.

ANTIGRAM® GOLD

DOSI	NOTE
1 l/ha	Importante contenimento di Sorghetta da seme.

SPETTRO D'AZIONE DELLE MISCELA FEINZIN® 70 DF E ANTIGRAM® GOLD

DICOTILEDONI	
Acalifa (<i>Acalypha virginica</i>)	
Amaranto (<i>Amaranthus</i> spp.) incluso ecotipi als resistenti	
Cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>)	
Erba calderina (<i>Senecio</i> spp.)	
Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>)	
Erba porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>)	
Farinaccio (<i>Chenopodium</i> spp.)	
Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>)	
Grespino comune (<i>Sonchus oleraceus</i>)	
GRAMINACEE	
Persicaria (<i>Persicaria laphthifolia</i>)	
Poligonacee	
Ravanella selvatico (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	
Senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>)	
Veronica (<i>Veronica</i> spp.)	
Falso panico (<i>Setaria</i> spp.)	
Giaovone comune (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
Sorghetta da seme (<i>Sorghum halepense</i>)	

Infestanti sensibili

Infestanti mediamente sensibili



ERBICIDI

FEINZIN[®] 70 DF CLEMATIS[®]

Sospensione
concentrata


Sospensione di capsule

Microgranuli
idrodispersibili

Linea di pre-emergenza

STRATEGIA ANTI-RESISTENZA

Prevalenza: Abutilon e Giavone.

FEINZIN[®] 70 DF + CLEMATIS[®]

FEINZIN [®] 70 DF	
DOSI	NOTE
0.25 kg/ha	Porre attenzione nei terreni scolti.

CLEMATIS [®]	
DOSI	NOTE
0.3 l/ha	Utilizzare il prodotto in pre-emergenza della coltura.

SPETTRO D'AZIONE DELLE MISCELA FEINZIN[®] 70 DF E CLEMATIS[®]

DICOTILEDONI	
Acalifa (<i>Acalypha virginica</i>)	
Amaranto (<i>Amaranthus</i> spp.) incluso ecotipi als resistenti	
Cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>)	
Erba calderina (<i>Senecio</i> spp.)	
Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>)	
Erba porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>)	
Farinaccio (<i>Chenopodium</i> spp.)	
Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>)	
Grespino comune (<i>Sonchus oleraceus</i>)	
GRAMINACEE	
Falso panico (<i>Setaria</i> spp.)	
Giavone comune (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	
Sanguinella (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
Sorghetto da seme (<i>Sorghum halepense</i>)	

Infestanti sensibili

Infestanti mediamente sensibili