


# Linea difesa dalla Peronospora

FUNGICIDI



MEXIRAM®  
TRI HI BIO

MEXIRAM®  
TRI HI BIO

KITAMBA®

CARSON® 45 WG

ZAKEO® 250 SC

EXTASE® R

## CARSON® 45 WG

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro (in campo)	220 g/ha	Massimo 5 applicazioni/ciclo colturale dallo stadio di 3-4 foglie vere fino alla maturazione dei frutti con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	10 giorni per Pomodoro da industria e 3 giorni per Pomodoro da mensa

## EXTASE® R

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro (pieno campo e serra)	5 kg/ha (500 g/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	10 giorni per Pomodoro da industria e 3 giorni per Pomodoro da consumo fresco

## KITAMBA®

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro (pieno campo e serra)	4 l/ha	Massimo 3-4 trattamenti/anno; intervallo tra le applicazioni 10-14 giorni	10 giorni

## MEXIRAM® TRI HI BIO

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro (in campo)	1,6 - 1,7 kg/ha (160-170 g/hl)	Azione collaterale contro Cancro batterico e Botrite	10 giorni

## ZAKEO® 250 SC

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro (pieno campo e serra)	0,7-0,8 l/ha	Massimo 3 trattamenti/anno. Non applicare il prodotto per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Intervenire a cadenza di 7-10 giorni. In ambiente protetto non effettuare più di 3 trattamenti per ciclo colturale alternando ogni applicazione di ZAKEO® 250 SC con almeno 2 applicazioni con prodotti a base di sostanza attiva e differente meccanismo d'azione. Non superare la dose di 1 l/ha	3 giorni