



Linea difesa Oidio, Alternaria e altre patologie

FUNGICIDI



MAVITA® 250 EC

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro (pieno campo e serra)	0,4-0,5 l/ha (40-50ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare	7 giorni in pieno campo e 3 giorni in serra

NIMROD® 250 EW

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro (in campo)	1-2 l/ha	Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10-12 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione	3 giorni

SCIROCCO® 125 EW

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomodoro (in pieno campo)	0,2 - 0,36 l/ha	Alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione eseguire 2-3 trattamenti ogni 8-12 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8-10 giorni	7 giorni

NIMROD® 250 EW
L'eccellenza a prova di oidio.

- > Elevata efficacia preventiva.
- > Protezione duratura.
- > Ottimo profilo residuale.
- > Massima sostenibilità.