



INSETTICIDI



Insetti del mais

Anche il mais, come tutte le altre colture, è soggetto ad attacchi di insetti che possono compromettere il raccolto e la qualità della granella.

Per semplicità possiamo dividerli in:

- Specie che attaccano il seme e le piante nelle prime fasi di sviluppo e di conseguenza l'apparato radicale. Tra le specie più dannose vi sono i coleotteri elateridi e le larve di Diabrotica. Tra i lepidotteri si segnalano le nottue di cui la più diffusa è l'agrotide (*Agrotis ipsilon*);
- Specie che attaccano la parte aerea della pianta: la più importante è la piralide (*Ostrinia nubilalis*) che oltre a causare danni produttivi, influenza direttamente la qualità della granella.

Da sottolineare la presenza di adulti di *Diabrotica virgifera virgifera* che può causare una ridotta fecondazione attaccando le setole.

Tra le specie presenti, ma che difficilmente possono causare perdite produttive, si possono evidenziare alcuni afidi (*Rhopalosiphum maidis* e *Sitobion* spp.), tripidi e acari tetranichidi, come il ragno rosso comune (*Tetranychus urticae*).

Elateride

Agrotis spp.



Nottua

Agrotis spp.



Diabrotica

Diabrotica virgifera virgifera



Piralide

Ostrinia nubilalis





SCHERMO® 0.5 G


Granulare



INSETTICIDI

Lotta agli insetti del mais

INSETTI TERRICOLI



SCHERMO® 0.5 G

SCHERMO® 0.5 G

DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
12-15 kg/ha	Autorizzato anche su mais dolce. Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Elateridi, Diabrotica, Hylemya sp., Scutigerella immaculata, Tipule.	-



Elateride (*Agriotes* spp.)



Nottua (*Agrotis* spp.)



SCHERMO® 0.5 G Anteprima di un successo.

- Triplice azione:** Schermo® 0.5 G agisce per ingestione e contatto; inoltre esplica un'azione
- > insetticida ottimale raggiungendo anche le porzioni di terreno limitrofe ai granuli, grazie alla sua mobilità in fase di vapore.

- Formulazione molto stabile e resistente** apporta una performance più duratura e un'ottima scorrevolezza nei microgranulatori delle seminatrici;
- > inoltre offre una maggiore superficie di contatto fra insetticida e terreno, sfruttando al meglio la sua azione anche in fase di vapore.

- > **Ampia etichetta.**



LAMDEX® EXTRA


Granuli
idrodispersibili



INSETTICIDI

Lotta agli insetti del mais

PIRALIDE, DIABROTICA E LEPIDOTTERI



LAMDEX® EXTRA

DOSI	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
0,4-0,5 kg/ha	Autorizzato anche su mais dolce. Nottue (allo scoperto).	7 giorni
0,42-0,8 l/ha	Afidi, Lema, Tripidi Cecidomia, Idrellia.	
0,56-1 kg/ha	Piralide, Diabrotica.	



Diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera*)



Piralide (*Ostrinia nubilalis*)