



ADAMA



CATALOGO 2023



[ADAMA.COM](https://adama.com)

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO IL PRODOTTO PARTENDO DAL CAMPO,
ATTRAVERSO L'ASCOLTO DEGLI AGRICOLTORI E DEI BISOGNI LOCALI,
FORNENDO SOLUZIONI CHE RISPONDONO DIRETTAMENTE ALLE LORO ESIGENZE.



LISTEN

Un'esperienza attiva che richiede abilità, pensiero e intenzione. Creare opportunità di ascolto coerenti con agricoltori, clienti, esperti e colleghi.



LEARN

Integrare le informazioni e il sapere che acquisiamo esternamente con le competenze e il know-how che offriamo. Trasformare intuizioni in idee concrete.



DELIVER

Consegnare è nel nostro DNA: sfruttare il nostro approccio completo per rispondere in modo specifico alle esigenze dei clienti. Forniamo soluzioni solo dopo aver prima ascoltato ed imparato.

Listen › Learn › Deliver

CON UN PATRIMONIO
DI OLTRE 70 ANNI,
ADAMA È UNA DELLE
PIÙ GRANDI AZIENDE
NEL SETTORE GLOBALE
NELLA PROTEZIONE
DELLE COLTURE.



\$ 4,8
miliardi
di vendite



> 9,000
persone



Vendite in oltre
100 paesi



+ 300
principi attivi



4 centri
globali di
sviluppo prodotti




22 siti
produttivi

ADAMA nel mondo

ADAMA fornisce **soluzioni**
ad agricoltori e clienti di tutto
il mondo per combattere
le problematiche di tutti i giorni
aiutandoli a crescere.

Un percorso di evoluzione
e trasformazione nel quale ADAMA Italia
porta in dote una **profonda conoscenza**
del sistema agricolo italiano, delle sue
colture specifiche e dei suoi protagonisti.



La nostra storia



Ogni campagna agraria è sempre una nuova sfida. E certamente ancor di più nel contesto attuale, che ci obbliga ad operare in un mondo di cambiamenti spesso imprevedibili, mettendoci tutti giorni di fronte a scelte difficili e complesse.

Di fronte a queste sfide, per ADAMA è chiaro quanto sia importante rendere il settore agricolo sempre più sicuro, fornendo al mercato prodotti ed innovazioni capaci di rendere il nostro avvenire ancora più sostenibile. Migliorare la nostra proposta commerciale è un lavoro che facciamo mettendo sempre al centro gli interessi degli agricoltori, prendendo spunto dai loro bisogni e necessità nell'affrontare le sfide in campo e cercando di trovare le soluzioni più adatte, pratiche ed efficaci.

ADAMA ritiene di poter continuare ad essere un punto di riferimento ed un supporto al servizio dei nostri partner. Con oltre 30 anni di storia sul mercato italiano, ADAMA ha come proprio punto di forza un Team di professionisti qualificati e di grande esperienza, sempre in prima linea sul territorio, in un costante dialogo con gli attori della filiera, sempre al servizio degli agricoltori per aiutarli a ottimizzare la produttività dei loro campi, dei tecnici e dei partner distributivi, affinché la passione del loro lavoro dia grandi risultati.

ADAMA anche per questa campagna presenta un rinnovato catalogo in cui integrare nuove proposte in una offerta già molto ampia e che ci vede presenti nei principali areali e nelle principali colture. Dai prodotti per i Cereali a quelli per la Soia, dalle Pomacee alla Vite, che ci vedono in prima linea a fianco di tecnici, produttori e distributori a testimoniare quanto ADAMA creda nell'agricoltura italiana e nei suoi operatori. Un catalogo ricco di soluzioni per un contesto ampio ed articolato come quello Italiano sia dal punto di vista delle colture che delle esigenze in termini di difesa e produzione.

Infine uno sguardo al futuro: nell'augurare a tutti una buona campagna 2023, ribadiamo il nostro grande impegno nella continua innovazione della nostra proposta commerciale e nella presenza al vostro fianco confermando, inoltre, l'arrivo di importanti e numerose novità già a partire dalla fine della prossima stagione e che potremo vedere insieme in campo nella prossima primavera.

Insieme, al vostro fianco.

ENRIQUE SALMONA
Direttore Generale ADAMA Italia

Area Ovest

Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna

Area Manager
PIERGIORGIO GONELLA
piergiorgio.gonella@adama.com
M. 339 84 47 005

Key Account Manager
ALESSANDRO FIONI
alessandro.fioni@adama.com
M. 334 67 04 201

Field Marketing
PIETRO RODI
pietro.rodì@adama.com
M. 335 52 44 798

Field Marketing
FEDERICO BERGAMINI
federico.bergamini@adama.com
M. 331 64 36 563

Area Sud

Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria, Sicilia

Area Manager
GIROLAMO LAMANUZZI
girolamo.lamanuzzi@adama.com
M. 348 70 84 881

Key Account Manager
FRANCESCO BILLERO
francesco.billero@adama.com
M. 329 67 50 790

Field Marketing
VINCENZO LOSACCO
vincenzo.losacco@adama.com
M. 340 72 79 279


Area Est

Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche

Area Manager
VITTORIO MAZZUCOTELLI
vittorio.mazzucotelli@adama.com
M. 320 37 32 845

Field Marketing
TIZIANO BALDO
tiziano.baldo@adama.com
M. 331 69 68 354

Field Marketing
LUCA MIROSSEVICH
luca.mirossevich@adama.com
M. 344 03 47 397



ADAMA in Italia

Consultare il sito web www.adama.com
o la app ADAMA per la rete vendita completa.


La nostra offerta

Una vasta gamma di prodotti appositamente realizzati per la **protezione delle colture** a 360°, contraddistinta da quattro colori che identificano ciascuna famiglia in modo rapido e immediato.



Le Linee Tecniche

Le principali linee di prodotto altamente **specializzate e innovative**, ideate per **portare semplicità nel lavoro dell'agricoltore** e studiate per rispondere con efficacia alle singole esigenze delle diverse colture.



Il nostro sito



Il meleto virtuale:
un'esperienza
da vivere.



Le APP di ADAMA



La APP Catalogo

Tutto ciò che cerchi è qui

Un solo strumento, sempre a portata di mano, per poter accedere a tutte le informazioni su ADAMA e i suoi prodotti, schede di sicurezza ed etichette aggiornate, in modo rapido, immediato e completo.



MOTORE DI RICERCA

Per prodotti e per coltura, un doppio percorso di navigazione.



NEWS

Dove trovare tutte le novità del mondo ADAMA.



RETE VENDITE

I riferimenti tecnico-commerciali in relazione all'area geografica.



Disponibile in tutti gli store.



ADAMA UGELLI

Regolazione e manutenzione



Google play

Con l'APP ADAMA Ugelli in un'unica schermata tutti i parametri necessari a configurare la propria attrezzatura.



ADAMA BAGNATURA

Controllo della distribuzione



Google play

Un'APP semplice e immediata per verificare la qualità della distribuzione.



GRANO TENERO ADAMA

La nuova sfida all'agricoltura del futuro



Google play

Uno strumento innovativo per la coltivazione di alta qualità secondo i principi dell'agricoltura sostenibile e di precisione.

SOMMARIO
GENERALE

	ACTIVUS® ME	16
	AGIL®	17
	ANTIGRAM® GOLD	18
	APOLLO® SC	71
	AVANA®	19
	BANJO®	46
	BREVIS®	80
	CARSON 45 WG	47
	CERERIS	48
	 CLEAVE®	20
	CLEMATIS®	21
	CONTATTO® 320	22
	DAVAI®	23
	ELEGANT® 2FD	24
	EXELGROW®	81
	EXTASE® R	49
	FEINZIN® 70 DF	25
	FOLPAN® 80 WDG	50
	FOLPAN® GOLD	51
	GOLTIX®	26
	 GOLTIX® SUPER	27
	KITAMBA®	52
	LAMDEX® EXTRA	72

	LENNS®	28		 STAVENTO®	65
	LEOPARD® 5 EC	29		STOPPER P	34
	MAVITA® 250 EC	53		SULCOTREK®	35
	MAVRIK® SMART	74		SULTAN®	36
	MERPAN® 80 WDG	54		TAIFUN® MK CL	37
	MERPLUS®	55		TIMELINE® TRIO	38
	MEXIRAM® HI BIO	56		TIPTOR® ULTRA	66
	MIRADOR® SC	57		 TOMIGAN®	39
	MIRADOR® TURBO	58		TOPIK® 240 EC	40
	MITOR®	75		TRIMMER® 50 WG	41
	MOMENTUM®	59		VALLEY®	42
	NICOGAN® V. O.	30		ZAKEO® 250 SC	67
	NIMROD® 250 EW	60			
	PARLEAF	82			
	PIRIMOR® 50	76			
	 POSTSCRIPT® 80	31			
	 PRAXIM®	32			
	PYXIDES® DUO	33			
	QUANTUM® L	61			
	SCHERMO® 0.5 G	77			
	SCIROCCO 125 EW	62			
	SEEDRON®	63			
	SPYRALE®	64			

IN CORSO
DI REGISTRAZIONE

	FOLPAN ENERGY	85
---	---------------	----

ERBICIDI

SOMMARIO

	ACTIVUS® ME	16
	AGIL®	17
	ANTIGRAM® GOLD	18
	AVANA®	19
NEW!	CLEAVE®	20
	CLEMATIS®	21
	CONTATTO® 320	22
	DAVAI®	23
	ELEGANT® 2FD	24
	FEINZIN® 70 DF	25
	GOLTIX®	26
NEW!	GOLTIX® SUPER	27
	LENNS®	28
	LEOPARD® 5 EC	29
	NICOGAN® V. O.	30
NEW!	POSTSCRIPT® 80	31
NEW!	PRAXIM®	32
	PYXIDES® DUO	33
	STOPPER P	34
	SULCOTREK®	35
	SULTAN®	36
	TAIFUN® MK CL	37
	TIMELINE® TRIO	38
NEW!	TOMIGAN®	39
	TOPIK® 240 EC	40
	TRIMMER® 50 WG	41
	VALLEY®	42



ACTIVUS® ME

Erbicida residuale di pre e post-emergenza precoce, per orticole, frutticole, vite ed estensive.



FORMULAZIONE: Sospensione acquosa concentrata di capsule	COMPOSIZIONE: Pendimetalin 34,8 g (400 g/l)	HRAC K1	N. REGISTRAZIONE: 17116 del 07-12-2017
---	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Agrumi, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Pesco Nettarino, Albicocco, Ciliegio, Susino	3 l/ha	Da post-raccolta fino ad inizio allegagione, in pre-emergenza delle infestanti	-
Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Noce, Pistacchio	3 l/ha	Da post-raccolta ad inizio allegagione, in pre-emergenza delle infestanti	
Uva da vino, Uva da tavola	3 l/ha	Da post-raccolta fino a bottoni fiorali separati, in pre-emergenza delle infestanti	
Fragola	3 l/ha	In pre-trapianto o, durante il periodo invernale, in post-trapianto tra le file	
Patata	3 l/ha	In pre-emergenza	
Carota	2,5 l/ha	In pre-emergenza o post-emergenza (3-4 foglie)	
Aglio, Scalogno, Cipolla, Porro	2,5 l/ha	In pre-trapianto (fino al giorno prima), in pre-emergenza o in post-emergenza/post-trapianto (2-4 foglie)	
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone	2,5 l/ha	In pre-trapianto	
Cavoli a testa, Cavoli a infiorescenza, Cavoletti di Bruxelles	2,5 l/ha	In pre-trapianto	
Lattughe, Scarole, Cicorie (eccetto Witloof/Belga)	2,5 l/ha	In pre-trapianto	
Carciofo	3 l/ha	In pre-emergenza o pre-ricaccio o, su coltura in vegetazione, solo nelle interfile e intorno ai ceppi	
Fagioli e Fagiolini, Piselli, Fava, Favino, Cece, Lenticchia, Veccia, Lupino, Leguminose da foraggio	2,5 l/ha	In pre-emergenza	
Soia	2,5 l/ha	In pre-emergenza	
Girasole	3 l/ha	In pre-emergenza	
Riso seminato in asciutta, compresi gli arginelli	2,5 l/ha	In pre-emergenza	
Mais e Mais dolce	3 l/ha	In pre-emergenza o post-emergenza (2 foglie)	
Sorgo	3 l/ha	In pre-emergenza	
Cereali	2,5 l/ha	In pre-emergenza o post-emergenza prima di inizio accestimento	
Tabacco	3 l/ha	In pre-trapianto	
Tappeti erbosi	2,5 l/ha	In post-emergenza dal secondo anno d’impianto	
Piante ornamentali, Pioppo, Vivai	3 l/ha	Durante la fase di dormienza	

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE
<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella)
<i>Panicum dichotomiflorum</i> (Giovone americano)
DICOTILEDONI
<i>Anagallis arvensis</i> (Anagallide)
<i>Lamium</i> spp. (Falsa ortica)
<i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica)

SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di volpe)
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Giovone comune)
<i>Setaria</i> spp. (Pabbio)
<i>Sorghum halepense</i> (Sorghetta - da seme)
DICOTILEDONI
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)
<i>Chenopodium</i> spp. (Farinello)
<i>Papaver rhoeas</i> (Papavero)
<i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla)
<i>Polygonum</i> spp. (Poligono)
<i>Portulaca oleracea</i> (Porcellana comune)
<i>Senecio vulgaris</i> (Senecione)
<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)
<i>Urtica urens</i> (Ortica)
<i>Veronica</i> spp. (Veronica)

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

AGIL®

Erbicida graminicida di post-emergenza, selettivo per soia e altre oleaginose, orticole, frutticole e vite.



FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile	COMPOSIZIONE: Propaquizafop 9,60 g (100 g/l)	HRAC: A	N. REGISTRAZIONE: 9005 del 02-12-1996
--	---	------------	--

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Lino, Colza, Girasole, Soia	0,8-2,0 l/ha		90 giorni
Cocomero, Melone, Zucca			65 giorni
Cotone			60 giorni
Barbabietola da zucchero e da foraggio			45 giorni
Tabacco			40 giorni
Melo, Pero, Nespolo del Giappone, Cotogno, Pesco, Nettarino, Albicocco, Susino, Ciliegio, Vite, Arancio, Clementino, Mandarino, Limone, Pompelmo, Chinotto, Bergamotto, Cedro, Frutta a guscio, Pomodoro, Melanzana, Broccoli, Cavolfiore, Cavolo cappuccio			30 giorni
Vivai di fruttiferi, Piante ornamentali, Vivai e piante forestali	0,8-1,5 l/ha		-
Fagiolo e pisello (per consumo secco, fresco con e senza baccello), Cece, Favino, Fava, Lenticchia, Lupino			40 giorni (consumo fresco) 50 giorni (consumo secco)
Erba medica, Trifoglio, Veccia			45 giorni
Patata			40 giorni
Carota, Prezzemolo a grossa radice, Aglio, Cipolla, Scalogno	0,8-1,2 l/ha		30 giorni
Spinacio			15 giorni
Lattuga, Asparago, Finocchio	1-1,2 l/ha		30 giorni 15 giorni per Lattuga
Riso		Trattamenti in pre-semina, dopo l'emergenza di riso crodo e giovone	-

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Avena</i> spp. (Avena)	<i>Agropyron repens</i> (Falsa gramigna)
<i>Bromus sterilis</i> (Forasacco rosso)	<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di volpe)
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Giovone)	<i>Cynodon dactylon</i> (Gramigna)
<i>Hordeum vulgare</i> (Orzo)	<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella)
<i>Lolium</i> spp. (Loglio)	<i>Oryza rufipogon</i> (Riso crodo)
<i>Panicum dichotomiflorum</i> (Giovone americano)	<i>Poa</i> spp. (Fienarola)
<i>Panicum miliaceum</i> (Miglio)	
<i>Phalaris</i> spp. (Falaride)	
<i>Setaria</i> spp. (Setaria)	
<i>Sorghum halepense</i> (Sorghetta)	
<i>Triticum</i> spp. (Frumento)	
nonché nascite spontanee di cereali	

Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo:
H304 - H319 - H332 - H411 - EUH066 - EUH208 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

ANTIGRAM® GOLD

Erbicida di pre e post-emergenza precoce ad ampio spettro, selettivo per mais, soia ed altre colture estensive ed orticole.



FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile	COMPOSIZIONE: S-metolachlor 86,5 g (960 g/l)	HRAC K3	N. REGISTRAZIONE: 13455 del 02-10-2006
--	---	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero	0,4-0,5 l/ha	Impiegare in pre-emergenza	-
Mais	1,25-1,5 l/ha	Impiegare in pre-emergenza. Anche in post-emergenza (massimo 3-4 foglie) purché non siano nate le erbe infestanti	
Soia, Girasole	1-1,25 l/ha	Impiegare in pre-emergenza	
Pomodoro trapiantato	1-1,5 l/ha	Impiegare in pre-trapianto. Applicare 5-10 giorni prima del trapianto	
Fagiolo	1 l/ha	Impiegare in pre-emergenza	
Spinacio, Bietola da foglia e da costa	0,5 l/ha	Impiegare in pre-emergenza. Applicare il prodotto tra Febbraio e Agosto	

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Giavone comune)	<i>Lolium</i> spp. (Loglio)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella comune)	<i>Avena</i> spp. (Avena selvatica)
<i>Setaria</i> spp. (Setaria)	<i>Chenopodium album</i> (Farinello)
<i>Panicum dichotomiflorum</i> (Giavone americano)	<i>Polygonum aviculare</i> (Correggiola)
<i>Sorghum halepense</i> (Sorghetta da seme)	<i>Fallopia convolvulus</i> (Poligono convolvolo)
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di volpe)	<i>Polygonum persicaria</i> (Poligono persicaria)
<i>Amaranthus retroflexus</i> (Amaranto comune)	<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)
<i>Fumaria officinalis</i> (Fumaria)	
<i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla comune)	
<i>Portulaca oleracea</i> (Porcellana comune)	
<i>Stellaria media</i> (Centocchio comune)	
<i>Veronica</i> spp. (Veronica comune)	

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H317 - H319 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

AVANA®

Erbicida di pre-emergenza per il controllo delle infestanti e delle gemme ascellari del tabacco.



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Pendimetalin 40 g (400 g/l)	HRAC K1	N. REGISTRAZIONE: 17123 del 07-12-2017
--	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Tabacco	3 l/ha	Trattare in pre-trapianto o in post-trapianto tra le file	-
Tabacco antigermogliante	10 ml per litro d'acqua	Applicare dopo l'eliminazione dell'infiorescenza. Depositare sulla cima di ciascuna pianta 20 ml di soluzione. Un volume di soluzione di 400 l/ha è sufficiente per 1 ha di impianto con 20.000 piante/ha. Non spruzzare o nebulizzare il prodotto sulle piante. Il prodotto non deve entrare in contatto con le foglie	

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH208 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

CLEAVE®

Erbicida di post-emergenza per frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e triticale, efficace contro infestanti dicotiledoni.



FORMULAZIONE: Suspoemulsione	COMPOSIZIONE: Florasulam 0,25 g (2,50 g/l) Fluroxypyr 10 g (100 g/l)	HRAC: Gruppo O e B	N. REGISTRAZIONE: 16475 del 21-06-2022
---------------------------------	--	--------------------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale e triticale	1,5 – 1,8 l/ha	Impiegare in post-emergenza della coltura, da inizio accestimento al secondo nodo di levata	-

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
<i>Aphanes arvensis</i> (Ventagliina dei campi)
<i>Arabidopsis thaliana</i> (Arabetta comune)
<i>Brassica napus</i> (Colza selvatica)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del pastore)
<i>Cyanus segetum</i> (Fiordaliso)
<i>Cerastium glomeratum</i> (Peverina dei campi)
<i>Chenopodium album</i> (Farinello comune)
<i>Chrysanthemum segetum</i> (Crisantemo campestre)
<i>Daucus carota</i> (Carota)
<i>Galium aparine</i> (Attaccamano)
<i>Lamium purpureum</i> (Falsa ortica purpurea)
<i>Matricaria</i> spp. (Camomilla)
<i>Mercurialis annua</i> (Marcorella comune)
<i>Myosotis arvensis</i> (Vaniglia selvatica)
<i>Polygonum</i> spp. (Poligoni)
<i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica)
<i>Spergula</i> spp. (Spergola)
<i>Stellaria media</i> (Centocchio)
<i>Tribulus terrestris</i> (Vite puntura)

SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Anthemis arvensis</i> (Camomilla bastarda)
<i>Atriplex patula</i> (Erba correggiola)
<i>Geranium dissectum</i> (Geranio selvatico)
<i>Hypocoum</i> spp. (Cornacchina)
<i>Lapsana communis</i> (Lassana)
<i>Papaver rhoeas</i> (Papavero comune)
<i>Ranunculus</i> spp. (Ranuncolo)
<i>Sonchus oleraceus</i> (Grespino comune)
<i>Viola arvensis</i> (Viola)

Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo:
H304 - H318 - 336 -410 - EUH066 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

CLEMATIS®

Erbicida residuale ad ampio spettro, selettivo per patata, riso, soia e tabacco.



FORMULAZIONE: Sospensione di capsule	COMPOSIZIONE: Clomazone 30,25 g (360 g/l)	HRAC F4	N. REGISTRAZIONE: 17746 del 04-12-2020
---	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Patata	0,3 l/ha	Trattare in pre-emergenza, dopo rinalzatura, su coltura completamente ricoperta dal terreno	-
Riso seminato in asciutta	0,3 – 0,5 l/ha	Trattare in pre o post-emergenza precoce, con suolo saturo. Dopo 2 – 4 giorni dall'applicazione, immettere acqua nella camera in modo lento e graduale	
Riso seminato in acqua	0,3 – 0,5 l/ha	In pre-semina applicare il prodotto con suolo saturo. Dopo uno o due giorni immettere acqua in modo lento e graduale e mantenere l’acqua ferma per alcuni giorni. Seminare 4-5 giorni dopo l'applicazione. In post-emergenza precoce, effettuare l’applicazione con terreno saturo. Dopo 2-4 giorni immettere acqua in modo lento e graduale.	
Soia	0,3 – 0,4 l/ha	Pre-emergenza	
Tabacco	0,4 – 0,5 l/ha	Pre o post-trapianto	

Per tutte le colture è consentita 1 sola applicazione per stagione.

Efficacia d’uso

PATATA
SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del pastore)
<i>Chenopodium album</i> (Farinello comune)
<i>Veronica arvensis</i> (Veronica dei campi)
<i>Veronica persica</i> (Veronica comune)
<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)
<i>Lamium purpureum</i> (Falsa ortica purpurea)
<i>Sonchus oleraceus</i> (Grespino comune)
<i>Galinsoga parviflora</i> (Galinsoga)
<i>Galium aparine</i> (Attaccamani)
<i>Stellaria media</i> (Centocchio)
<i>Polygonum persicaria</i> (Poligono persicaria)
<i>Senecio</i> spp.
<i>Sysimbrium officinale</i> (Erisimo)
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Giovone)
TABACCO
SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Chenopodium album</i> (Farinello comune)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella comune)
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Giovone)
<i>Portulaca oleracea</i> (Porcellana comune)

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

CONTATTO® 320

Erbicida di post-emergenza selettivo per barbabietola da zucchero, da foraggio e bietola rossa.



1 l



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Fenmedifam 29,15 g (320 g/l)	HRAC C1	N. REGISTRAZIONE: 9790 del 30-10-1998
--	---	------------	--

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero e da foraggio, Bietola rossa	2-3 l/ha	Dall'emergenza della coltura fino alla chiusura delle file. Consigliato in miscela con prodotti a base di Etofumesate con coltura allo stadio di almeno 2-4 foglie vere.	-

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
<i>Amaranthus retroflexus</i> (Amaranto comune)
<i>Chenopodium album</i> (Farinaccio comune)
<i>Daucus carota</i> (Carota selvatica)
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Giavona comune)
<i>Fumaria officinalis</i> (Fumaria)
<i>Lamium amplexicaule</i> (Falsa ortica reniforme)
<i>Mercurialis annua</i> (Mercorella comune)
<i>Lolium multiflorum</i> (Loglio italico)
<i>Papaver</i> (Papavero comune)
<i>Polygonum aviculare</i> (Correggiola)
<i>Polygonum convolvulus</i> (Poligono convolvolo)
<i>Polygonum lapathifolium</i> (Poligono nodoso)
<i>Rapistrum rugosum</i> (Rapistro peloso)
<i>Senecio</i> (Erba calderina)
<i>Setaria verticillata</i> (Pabbio verticillato)
<i>Stellaria media</i> (Centocchio)
<i>Urtica dioica</i> (Ortica minore)
<i>Veronica hederifolia</i> (Veronica comune)



Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo:
H318 - H410 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

DAVAI®

Erbicida di post-emergenza, selettivo per la soia con formulazione innovativa **i**ready ad elevata biodisponibilità.



1 l



FORMULAZIONE: Concentrato solubile	COMPOSIZIONE: Imazamox 7,62 g (80 g/l)	HRAC B	N. REGISTRAZIONE: 17209 del 21-10-2019
---------------------------------------	---	-----------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Soia	0,5 - 0,65 l/ha	In post-emergenza della coltura tra lo stadio di 2 e 4 foglie trifogliate	-

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Amaranthus retroflexus</i> (Amaranto comune)	<i>Abutilon theophrasti</i> (Cencio molle)
<i>Datura stramonium</i> (Stramonio)	<i>Amaranthus blitoides</i> (Amaranto blitoide)
<i>Polygonum</i> spp. (Poligoni)	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (Ambrosia)
<i>Salsola kali</i> (Erba kali)	<i>Chenopodium album</i> (Farinello)
<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)	<i>Echinochloa crus-galli</i> (Giavone)
<i>Sorghum halepense</i> (Sorghetta)	<i>Mercurialis annua</i> (Mercorella comune)



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H319 - H332 - H410 - EUH401 - H361d

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

ELEGANT® 2FD

Erbicida dicotiledonica di post-emergenza, selettivo per frumento ed orzo.



0,75 l



FORMULAZIONE: Suspoemulsione	COMPOSIZIONE: Florasulam 0,6 g (6,25 g/l) 2,4 D 42,3 g (452 g/l)	HRAC: Gruppo O e B	N. REGISTRAZIONE: 16553 del 24-12-2015
---------------------------------	--	--------------------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero e duro, Orzo	0,75 l/ha	Impiegare in post-emergenza da inizio accestimento fino alla levata	-

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Galium aparine</i> (Attaccamani)	<i>Cirsium arvense</i> (Stoppione)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del pastore)	<i>Fumaria officinalis</i> (Fumaria)
<i>Anthemis</i> spp. (Camomilla)	
<i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla volgare)	
<i>Stellaria media</i> (Centocchio)	
<i>Hypocoum imberbe</i> (Cornacchina a foglie grandi)	
<i>Chrysanthemum segetum</i> (Crisantero campestre)	
<i>Sonchus oleraceus</i> (Grespino comune)	
<i>Papaver rhoeas</i> (Papavero)	
<i>Fallopia convolvulus</i> (Poligono convolvolo)	
<i>Sinapis arvensis</i> (Senape)	



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H317 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

FEINZIN® 70 DF

Erbicida di pre-semina/emergenza per soia, patata, pomodoro e altre colture orticole e di post-emergenza per carota, frumento e orzo.



0,25 kg



FORMULAZIONE: Microgranuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Metribuzin 70 g (700 g/kg)	HRAC: C1	N. REGISTRAZIONE: 14058 del 17-01-2012
--	---	-------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Patata	0,25 - 0,4 kg/ha	In pre-emergenza; dose maggiore sui terreni pesanti	-
	0,25 - 0,3 kg/ha	In post-emergenza; dose maggiore sui terreni pesanti	
Pomodoro	0,25 - 0,3 kg/ha	In pre-semina e pre-trapianto; intervenire 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senza interrare	30 giorni
	0,25 - 0,4 kg/ha	In post-emergenza e post-trapianto; intervenire quando le piantine hanno differenziato almeno 8-9 foglie	
Carota	0,25 - 0,35 kg/ha	Trattare in post-emergenza dallo stadio di 3 foglie vere	60 giorni
Soia	0,25 - 0,35 kg/ha	In pre-semina o pre-emergenza. Non impiegare in terreni molto leggeri o torbosi	60 giorni
Erba medica	0,5 - 0,75 kg/ha	Adottare la dose minore su terreni leggeri e la dose maggiore su terreni a medio impasto, pesanti e molto pesanti, intervenendo in autunno dopo l’ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo	60 giorni
Frumento tenero e duro, Orzo	0,1 kg/ha	Intervenire in post-emergenza dallo stadio di 2 foglie a fine accestimento	-
Pisello, Cece, Fava, Favino, Lentichia	0,15-0,20 kg/ha	In pre-emergenza	-
Finocchio trapiantato	0,15 kg/ha	Applicare in post-trapianto, dopo il superamento della crisi di trapianto	40 giorni
Asparago	0,25-0,5 kg/ha	Applicare in pre-emergenza dei turioni su asparagie di almeno 2 anni. Impiegare la dose inferiore nei terreni particolarmente sciolti	-
	0,25-0,4 kg/ha	Applicare in post-raccolta su asparagie di almeno 2 anni. Impiegare la dose inferiore nei terreni particolarmente sciolti	

Per le colture registrate è possibile anche l’applicazione su colture porta seme con le stesse modalità.

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di volpe)	<i>Mercurialis annua</i> (Mercorella)
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)	<i>Panicum</i> spp. (Panico)
<i>Anagallis arvensis</i> (Anagallide)	<i>Poa annua</i> (Fienarola)
<i>Atriplex patula</i> (Atriplice maggiore)	<i>Polygonum</i> spp. (Poligono)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del pastore)	<i>Portulaca oleracea</i> (Erba porcellana)
<i>Centaurea cyanus</i> (Fiordaliso)	<i>Raphanus raphanistrum</i> (Ravanella selvatica)
<i>Chenopodium album</i> (Farinaccio)	<i>Senecio vulgaris</i> (Erba calderina)
<i>Chenopodium</i> spp. (Farinello)	<i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella)	<i>Sonchus oleraceus</i> (Crespino comune)
<i>Fumaria</i> spp. (Fumaria)	<i>Spergula arvensis</i> (Spergola)
<i>Geranium</i> spp. (Geranio)	<i>Stellaria media</i> (Centocchio)
<i>Lamium</i> spp. (Falsa ortica)	<i>Thlaspi</i> spp. (Erba storna)
<i>Lolium</i> spp. (Loglio)	<i>Urtica dioica</i> (Ortica)
<i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla)	<i>Veronica</i> spp. (Veronica)



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

GOLTIX®

Erbicida dicotiledonica di pre e post-emergenza, selettivo per la barbabietola da zucchero.



FORMULAZIONE: Microgranulare idrodispersibile	COMPOSIZIONE: Metamitron 70 g (700 g/kg)	HRAC: C1	N. REGISTRAZIONE: 2732 del 16-01-1978
--	---	-------------	--

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero	2-5 kg/ha	Pre-emergenza (1 applicazione per anno)	-
	2-3 kg/ha + 0,6-2 kg/ha	Pre-emergenza (1 applicazione per anno) + post emergenza (1-3 applicazioni per anno)	
	0,5-1 kg/ha	Post-emergenza (1-3 applicazioni per anno)	

Non superare la dose massima di 5kg/ha di prodotto per anno.

GOLTIX® SUPER

Erbicida dicotiledonica di pre e post-emergenza, selettivo per la barbabietola da zucchero.



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Metamitron puro 30,7 g (= 350 g/l) Etofumesate puro 13,16 g (= 150 g/l)	HRAC: Gruppo 5 (C1) e 15 (K3)	N. REGISTRAZIONE: 17580 del 21-12-2021
--	---	----------------------------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero	3 l/ha (pre-em.) + 1.5 l/ha (post-em.)	Pre-emergenza (massimo 1 applicazione all'anno) + post-emergenza (da 1 a 5 applicazioni all'anno, senza superare la dose di 1.5 l/ha per applicazione)	-
	1.1 - 2 l/ha	Post-emergenza, da 3 a 5 applicazioni all'anno	

Non superare la dose massima di 6 l/ha di prodotto per anno.

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)
<i>Capsella bursapastoris</i> (Borsa del pastore)
<i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla)
<i>Stellaria media</i> (Centocchio)
<i>Polygonum aviculare</i> (Correggiola)
<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)
<i>Chenopodium album</i> (Farinello)
<i>Papaver rhoeas</i> (Papavero)
<i>Fallopia convolvulus</i> (Poligono convolvolo)
<i>Persicaria maculosa</i> (Poligono persicaria)
<i>Veronica persica</i> (Veronica comune)
<i>Viola arvensis</i> (Viola dei campi)



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H302 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Chenopodium album</i> (Farinello comune)	<i>Polygonum aviculare</i> (Centinoda)
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Giavone comune)	



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H401 - H411 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

LENNS®

Erbicida ad azione fogliare e residuale ad ampio spettro, per frutticole, vite, olivo e aree incolte.



5l



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Glifosate acido 21,76 g (250 g/l) (da sale isopropilamminico) Diflufenican 3,48 g (40 g/l)	HRAC: Gruppo G e F1	N. REGISTRAZIONE: 16051 del 25-03-2014
--	---	---------------------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Olivo da olio e da tavola	4,5 - 6 l/ha	Dosaggio per applicazione in banda: distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari, su una superficie pari al massimo al 66% dell'appezzamento, pari ad un dosaggio in banda di 3-4 litri di prodotto	21 giorni Applicare su suolo privo di olive destinate al consumo ed escludere alla raccolta il contatto diretto delle olive col suolo trattato
	3 - 4 l/ha	Dosaggio per applicazioni a pieno campo	
Vite da vino e da tavola	4 - 6 l/ha	Dosaggio per applicazione in banda: distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari, su una superficie pari al massimo al 50% dell'appezzamento, pari ad un dosaggio in banda di 2-3 litri di prodotto	Entro la fioritura o dopo la raccolta
	3 - 4 l/ha	Dosaggio per applicazioni a pieno campo	
Melo, Pero	4 - 6 l/ha	Dosaggio per applicazione in banda: distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari, su una superficie pari al massimo al 50% dell'appezzamento, pari ad un dosaggio in banda di 2-3 litri di prodotto	14 giorni
	3 - 4l/ha	Dosaggio per applicazioni a pieno campo	
Pesco, Nettareino, Albicocco, Susino, Ciliegio	4 - 6 l/ha	Dosaggio per applicazione in banda: distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari, su una superficie pari al massimo al 50% dell'appezzamento, pari ad un dosaggio in banda di 2-3 litri di prodotto	Entro la fioritura o dopo la raccolta
	3 - 4 l/ha	Dosaggio per applicazioni a pieno campo	
Limone, Arancio, Mandarino, Clementino, Bergamotto	4 - 6 l/ha	Dosaggio per applicazione in banda: distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari, su una superficie pari al massimo al 50% dell'appezzamento, pari ad un dosaggio in banda di 2-3 litri di prodotto	14 giorni
	3 - 4 l/ha	Dosaggio per applicazioni a pieno campo	
Frutta a guscio	4 - 6 l/ha	Applicazione in banda: distribuire il prodotto in modo localizzato lungo i filari (su una superficie pari al massimo al 50% dell'appezzamento) alla dose di 4-6litri per ha (pari a 2-3 litri di prodotto in banda)	Entro la fioritura o dopo la raccolta
	3 - 4 l/ha	Dosaggio per applicazioni a pieno campo	
Aree non coltivate (superfici permeabili)	4 l/ha	Applicare su infestanti in attiva crescita non oltre i 20 cm di altezza	-

LEOPARD® 5 EC

Erbicida residuale di pre e post-emergenza precoce, selettivo per orticole, frutticole, vite ed estensive.



1l

5l



FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile	COMPOSIZIONE: Quizalofop-p-etile 5,4 g (50 g/l)	HRAC: A	N. REGISTRAZIONE: 11243 del 15-03-2002
--	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Cavoli a testa, Cavolfiore, Broccolo	1 - 3 l/ha	Applicare da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni
Pomodoro e Melanzana	1 - 3 l/ha	Applicare da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni
Colza, Patata, Erba medica, Trifoglio e Veccia	1 - 3 l/ha	Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno	100 giorni per Colza; 30 giorni per Patata
Tabacco	1 - 3 l/ha	Applicare fino al termine dell'allungamento degli internodi. Massimo 1 trattamento/anno	40 giorni
Vite da vino e da tavola, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Pesco e Nettareino	1 - 3 l/ha	Applicare prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica. Massimo 1 trattamento/anno	45 giorni per Vite; 30 giorni per Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Pesco e Nettareino
Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio e Frutta a guscio	1 - 3 l/ha	Trattamento in assenza di frutti. Massimo 1 trattamento/anno	-
Ornamentali, Vivai e Forestali	1 - 3 l/ha	Trattamento di post-emergenza delle malerbe solo mediante l'impiego di attrezzature schermate. Massimo 1 trattamento/anno	-
Lino e Cotone	1 - 3 l/ha	Trattamento di post-emergenza prima che le parti eduli della coltura si siano formate. Massimo 1 trattamento/anno	60 giorni per Cotone
Soia, Girasole, Barbabietola da zucchero, Barbabietola rossa e da foraggio	1 - 2,5 l/ha	Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno	60 giorni
Cipolla, Aglio, Scalogno	1 - 2,5 l/ha	Applicare fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni
Carota, Rapa e Ravanello	1 - 2,5 l/ha	Applicare fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni
Cece, Lentichia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino e Pisello	1 - 2,5 l/ha	Applicare fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno	30 giorni per Cece, Lentichia, Fagiolo e Pisello (consumo secco); 42 giorni per Fagiolo e Pisello (consumo fresco), Fagiolino, Favino e Fava
Cardo (uso non alimentare)	1 - 2 l/ha	Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno	-

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI		
GRAMINACEE ANNUALI		GRAMINACEE POLIENNALI
Alopecurus spp. (Coda di topo)	Lolium spp. (Loietto)	Agropyron repens (Agropiro comune)
Avena spp. (Avena)	Phalaris spp. (Scagliola)	Cynodon dactylon (Gramigna comune)
Digitaria spp. (Sanguinella)	Poa annua (Fienarola)	Sorghum halepense (Sorghetta da seme)
Echinochloa spp. (Giavone)	Setaria spp. (Pabbio)	



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo: H304 - H315 - H319 - H336 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

NICOGAN® V.O.

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais.



FORMULAZIONE: Olio dispersibile	COMPOSIZIONE: Nicosulfuron 4,1 g (40 g/l)	HRAC: B	N. REGISTRAZIONE: 13242 del 10-06-2010
------------------------------------	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Mais	1 - 1,5 l/ha	Sulle infestanti sensibili e presenti nelle prime fasi di sviluppo. Intervenire in post-emergenza della coltura e delle infestanti fino alle 5-8 foglie della coltura	-
	1 + 0,5 l/ha	In presenza di infestanti a foglia larga sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in 2 interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni. Intervenire in post-emergenza della coltura e delle infestanti fino alle 5-8 foglie della coltura	

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di volpe)
<i>Echinochloa crus galli</i> (Giavone comune)
<i>Setaria</i> spp. (Panicastrella)
<i>Sorghum halepense</i> da seme e rizoma (Sorghetta)
DICOTILEDONI
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del pastore)
<i>Fumaria officinalis</i> (Fumaria)
<i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla)
<i>Mercurialis annua</i> (Mercurella)
<i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica)
<i>Sonchus oleraceus</i> (Crespigno)
<i>Stellaria media</i> (Centocchio)

SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
GRAMINACEE
<i>Panicum</i> spp. (Panico)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella)
DICOTILEDONI
<i>Galinsoga parviflora</i> (Galinsoga)
<i>Polygonum persicaria</i> (Persicaria)
<i>Polygonum lapathifolium</i> (Persicaria maggiore)
<i>Datura stramonium</i> (Stramonio)
<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H317 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

POSTSCRIPT® 80

Erbicida per Risi FullPage.



FORMULAZIONE: Concentrato Solubile	COMPOSIZIONE: Imazamox puro 7,62 g (80 g/l)	HRAC: 2	N. REGISTRAZIONE: 17585 del 23-12-2021
---------------------------------------	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Riso FullPage/ resistente IMI	0,4375 lt/ha	Due applicazioni intervallate di 20 gg Sommergere la risaia 3/4 giorni dopo ogni intervento	-

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
Eterantere (<i>Heteranthera</i> spp.)
Riso crodo (<i>Oryza sativa</i>)
Sanguinella comune (<i>Digitaria sanguinalis</i>)

SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Ammannia arrossata</i> (<i>Ammannia coccinea</i>)
Eterantera a fiori bianchi (<i>Heteranthera reniformis</i>)
Giavone rosso (<i>Echinochloa crus-galli</i>)
Poligono persicaria (<i>Persicaria maculosa</i>)
Vandellia delle risaie (<i>Lindernia dubia</i>)

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H319 - H332-H361d - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

PRAXIM®

Erbicida di pre-emergenza della soia, del girasole, della patata e del favino.



FORMULAZIONE:	COMPOSIZIONE:	HRAC:	N. REGISTRAZIONE:
Sospensione concentrata	Metobromuron puro 41 g (=500 g/L)	C2	17066 del 06-10-2017

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Soia, Girasole	2-3 l/ha	Impiegare in pre-emergenza della coltura, preferibilmente entro 5 giorni dalla semina e prima della nascita della pianta	-
Patata	3-4 l/ha	Impiegare in pre- emergenza della coltura subito dopo la messa a dimora dei tuberi o successivamente prima della nascita della pianta	
Favino (produzione da seme)	2 l/ha	Impiegare in pre-emergenza della coltura, preferibilmente entro 5 giorni dalla semina e prima della nascita della pianta	

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
GRAMINACEE
Giavone comune (<i>Echinochloa Crus galli</i>)
Fienarola annuale (<i>Poa annua</i>)
Falso Panico (<i>Setaria viridis</i>)
DICOTILEDONI
Amaranto (<i>Amaranthus</i> sp.)
Ambrosia (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)
Borsa del pastore (<i>Capsella vulgaris</i>)
Cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>)
Centocchio Comune (<i>Stellaria media</i>)
Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>)
Farinaccio (<i>Chenopodium</i> sp.)
Galinsoga (<i>Galinsoga Parviflora</i>)
Ibisco dei fossi (<i>Hibiscus trionum</i>)
Matricarie (<i>Matricaria</i> sp.)
Mercorella Comune (<i>mercurialis annua</i>)
Poligono (<i>Polygonum</i> sp.)
Porcellana comune (<i>Portulaca oleracea</i>)
Senecio Comune (<i>Senecio Vulgaris</i>)
Senape Selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>)
Viola selvatica (<i>Viola arvensis</i>)

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H373 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

PYXIDES® DUO

Erbicida dicotiledonica di post-emergenza, selettivo per il mais.



FORMULAZIONE:	COMPOSIZIONE:	HRAC:	N. REGISTRAZIONE:
Sospensione concentrata	Mesotrione 4,46 g (50 g/l) Dicamba 10,7 g (120 g/l)	Gruppo F2 e O	15753 del 09-08-2017

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Mais	1-2 l/ha	Intervenire in post-emergenza con Mais dalla 2° foglia a non oltre la 9° foglia. Applicare 1,5 l/ha nella generalità dei casi. In caso di malerbe a nascita scalare è consigliabile effettuare due applicazioni frazionate (1,3 l/ha + 0,7 l/ha)	-

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
<i>Abutilon theophrasti</i> (Cencio molle)
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (Ambrosia con foglie di artemisia)
<i>Calystegia sepium</i> (Vilucchione)
<i>Chenopodium album</i> (Farinaccio)
<i>Cirsium arvense</i> (Stoppione)
<i>Polygonum persicaria</i> (Persicaria)
<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)
<i>Xanthium</i> spp. (Nappola italiana)

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

STOPPER P

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per frumento, orzo, segale, triticale.



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Pendimetalin 35,62 g (400 g/l) Diflufenican 3,56 g (40 g/l)	HRAC: Gruppo K1 e F1	N. REGISTRAZIONE: 15229 del 28-10-2013
--	---	----------------------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento, orzo, segale, triticale	1,5-2,5 l/ha	In pre-emergenza o in post-emergenza precoce (fino ad accestimento). Effettuare un solo trattamento per stagione	90 giorni

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del Pastore)	<i>Chenopodium album</i> (Farinaccio)
<i>Papaver rhoeas</i> (Papavero)	<i>Fumaria officinalis</i> (Fumaria)
<i>Polygonum aviculare</i> (Correggiola)	<i>Lolium</i> spp. (Loglietto)
<i>Polygonum persicaria</i> (Poligono persicaria)	<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di volpe)
<i>Sinapis arvensis</i> (Senape)	<i>Senecio vulgaris</i> (Senecio)
<i>Stellaria media</i> (Centocchio)	<i>Sonchus</i> spp. (Sonco)
<i>Veronica</i> spp. (Veronica)	
<i>Viola</i> spp. (Viola)	
<i>Calepina</i> spp. (Calepina)	
<i>Poa</i> spp. (Poa)	
<i>Lamium purpureum</i> (Falsa ortica)	
<i>Matricaria</i> spp. (Camomilla)	

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

SULCOTREK®

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per il mais.



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Terbutilazina 28,4 g (327 g/l) Sulcotrione 15 g (173 g/l)	HRAC: Gruppo C1 e F2	N. REGISTRAZIONE: 10585 del 06-09-2000
--	---	----------------------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Mais	2 - 2,6 l/ha	In pre-emergenza oppure in post-emergenza della coltura fino allo stadio di 6 foglie. In post-emergenza intervenire con infestanti nei primi stadi di sviluppo (entro la 4ª foglia). Effettuare un solo trattamento per stagione.	-

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
IN PRE-EMERGENZA	<i>Echinochloa crus galli</i> (Giavone comune)
<i>Abutilon Theophrasti</i> (Cencio molle)	<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella) in post-emergenza
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)	
<i>Chenopodium album</i> (Farinello comune)	
<i>Datura stramonium</i> (Stramonio)	
<i>Polygonum persicaria</i> (Persicaria)	
<i>Portulaca oleracea</i> (Porcellana comune)	
<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)	
IN POST-EMERGENZA	
<i>Abutilon Theophrasti</i> (Cencio molle)	
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del Pastore)	
<i>Chenopodium album</i> (Farinello comune)	
<i>Datura stramonium</i> (Stramonio)	
<i>Mercurialis annua</i> (Mercorella comune)	
<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)	
<i>Xanthium strumarium</i> (Lappola)	

NOTA: in seguito al rinnovo della Sostanza Attiva Terbutilazina è stato introdotto il vincolo di applicazione ogni tre anni; la misura di applicare il prodotto ogni tre anni sullo stesso appezzamento si applica per tutte le applicazioni effettuate successivamente al 14 giugno 2022 come da Comunicato_Reg_UE_2021_824 del 10 Giugno 2021.

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H302 - H317 - H361d - H373 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

SULTAN®

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per colza, cavoli e aglio.



1 l



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Metazaclor 44,3 g (500 g/l)	HRAC: K3	N. REGISTRAZIONE: 11526 del 06-12-2002
--	--	-------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Aglio	1,5 - 2 l/ha	Subito dopo la messa a dimora dei bulbilli o in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie	-
Colza	2 l/ha	In pre-emergenza, subito dopo la semina ed al più tardi entro 3 giorni. In post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime 2 foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula	
Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia	1,5 - 2 l/ha	Subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto. In caso di abbondanti irrigazioni, impiegare il dosaggio più basso	

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
MONOCOTILEDONI ANNUALI
<i>Apera spica-venti</i> (Capellini dei campi)
<i>Alopecurus</i> spp. (Coda di topo)
<i>Poa</i> spp. (Fienarola)
<i>Echinochloa</i> spp. (Giavone)
<i>Lolium</i> spp. (Loglio)
<i>Setaria</i> spp. (Pabbio)
<i>Digitaria sanguinalis</i> (Sanguinella comune)
DICOTILEDONI ANNUALI
<i>Amaranthus retroflexus</i> (Amaranto comune)
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa pastore)
<i>Matricaria</i> spp. (Camomilla)
<i>Anthemis</i> spp. (Camomilla inodore)
<i>Stellaria</i> spp. (Centocchio)
<i>Lamium</i> spp. (Falsa ortica)
<i>Chenopodium</i> spp. (Farinello)
<i>Sonchus</i> spp. (Grespino)
<i>Mercurialis annua</i> (Mercorella comune)
<i>Solanum</i> spp. (Erba morella)
<i>Myosotis</i> spp. (Nontiscordardime)
<i>Urtica urens</i> (Ortica minore)
<i>Papaver</i> spp. (Papavero)
<i>Polygonum persicaria</i> (Persicaria)
<i>Ranunculus</i> spp. (Ranuncolo)
<i>Veronica</i> spp. (Veronica)



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H302 - H317 - H351 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

TAIFUN® MK CL

Erbicida non selettivo per frutticole, vite, olivo, orticole e preparazione dei letti di semina di mais, cereali e altre colture.



1 l

5 l

20 l



FORMULAZIONE: Soluzione concentrata	COMPOSIZIONE: Glifosate acido 30,8 g (360 g/l) (da sale isopropilamminico)	HRAC: G	N. REGISTRAZIONE: 15401 del 22-06-2012
--	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Diserbo lungo la fila: Agrumi, Melo, Pero, Noce, Nocciolo, Olivo, Vite da vino e da tavola, Albicocco, Ciliegio, Nettareina, Pesco, Susino, Mandorlo. Diserbo interfila: Carciofo, Carota, Fagiolino, Fava, Melanzana, Pisello, Pomodoro, Patata, Mais, Soia, Barbabietola da zucchero, Rosa, Viviai e Semenzali di Floreali, Ornamentali, Forestali, Pioppo. In assenza della coltura su terreni destinati a Fragola, Ortaggi, Barbabietola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Mais, Soia, Prati, Vivaia. Incolti (aree rurali e industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline di asciutta)	1 - 3 l/ha	Annuali e biennali: Coda di volpe, Avena, Loietto, Mercorella, Fienarola, Riso Crodo, Visnaga maggiore, Amaranto, Calendula, Farinaccio, Succhiamele, Porcellana, Rafano, Senecio, Senape, Centocchio, Veronica	7 giorni per Olivo da olio
	3,5 - 4,5 l/ha	Perenni: Gramaccia, Carice, Cardo campestre, Euforbia, Gramignone, Iperico, Asperella, Falaride, Romice, Grespino, Sorghetta	
	5 - 6 l/ha	Perenni: Piantaggine d'acqua, Asfodelo, Giunco, Giunco fiorito, Cipollino, Ferula, Nardo, Scirpo, Coltellaccio, Tossilagine	
	7 - 9 l/ha	Perenni: Capellini dei campi, Aglio selvatico, Assenzio selvatico, Canna selvatica, Gramigna, Panaceo, Ellera, Ossalide, Cannuccia, Felce, Ranuncolo, Rofo, Tifa, Ortica	
	10 l/ha	Perenni: Aristolochia, Clematide, Vilucchio, Robbia	
	4 - 6 l/ha	Arbusti: Acero, Frassino, Ginestra, Salice, Sambuco, Mirtillo	
	10 l/ha	Arbusti: Brugo, Cisto, Erica, Caprifoglio	

Su olivo non superare la dose di 6 l/ha.
Attenzione: il prodotto non è selettivo. Seguire le modalità d’impiego e utilizzare le attrezzature indicate in etichetta per salvaguardare le colture.

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI
1 - 3 l/ha
<i>Alopecurus</i> sp. (Coda di volpe), <i>Avena</i> sp. (Avena), <i>Lolium</i> sp. (Loglietto), <i>Mercurialis</i> sp. (Mercorella), <i>Poa</i> sp. (Fienarola), <i>Oriza sativa</i> var. <i>silvatica</i> (Riso crodo), <i>Amma majus</i> (Visnaga maggiore), <i>Amaranthus</i> sp. (Amaranto), <i>Calendula</i> sp. (Calendula), <i>Chenopodium</i> sp. (Farinaccio), <i>Orobanche</i> (Succhiamele), <i>Portulaca</i> sp. (Porcellana comune), <i>Raphanus</i> sp. (Rafano), <i>Senecio</i> sp. (Senecio), <i>Sinapis</i> sp. (Senape), <i>Stellaria</i> sp. (Centocchio), <i>Veronica</i> sp. (Veronica)
SPECIE INFESTANTI VIVACI E PERENNI
3,5 - 4,5 l/ha
<i>Agropyron repens</i> (Gramaccia), <i>Carex</i> sp. (Carice), <i>Cirsium</i> sp. (Cardo campestre), <i>Euphorbia</i> sp. (Euforbia), <i>Glyceria</i> sp. (Gramignone), <i>Hipericum</i> sp. (Iperico), <i>Leersia oryzoidea</i> (Asperella), <i>Phalaris</i> sp. (Falaride), <i>Rumex</i> sp. (Romice), <i>Sonchus</i> sp. (Grespino), <i>Sorghum halepense</i> (Sorghetta)
5 - 6 l/ha
<i>Alisma</i> sp. (Piantaggine d'acqua), <i>Asfodelus</i> sp. (Asfodelo), <i>Butomus</i> sp. (Giunco fiorito), <i>Cyperus</i> sp. (Cipollino), <i>Ferula</i> sp. (Ferula), <i>Juncus</i> sp. (Giunco), <i>Nardus</i> sp. (Nardo), <i>Scirpus</i> sp. (Scirpo), <i>Sparganium</i> sp. (Coltellaccio), <i>Tussilago</i> sp. (Tossilagine)
7 - 9 l/ha
<i>Agrostis</i> sp. (Capellini dei campi), <i>Alium</i> sp. (Aglio selvatico), <i>Artemisia</i> sp. (Assenzio selvatico), <i>Arundo</i> sp. (Canna selvatica), <i>Cynodon</i> sp. (Gramigna), <i>Eraglum</i> sp. (Panaceo), <i>Glechoma</i> sp. (Ellera), <i>Oxalis</i> sp. (Ossalide), <i>Paspalum</i> sp., <i>Phragmines</i> sp. (Cannuccia), <i>Pteridium</i> sp. (Felce), <i>Ranunculus</i> sp. (Ranuncolo), <i>Rubus</i> sp. (Rovo), <i>Tipha</i> sp. (Tifa), <i>Urtica</i> sp. (Ortica)
10 l/ha
<i>Aristolochia</i> sp. (Aristolachia), <i>Clematis</i> sp. (Clematide), <i>Convolvulus</i> sp. (Vilucchio), <i>Rubia peregrina</i> (Robbia)
SPECIE INFESTANTI ARBOREE ED ARBUSTIVE
4 - 6 l/ha
<i>Acer</i> sp. (Aceri), <i>Fraxinus</i> sp. (Frassino), <i>Genista</i> sp. (Ginestra), <i>Salix</i> sp. (Salice), <i>Sambucus</i> sp. (Sambuco), <i>Vaccinium</i> sp. (Mirtillo)
10 l/ha
<i>Calluna</i> sp. (Brugo), <i>Cistus</i> sp. (Cisto), <i>Erica</i> sp. (Erica), <i>Lonicera</i> sp. (Caprifoglio)

Indicazioni di pericolo:
EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

TIMELINE® TRIO

Erbicida cross-spectrum di post-emergenza, selettivo per frumento tenero e duro.



FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile	COMPOSIZIONE: Pinoxaden 2,94 g (30 g/l) Clodinafop-propargyl 2,94 g (30 g/l) Florasulam 0,73 g (7,5 g/l) Cloquintocet-mexyl 0,73 g (7,5 g/l)	HRAC: Gruppo A e B	N. REGISTRAZIONE: 14935 del 18-10-2011
--	--	--------------------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero e duro	1 l/ha	Post-emergenza: applicazione con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di inizio levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata (graminacee) o fra lo stadio dicotiledoni e quello di abbozzi fiorali (dicotiledoni)	-

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di volpe)	<i>Matricaria chamomilla</i> (Camomilla comune)
<i>Apera spica-venti</i> (Capellino dei campi)	<i>Stellaria media</i> (Centocchio)
<i>Avena</i> spp. (Avena)	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del Pastore)
<i>Lolium</i> spp. (Loglio)	<i>Diploaxis erucoides</i> (Ruchetta violacea)
<i>Phalaris paradoxa Phalaris brachystachys</i> (Falaride o Scagliola)	<i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica)
<i>Poa trivialis</i> (Fienarola comune)	<i>Raphanus raphanistrum</i> (Ravanello selvatico)
<i>Galium aparine</i> (Attaccamani)	Bifora radians (Coriandolo puzzolente)
<i>Papaver rhoeas</i> (Papavero)	Vicia sativa (Veccia dolce)

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H317 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

TOMIGAN®

Erbicida selettivo per frumento, segale, tritcale, orzo, avena, mais, cipolla, pomacee, drupacee, agrumi, olivo, prati/pascoli, aree non coltivate.



FORMULAZIONE: Emulsione concentrata	COMPOSIZIONE: Fluroxipir puro 29,2 g (=200 g/l)	HRAC: O	N. REGISTRAZIONE: 16312 del 13-01-2022
--	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero e duro, segale, tritcale, orzo, avena	0,75 – 1 l/ha	Applicare in post-emergenza, dall’accestimento alla fine della levata. È consentita una sola applicazione l’anno.	-
Mais	0.75–1 l/ha (unico intervento) 0.4–0.5 l/ha (intervento frazionato)	Applicare in post-emergenza della coltura, dalla terza all’ottava foglia. Non superare la dose di 1 l/ha per stagione	-
Cipolla	0,4–0,5 l/ha	Applicare in post-emergenza delle infestanti, quando la coltura ha raggiunto la terza foglia	90
Prati/pascoli (escluse leguminose foraggere)	1.5 l/ha	Applicare su coltura affrancata. È consentita una sola applicazione	15
Aree non coltivate: alla dose di 1–1,5 l/ha, con 200-400 litri d’acqua ettaro	1–1.5 l/ha	Applicare in post-emergenza delle malerbe; sono consentite 2 applicazioni l’anno nel periodo primaverile e autunnale	-
Pomacee (melo, pero), drupacee (albicocco, pesco, nettarino, ciliegio, susino) e agrumi	1 - 1.5 l/ha	Applicare in post-emergenza delle infestanti alla dose di 1,5 l/ha in applicazioni primaverili, oppure, alla dose di 1 l/ha. È consentita una sola applicazione l’anno	15
Olivo (da olio e da tavola)	1.5–2 l/ha per il controllo delle malerbe. 0.35–0.67 l/hl, per il controllo dei polloni (applicazioni localizzate sulla zona dei polloni)	Per il controllo delle malerbe, applicare in post-emergenza delle infestanti. Per il controllo dei polloni, eseguire un’applicazione localizzata, nel periodo primaverile, sulla zona dei polloni con 300 litri d’acqua ettaro. Impiegare su polloni erbacei di 10–15 cm di lunghezza con schermature idonee ad impedire che la deriva raggiunga la chioma della coltura. È consentita una sola applicazione l’anno	30 giorni per olivo da tavola 90 giorni per olivo da olio

Efficacia d’uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI		SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Attaccamano (<i>Galium aparine</i>)	Malva (<i>Malva</i> sp.)	Acetosella (<i>Oxalis corniculata</i>)
Becco di grù maggiore (<i>Erodium ciconium</i>)	Nappola (<i>Xanthium orientale</i>)	Amaranto (<i>Amaranthus</i> spp.)
Cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>)	Peverina dei campi (<i>Cerastium glomeratum</i>)	Arabetta comune (<i>Arabidopsis thaliana</i>)
Cencio molle (<i>Abutilon theophrasti</i>)	Poligono convolvolo (<i>Fallopia convolvulus</i>)	Aspraggine (<i>Picris echioides</i>)
Centocchio (<i>Stellaria media</i>)	Porcellana (<i>Portulaca oleracea</i>)	Borsa di pastore (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)
Cocomero asinino (<i>Ecballium europaeum</i>)	Romice (<i>Rumex</i> spp.)	Colza (<i>Brassica napus</i>)
Correggiola (<i>Polygonum aviculare</i>)	Saepola (<i>Erigeron</i> sp.)	Chenopodio (<i>Chenopodium album</i>)
Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>)	Senape selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>)	Falsa ortica (<i>Lamium amplexicaule</i>)
Enula cespita (<i>Dittrichia graveolens</i>)	Stramonio (<i>Datura stramonium</i>)	Fumaria (<i>Fumaria officinalis</i>)
Erba medica (<i>Medicago sativa</i>)	Tarassaco (<i>Taraxacum officinale</i>)	Lattuga selvatica (<i>Lactuca serriola</i>)
Fiorrancio selvatico (<i>Calendula arvensis</i>)	Vedovella annuale (<i>Jasione montana</i>)	Camomilla (<i>Matricaria</i> sp.)
Forbicina (<i>Bidens tripartita</i>)	Uccellina comune (<i>Ornithopus compressus</i>)	Mercorella comune (<i>Mercurialis annua</i>)
Geranio (<i>Geranium</i> spp.)	Ventagliina dei campi (<i>Aphanes arvensis</i>)	Nontiscordardime (<i>Myosotis arvensis</i>)
Giunco delle pozze (<i>Juncus bufonius</i>)	Vilucchio (<i>Convolvulus arvensis</i>)	Ortica (<i>Urtica urens</i>)
Grespino comune (<i>Sonchus oleraceus</i>)		Papavero comune (<i>Papaver rhoeas</i>)
		Poligono persicaria (<i>Polygonum persicaria</i>)
		Senecione comune (<i>Senecio vulgaris</i>)

Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo:
H304 - H318 - H336 - H410 - EUH066 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

TOPIK® 240 EC

Erbicida graminicida di post-emergenza, selettivo per frumento tenero e duro.



FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile	COMPOSIZIONE: Clodinafop-propargyl 22,08 g (240 g/l) Cloquintocet-mexyl 5,6 g (60 g/l)	HRAC: A	N. REGISTRAZIONE: 8929 del 01-10-1996
--	--	------------	--

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero e duro	0,25 l/ha	T trattare in post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti tra lo stadio di 3 foglie e levata. Su <i>Lolium</i> non superare lo stadio di accestimento dell'infestante	-

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI
<i>Alopecurus myosuroides</i> (Coda di topo)
<i>Avena</i> spp. (Avena)
<i>Phalaris</i> spp. (Falaride)
<i>Lolium multiflorum</i> , <i>Lolium rigidum</i> (Loglio)
<i>Poa trivialis</i> (Fienarola comune)



Avvertenza: **PERICOLO**

Indicazioni di pericolo:
H304 - H373 - H410 - EUH066 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

TRIMMER® 50 WG

Erbicida dicotiledonica di post-emergenza, selettivo per frumento, orzo, avena e tritcale.



FORMULAZIONE: Granuli idrosolubili	COMPOSIZIONE: Tribenuron-methyl 50 g (500 g/kg)	HRAC: B	N. REGISTRAZIONE: 16575 del 19-09-2018
---------------------------------------	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero e duro, orzo, avena, tritcale	20-30 g/ha	In suoli a reazione acida, dalla terza foglia a botticella	28 giorni prima della raccolta se i cereali sono destinati all'impiego foraggero
	20-28 g/ha	In suoli a reazione alcalina, dalla fase d'inizio accestimento a botticella	

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Borsa del Pastore)	<i>Cirsium arvense</i> (Cardo campestre)
<i>Matricaria</i> spp. (Camomilla)	<i>Stellaria media</i> (Centocchio)
<i>Anthemis arvensis</i> (Camomilla bastarda)	<i>Fumaria officinalis</i> (Fumaria)
<i>Fallopia convolvulus</i> (Convolvolo nero)	<i>Veronica</i> spp. (Veronica)
<i>Papaver rhoeas</i> (Papavero)	<i>Viola arvensis</i> (Viola)
<i>Sinapis arvensis</i> (Senape selvatica)	



Avvertenza: **ATTENZIONE**

Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Erbicida dicotiledonico di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per la soia.



11



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Bifeno 40,6 g (480 g/l)	HRAC: E	N. REGISTRAZIONE: 16616 del 08-03-2018
--	--	------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Soia	1 l/ha	Impiegare in pre-emergenza o post-emergenza precoce della coltura, quando ha differenziato le prime 2-3 foglie vere.	-

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
<i>Amaranthus</i> spp. (Amaranto)	<i>Portulaca</i> spp. (Portulaca)
	<i>Solanum nigrum</i> (Erba morella)
	<i>Chenopodium</i> spp. (Farinaccio)
	<i>Galinsoga parviflora</i> (Galinsoga)
	<i>Viola arvensis</i> (Viola)



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401 - EUH208

Note



FUNGICIDI

SOMMARIO

BANJO®	46
CARSON 45 WG	47
CERERIS	48
EXTASE® R	49
FOLPAN® 80 WDG	50
FOLPAN® GOLD	51
KITAMBA®	52
MAVITA® 250 EC	53
MERPAN® 80 WDG	54
MERPLUS®	55
MEXIRAM® HI BIO	56
MIRADOR® SC	57
MIRADOR® TURBO	58
MOMENTUM®	59
NIMROD® 250 EW	60
QUANTUM® L	61
SCIROCCO 125 EW	62
SEEDRON®	63
SPYRALE®	64
 STAVENTO®	65
TIPTOR® ULTRA	66
ZAKEO® 250 SC	67



BANJO®

Fungicida di copertura contro ticchiolatura e alternaria di melo e pero, maculatura bruna del pero, botrite della vite e peronospora della patata.



11



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Fluazinam 40,2 g (500 g/l)	FRAC: 29	N. REGISTRAZIONE: 13905 del 09-12-2010
--	---	-------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo	Ticchiolatura e Alternaria	70-100 ml/hl	Non superare 1 l/ha e 3 applicazioni all'anno. Iniziare i trattamenti dopo la fase di bottoni rosa. In periodi senza pioggia l'intervallo tra le applicazioni è di 14 giorni	60 giorni
Vite da vino	Botrite Peronospora (in corso di registrazione)	100 - 150 ml/hl	Non superare 1,5 l/ha e 1 applicazione all'anno nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia. Nelle varietà a grappolo compatto effettuare il trattamento in pre-chiusura grappolo	21 giorni
Patata	Peronospora	0,3-0,4 l/ha	Massimo 10 trattamenti/anno. Intervenire prima della comparsa della malattia (normalmente quando le piante hanno raggiunto i 10-15 cm di altezza), ripetendo il trattamento ogni 7-10 giorni, in funzione della piovosità	7 giorni
Pero	Ticchiolatura, Alternaria e Maculatura bruna	70-100 ml/hl	Non superare 1 l/ha e 3 applicazioni all'anno. Iniziare i trattamenti dopo la fase di bottoni rosa. In periodi senza pioggia l'intervallo tra le applicazioni è di 14 giorni	60 giorni

CARSON 45 WG

Fungicida contro la peronospora di vite, pomodoro e patata.



0,5 kg



FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Cymoxanil 45 g (450 g/kg)	FRAC: 27	N. REGISTRAZIONE: 15630 del 20-12-2012
---	--	-------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Peronospora	270 g/ha	Massimo 4 applicazioni/anno dallo stadio di 3-4 foglie vere fino all'invaitura con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	28 giorni
Pomodoro (in campo)	Peronospora	220 g/ha	Massimo 5 applicazioni/ciclo colturale dallo stadio di 3-4 foglie vere fino alla maturazione dei frutti con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	10 giorni per Pomodoro da industria 3 giorni per Pomodoro da mensa
Patata	Peronospora	270 g/ha	Massimo 6 applicazioni/anno dalla comparsa del primo getto basale laterale fino al 50% di foglie brunastre, con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	14 giorni

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H361d - H410 - EUH208 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H302, H361fd, H373, H410, EUH208, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

CERERIS

Fungicida sistemico per il controllo di malattie fogliari e della spiga su frumento e orzo.



1 l



FORMULAZIONE: Emulsione concentrata	COMPOSIZIONE: Protioconazolo 25,38 g (250 g/l)	FRAC: G	N. REGISTRAZIONE: 17803 del 17-02-2021
--	---	------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento, Orzo	Ruggini Fusariosi della spiga	0,8 l/ha	Massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 10-14 giorni da inizio levata. Per il controllo del <i>Fusarium</i> intervenire da spigatura a fioritura	35 giorni

EXTASE® R

Fungicida antiperonosporico che si contraddistingue per l'alta affinità alle cere. È registrato su vite e un ampio numero di colture orticole, tra cui: pomodoro, melone, zucchini, lattuga e altre insalate.



5 kg



FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Mandipropamid 2,5 g (25 g/kg) Rame metallo 13,95 g (139,5 g/kg) (da ossicloruro)	FRAC: Gruppo H e M	N. REGISTRAZIONE: 17657 del 01-09-2020
---	---	--------------------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Peronospora	4-5 kg/ha (400-500 g/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	21 giorni
Pomodoro (pieno campo e serra)	Fitoftora	5 kg/ha (500 g/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	10 giorni per Pomodoro da industria e 3 giorni per Pomodoro da consumo fresco
Melone (pieno campo e serra)	Peronospora	5 kg/ha (500 g/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	7 giorni
Zucchini (pieno campo)	Peronospora	5 kg/ha (500 g/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno con un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni	3 giorni
Lattuga (serra)	Peronospora	5 kg/ha (500 g/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno (pari a 1 trattamento per ciclo colturale, per un totale di 4 cicli colturali per anno)	7 giorni
Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Senape e Juncea (pieno campo e serra)	Peronospora	5 kg/ha (500 g/hl)	In campo: massimo 4 applicazioni/anno (pari a 2 trattamenti per ciclo colturale con intervallo di 7-10 giorni tra i trattamenti, per un totale di 2 cicli colturali per anno) In serra: massimo 4 applicazioni/anno (pari a 1 trattamento per ciclo colturale, per un totale di 4 cicli colturali per anno)	7 giorni

* Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H319 - H335 - H411 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H332 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

FOLPAN® 80 WDG

Fungicida antiperonosporico di copertura ad azione multi-sito, attivo sulle principali patologie fungine di vite, pomodoro, ornamentali e floreali. Ideale per la gestione preventiva delle resistenze.



FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Folpet 80 g (800 g/kg)	FRAC: M4	N. REGISTRAZIONE: 8601 del 03-12-1994
---	---	-------------	--

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Escoriosi, Marciume Nero	2 kg/ha (200 g/hl)	Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/anno per uva da tavola. Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. Intervenire dalla ripresa vegetativa e quando si intravedono le prime foglie aperte	28 giorni per Vite da vino 56 giorni per Vite da tavola
	Peronospora, Botrite, Oidio, Marciumi secondari	1,25-1,5 kg/ha (125-150 g/hl)	Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/anno per uva da tavola. Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. Intervenire dalla pre-fioritura per la protezione dall'Oidio ed in pre-chiusura grappolo per la Botrite. Su Peronospora applicare anche in fase di allevamento e in vivai	
	Marciume bianco (in genere indotta da una grandinata)	1,6-1,8 kg/ha (160-180 g/hl)	Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/anno per uva da tavola. Intervenire tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata. Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni	
Pomodoro (in pieno campo e serra)	Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Septoriosi, Botrite	1,5 kg/ha (150 g/hl)	Massimo 3 trattamenti/anno (serra) e 4 trattamenti/anno (pieno campo); intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni	10 giorni
Floreali ed Ornamentali	Botrite, Marciumi radicali e basali e Peronospora	2-3 kg/ha (200-300 g/hl)	-	-

FOLPAN® GOLD

Fungicida antiperonosporico ad azione preventiva e curativa, ideale per la difesa della vegetazione in fase di accrescimento della vite e dei primi stadi di crescita del grappolo. La sua speciale formulazione NATIVE GOLD conferisce al prodotto notevoli vantaggi in termini di sicurezza per l'operatore e praticità d'uso.



FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Metalaxil-m 4,85 g (48,5 g/kg) Folpet 40 g (400 g/kg)	FRAC: Gruppo 4 e M4	N. REGISTRAZIONE: 12878 del 03-01-2006
---	---	------------------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino	Peronospora	2 kg/ha (200 g/hl)	Massimo 3 trattamenti con cadenza di 7-14 giorni. Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria	28 giorni

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo: H317 - H319 - H351 - H400 - H411 - EUH401

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo: H317 - H319 - H332 - H351 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

KITAMBA®

Fungicida contro peronospora e altre malattie di pomodoro, patata, cucurbitacee, lattughe, carciofo, fragola e contro la peronospora della vite.



Prodotto e marchio di titolarità DIACHEM S.p.a.

FORMULAZIONE:	COMPOSIZIONE:	FRAC:	N. REGISTRAZIONE:
Sospensione concentrata	Rame metallo (solfato tribasico) 15,4 g (200 g/l) Metalaxil-m 1,85 g (24 g/l)	Gruppo M1 e 4	16538 del 26-01-2016

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Peronospora	4 l/ha (400 ml/hl)	Massimo 2-4 trattamenti/anno, intervenendo al verificarsi delle condizioni favorevoli alle infezioni, da pre-fioritura proseguendo a intervalli di 10-14 giorni	28 giorni
Pomodoro (pieno campo e serra)	Peronospora, Alternaria e Batteriosi	4 l/ha	Massimo 3-4 trattamenti/anno; intervallo tra le applicazioni 10-14 giorni	10 giorni
Patata	Peronospora e Alternaria	4 l/ha	Massimo 2-3 trattamenti/anno; intervallo tra le applicazioni 10-14 giorni	20 giorni
Cetriolo e Melone (pieno campo e serra)	Peronospora e Alternaria	4 l/ha	Massimo 2-3 trattamenti/anno; intervallo tra le applicazioni 10-14 giorni	20 giorni per Melone e 15 giorni per Cetriolo
Carciofo e Cocomero (pieno campo)	Peronospora e Alternaria	4 l/ha	Massimo 2-3 trattamenti/anno; intervallo tra le applicazioni 10-14 giorni	20 giorni per Carciofo e 7 giorni per Cocomero
Lattughe e altre insalate (pieno campo e serra)	Peronospora	4 l/ha	Massimo 2-3 trattamenti/anno; intervallo tra le applicazioni 10-14 giorni	15 giorni
Fragola (pieno campo e serra)	Marciume bruno	4 l/ha	Intervenire 15-20 giorni dopo l'impianto e 30 giorni dopo il primo intervento. Massimo 2 trattamenti/anno	40 giorni

*Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all'anno.



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H317 - H319 - H410 - EUH401 - EUH 208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MAVITA® 250 EC

Fungicida sistemico contro ticchiolatura e oidio di melo e pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, e altre malattie di barbabietola da zucchero e orticole.



Prodotto di titolarità del Gruppo Syngenta.

FORMULAZIONE:	COMPOSIZIONE:	FRAC:	N. REGISTRAZIONE:
Concentrato emulsionabile	Difenoconazolo 23,6 g (250 g/l)	G	15293 del 29-12-2011

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi	0,2-0,3 l/ha (20-30 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 21 giorni da copertura fogliare del 10% della superficie del terreno	21 giorni
Melo e Pero	Ticchiolatura, Oidio	0,3 l/ha (15 ml/hl)	Massimo 4 applicazioni a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura	14 giorni
Asparago (pieno campo)	Ruggine e Stenfiliosi dell'asparago	0,5 l/ha (50 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare	-
Carota, Cavolfiore (pieno campo)	Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggine, Septoria	0,4-0,5 l/ha (40-50 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare	14 giorni
Sedano (pieno campo)	Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggine, Septoria	0,4-0,5 l/ha (40-50 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare	14 giorni
Sedano (serra)			Massimo 2 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare	
Patata	Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggine, Septoria	0,4-0,5 l/ha (40-50 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni preventive a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo tuberì	3 giorni
Pomodoro e Melanzana (pieno campo e serra)	Alternaria, Cladosporiosi, Oidio, Micosferella, Ruggine, Septoria	0,4-0,5 l/ha (40-50 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare	7 giorni in pieno campo e 3 giorni in serra
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio, Alternaria	0,5 l/ha (50 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 8 giorni da inizio fioritura	3 giorni
Finocchio (pieno campo)	Ramularia	0,5 l/ha (50 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 8 giorni da inizio sviluppo fogliare	3 giorni
Vite da vino e da tavola	Black-rot, Oidio	0,2 l/ha (20 ml/hl)	Massimo 4 applicazioni a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo	21 giorni
Pesco	Bolla, Monilia	0,3-0,45 l/ha (30 ml/hl)	Massimo 2 applicazioni a cadenza di 7 giorni da apertura gemme	7 giorni
Olivo	Occhio di Pavone	0,5 l/ha (50 ml/hl)	Massimo 2 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo vegetativo	30 giorni
Broccoli (pieno campo)	Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggini, Septoria	0,5 l/ha (50 ml/hl)	Massimo 3 applicazioni a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo germogli	14 giorni



Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo:
H319 - H304 - H410 - EUH401 - EUH066

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MERPAN® 80 WDG

Fungicida di copertura ad azione multi-sito, attivo sulle principali patologie fungine di pomacee (incluse le patologie di post-raccolta), drupacee e frutta a guscio.



MERPLUS®

Fungicida con azione di contatto e sistemica. Protegge sia i tessuti di nuova formazione sia quelli già formati, mostrando un'importante efficacia intrinseca nei confronti di patologie chiave delle pomacee. L'importante sinergia tra le due materie attive, l'azione multi-sito e di stimolo delle difese naturali delle piante, lo rendono strategico nei programmi di difesa.



FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Captano 80 g (800 g/kg)	FRAC: M4	N. REGISTRAZIONE: 8102 del 09-11-1992
---	--	-------------	--

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo, Cotogno, Pero, Nashi	Ticchiolatura, Maculatura bruna del pero, <i>Gleosporium</i> spp.	Massimo 2 kg/ha (150-160 g/hl)	Non superare i 10 trattamenti l'anno	21 giorni
Pesco, Nettareine	Bolla, Corineo, Fusicocco, Moniliosi	Massimo 4,5 kg/ha (300 g/hl)	Per trattamenti da caduta foglie a rottura gemme	
		Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl)	Per trattamenti da inizio e in vegetazione. Massimo 4 trattamenti/anno come somma dei due periodi di applicazione	
Albicocco, Susino	Corineo, Moniliosi	Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl)	Massimo 4 trattamenti/anno	
Ciliegio	Corineo, Moniliosi	Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno. Applicazioni in pre fioritura, post fioritura e pre-raccolta	
Nocciolo	Alternaria e Antracnosi	Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl)	Massimo 4 trattamenti/anno da caduta foglie a fine fioritura, con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni	Sospendere i trattamenti al termine della fioritura
Mandorlo	Fusicocco, Bolla, Ticchiolatura delle drupacee, Corineo, Macchie fogliari rosse del Mandorlo			
Pistacchio	Septoriosi, Cancri rameali e Alternaria			
Noce	Antracnosi			
Castagno	Fersa			

FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Captano 23,2 g (360 g/l) Fosfonato di potassio 42,6 g (660 g/l)	FRAC: Gruppo M4 e 33	N. REGISTRAZIONE: 16753 del 21-11-2019
--	---	-------------------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Pero, Melo, Cotogno e Nashi	Ticchiolatura, Maculatura bruna, Cancri e patologie di post-raccolta	3 l/ha (0,2-0,3 l/hl)	Effettuare massimo 6 trattamenti l'anno dallo stadio di rottura gemme fino a frutto noce, da limitare a 4 se il periodo di impiego è prolungato fino alla comparsa della specifica colorazione varietale, mantenendo un intervallo di 7-10 giorni.	28 giorni



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H317 - H319 - H351 - H400 - H412 - EUH401



Avvertenza: **ATTENZIONE**
H317 - H319 - H332 - H351 - H400

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MEXIRAM® HI BIO

Fungicida e battericida rameico per vite, olivo, tabacco, fragola e orticole consentito in Agricoltura Biologica.



5 kg

Prodotto e marchio di titolarità Albaugh UK Ltd



FORMULAZIONE: Microgranuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Rame metallo 22 g (220 g/l) (sotto forma di idrossido)	FRAC: M1	N. REGISTRAZIONE: 11711 del 23-07-2003
--	--	-------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Peronospora	1,8-2,7 kg/ha (180-270 g/hl)	Azione collaterale contro Escoriosi, Black-rot, Melanosi, Rossore parassitario	21 giorni
Pomodoro (pieno campo e serra)	Peronospora, Septoria, Cladosporiosi, Marciume zonato, Alternariosi, Nerume, Necrosi, Picchiettatura, Maculatura batterica	2,3-2,8 kg/ha (230-280 g/hl)	Azione collaterale contro Cancro batterico e Botrite	10 giorni per Pomodoro da industria e 3 giorni per Pomodoro da consumo fresco
Olivo	Cicloconio, Cercosporiosi, Lebbra, Rogna, Fumaggine	2,1-3,0 kg/ha (210-300 g/hl)	Azione collaterale contro marciume delle drupe	14 giorni
Melanzana (pieno campo e serra)	Marciume pedale del fusto e Antracnosi	1,7-2,3 kg/ha (170-230 g/hl)	Azione collaterale contro Marciume molle batterico e Botrite	3 giorni
Peperone (pieno campo e serra)	Peronospora	1,7-2,3 kg/ha (170-230 g/hl)	-	3 giorni
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini (pieno campo e serra)	Peronospora, Antracnosi e Maculatura angolare	1,4-2,3 kg/ha (170-230 g/hl)	Azione collaterale contro Marciume molle batterico e Botrite	3 giorni
Melone, Anguria e Zucca (in campo)	Peronospora, Antracnosi e Maculatura angolare	1,4-2,3 kg/ha (170-230 g/hl)	-	7 giorni
Carciofo (in campo)	Peronospora	1-2,3 kg/ha (170-230 g/hl)	Azione collaterale contro Marciume molle batterico e Botrite	3 giorni
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio, Rucola (pieno campo e serra)	Peronospora, Cercosporiosi, Alternariosi, Antracnosi, Marciume batterico e Maculatura batterica	1-2,3 kg/ha (170-230 g/hl)	Impiegare esclusivamente oltre lo stadio di otto foglie. Non impiegare su baby leaf	7 giorni
Cavolfiore e Cavolo broccolo (in campo)	Peronospora, Micosferella del cavolo e Ruggine bianca delle crocifere	1-2,3 kg/ha (170-230 g/hl)	Azione collaterale contro Marciume nero del cavolo	14 giorni
Patata	Peronospora e Batteriosi	2,3-2,8 kg/ha (230-280 g/hl)	-	7 giorni
Tabacco	Peronospora	1,45-2,3 kg/ha (180-230 g/hl)	-	20 giorni
Fragola (in campo)	Marciume bruno del cletto, vaiolatura, Maculatura zonata, Maculatura rosso bruna, Maculatura angolare	1,7-2,2 kg/ha (170-220 gr/hl)	T Trattamenti autunno invernali e alla ripresa vegetativa	3 giorni



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H318 - H332 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MIRADOR® SC

Fungicida contro le malattie della parte aerea di frumento e orzo, contro brusone e elminosporiosi del riso e contro oidio e peronospora di solanacee e cucurbitacee.



1 l

5 l



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Azoxystrobin 23,2 g (250 g/l)	FRAC: C3	N. REGISTRAZIONE: 15111 del 25-03-2011
--	--	-------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento e Orzo	Oidio, Ruggini, Septoriosi, Rincosporiosi	0,8-1 l/ha	Massimo 2 applicazioni/anno, intervenire tra il 2° nodo e la fioritura	35 giorni
Riso	Brusone ed Elmintosporiosi	1 l/ha	Massimo 2 applicazioni/anno, intervenire tra botticella e inizio spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni. Trattare in asciutta	28 giorni
Melone, Zucchini, Cetriolo, Cetriolino, Cocomero e Zucca (pieno campo e serra)	Oidio Peronospora	0.7 l/ha su oidio 0.7-0.8 l/ha su peronospora	In serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di MIRADOR SC con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti. Intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni su Oidio e 5-7 giorni su peronospora. Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto	3 giorni
Pomodoro, Peperone e Melanzana (pieno campo e serra)	Peronospora e Alternariosi Oidio	0.7-0.8 l/ha su peronospora e alternaria 0.7 l/ha su oidio	In pieno campo non utilizzare MIRADOR SC per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. In serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di MIRADOR SC con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti. Intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni. Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto	3 giorni
Barbabietola da zucchero	Cercospora ed Oidio	1 l/ha (impiegato da solo) 0,5-0,75 l/ha (impiegato in miscela ad altri fungicidi)	Massimo 2 applicazioni/anno, con intervallo tra le applicazioni di 15-21 giorni	30 giorni



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H332 - H410 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MIRADOR® TURBO

Fungicida sistemico per il controllo delle patologie di cereali, vite e orticole in serra.



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Azoxystrobin 11,03 g (120 g/l) Tebuconazolo 18,4 g (200 g/l)	N. REGISTRAZIONE: 17824 del 01-04-2021
--	--	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero e duro, Triticale	Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septoria	1-1,25 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 14-21 giorni	35 giorni
Orzo	Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi			
Cetriolo, Zucchini, Melone (uso in serra)	Oidio	0,5 - 1 l/ha	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 10-14 giorni	3 giorni per cetriolo e zuccchino 7 giorni per melone
Pomodoro, Melanzana (uso in serra)	Oidio	0,5 - 1 l/ha	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 10-14 giorni	3 giorni
Peperone (uso in serra)	Oidio	0,5 - 1 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 10-14 giorni	3 giorni
Aglione, Cipolla (uso in serra)	Ruggini	0,5 - 1 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 10-14 giorni	21 giorni
Vite	Oidio	0,75 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 14-21 giorni, dalle fasi iniziali di sviluppo fino a pre-chiusura grappolo	21 giorni



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H302 - H361D - H410 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MOMENTUM®

Fungicida sistemico contro fitoftora degli agrumi, peronospora della vite e gemme nere del pero.



FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Fosetil Alluminio 80 g (800 g/kg)	FRAC: 33	N. REGISTRAZIONE: 15235 del 12-09-2014
---	--	-------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio amaro, Mapo, Tangelo	Gommosi parassitaria	4,5 kg/ha (300 g/hl)	Massimo 3 trattamenti/stagione. Primo trattamento a inizio fioritura; secondo trattamento a luglio; terzo trattamento a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire efficientemente il prodotto, è possibile eseguire applicazioni con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche	15 giorni
Vite da vino e da tavola	Peronospora	2,5 kg/ha (250 g/hl)	Massimo 4 trattamenti/stagione. Iniziare i trattamenti in pre-fioritura e proseguirli a intervalli di 10-14 giorni. Negli interventi successivi alla fioritura o con andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia è consigliabile l'uso del prodotto in miscela con fungicidi di contatto (es. FOLPAN® 80 WDG) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli	28 giorni
Pero	Gemme nere	4,5 kg/ha (200-250 g/hl)	Massimo 3 trattamenti nel periodo aprile-giugno	15 giorni



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H319 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

NIMROD® 250 EW

Fungicida antioidico ad azione preventiva, curativa ed eradicante per pomacee, drupacee, vite, orticole, rose e lauroceraso. È attivo anche a basse temperature e selettivo ad alte.



11



QUANTUM® L

Fungicida traslaminare contro la peronospora di vite e pomodoro.



11



FORMULAZIONE: Emulsione olio/acqua	COMPOSIZIONE: Bupirimate 23,8 g (250 g/l)	FRAC: 8	N. REGISTRAZIONE: 13771 del 02-04-2007
---------------------------------------	--	------------	---

FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Dimetomorf 44 g (500 g/l)	FRAC: 40 (H5)	N. REGISTRAZIONE: 17078 del 26-10-2017
--	--	------------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo	Oidio	0,9 l/ha (60 ml/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di pre-fioritura fino a maturazione	14 giorni
Vite da vino e da tavola		0,8-1,5 l/ha (100 ml/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, da inizio germogliamento fino a maturazione	14 giorni
Pesco, Albicocco e Nettareino		0,75-1 l/ha (100 ml/hl)	Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di piena fioritura fino a maturazione	7 giorni
Fragola (in pieno campo e serra)		1 l/ha	Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di prima foglia vera fino a maturazione	3 giorni
Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo e serra)		1 l/ha	Massimo 4 applicazioni/anno in pieno campo e 3 applicazioni/anno in serra. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione	1 giorno
Zucchini, Cetriolo, Cetriolino (in pieno campo e serra)		1 l/ha	Massimo 3 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 3 foglie vere fino a maturazione	1 giorno
Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra)		1-2 l/ha	Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10-12 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione	3 giorni
Rosa e Lauroceraso (in pieno campo e serra)		1-1,5 l/ha (150-300 ml/hl)	Massimo 2 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 7-10 giorni, dallo stadio di prime foglie separate fino allo stadio di fine caduta foglie	-

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Peronospora	0,4-0,5 l/ha	Massimo 4 applicazioni all'anno e non oltre 3 consecutive. Intervenire in modo preventivo a cadenza di 10-12 giorni	10 giorni
Pomodoro (in campo)	Peronospora	0,4-0,5 l/ha	Massimo 4 applicazioni all'anno e non oltre 3 consecutive. Intervenire in modo preventivo a cadenza di 8-10 giorni	7 giorni



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H351 - H317 - H410 - EUH401



Avvertenza: **PERICOLO**
H360f - H411 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

SCIROCCO 125 EW

Fungicida sistemico contro l'oidio della vite e le maggiori malattie di frumento, orzo, barbabietola da zucchero e altre colture.



11



SEEDRON®

Fungicida per la concia delle sementi di frumento, orzo, triticale, segale e avena.



1000 l



FORMULAZIONE: Microemulsione	COMPOSIZIONE: Tetraconazolo 11,6 g (125 g/l)	FRAC: 3	N. REGISTRAZIONE: 15990 del 14-02-2014
---------------------------------	---	------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	Oidio attività collaterale verso Marciume nero	20-25 ml/hl (240 ml/ha)	Trattamenti in pre e post-fioritura distanziati di 12-14 giorni. Eseguire massimo 3 applicazioni	30 giorni
Frumento tenero e duro, Orzo	Oidio, Ruggini, Septoriosi, Rincosporiosi	0,9-1 l/ha	Trattare quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni. Si consigliano 2 applicazioni: - stadio di 1-2 nodi - inizio spigatura	Sospendere i trattamenti a fine fioritura
Barbabietola da zucchero	Cercospora, Oidio, Ramularia, Ruggine	0,8 l/ha	Effettuare il trattamento alla comparsa dei sintomi da fine sviluppo fogliare a pre-fioritura	14 giorni
Melo	Oidio	16-24 ml/hl (190-240 ml/ha)	Trattamenti primaverili-estivi da 2 a 3 applicazioni con intervallo di 12-14 giorni	14 giorni
	Ticchiolatura	24 ml/hl (240 ml/ha)	Trattare ogni 7 giorni da quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni fino alla fase di frutto noce; proseguire poi a intervalli di 10 giorni. Trattamenti curativi: il primo entro 72-96 ore dalla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti: eseguire 2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni, proseguire poi con le cadenze normali	
Pero	Ticchiolatura	24 ml/hl (240 ml/ha)	Trattare ogni 7 giorni da quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni fino alla fase di frutto noce; proseguire poi a intervalli di 10 giorni. Trattamenti curativi: il primo entro 72-96 ore dalla pioggia infettante. Trattamenti bloccanti: eseguire 2 trattamenti a distanza di 5-7 giorni, proseguire poi con le cadenze normali	14 giorni
Pesco e Nettarino, Albicocco	Oidio	30 ml/hl (300 ml/ha)	Iniziare i trattamenti a caduta petali e proseguire a intervalli di 12-14 giorni. Eseguire massimo 3 applicazioni	14 giorni
Melone, Cocomero, Cetriolo, Zucchini (in pieno campo e serra)	Oidio	50 ml/hl (0.4 l/ha)	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi. Da 2 a 3 trattamenti con intervallo di 10-15 giorni	3 giorni per Cetriolo e Zucchini 7 giorni per Melone e Cocomero
Carciofo	Oidio	20-30 ml/hl (200-300 ml/ha)	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi proseguendo ogni 15 giorni, fino ad un massimo di 3 applicazioni all'anno, se necessario	3 giorni
Pomodoro, Peperone e Melanzana (in pieno campo)	Oidio	20-36 ml/hl (0.2-0.36 l/ha)	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi. Da 2 a 3 trattamenti con intervallo di 8-12 giorni. In caso di applicazioni curative ridurre l'intervallo a 8-10 giorni	7 giorni
	Cladosporiosi	40-60 ml/hl (0.4-0.6 l/ha)		
Rosa	Oidio	20-40 ml/hl	Le applicazioni possono essere effettuate in serra, vivaio e pieno campo. Considerando l'esistenza di varietà con sensibilità diversa, effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante	-
	Ruggine	40 ml/hl		-
Crisantemo	Ruggine	60-75 ml/hl		-
Garofano	Ruggine	70-75 ml/hl		-
Pelargonio, Gladiolo	Ruggine	75 ml/hl		-
Fragola (in pieno campo e serra)	Oidio	40 ml/hl (400 ml/ha)	Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi. Eseguire massimo 3 trattamenti/anno distanziati di almeno 7 giorni	1 giorno

Avvertenza: -
Indicazioni di pericolo:
H411 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

FORMULAZIONE: Concentrato fluido	COMPOSIZIONE: Fludioxonil 4,61 g (50 g/l) Tebuconazolo 0,92 g (10 g/l)	FRAC: Gruppo 3 e 12	N. REGISTRAZIONE: 16152 del 28-04-2016
-------------------------------------	--	------------------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento duro, Frumento tenero	Fusariosi, Carie, Carbone	100ml/100kg di seme	-	-
Orzo	Fusariosi, Carbone, Striatura bruna	100ml/100kg di seme	-	-
Avena	Fusariosi, Carbone	100ml/100kg di seme	-	-
Segale e Triticale	Fusariosi, Carbone	100ml/100kg di seme	-	-

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
EUH401 - H410 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

SPYRALE®

Fungicida contro cercospora e oidio della barbabietola da zucchero.



1l



FORMULAZIONE: Emulsione concentrata	COMPOSIZIONE: Fenpropidin 37,8 g (375 g/l) Difenoconazolo 10,1 g (100 g/l)	FRAC: G	N. REGISTRAZIONE: 9757 del 23-09-1998
--	--	------------	--

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi, Oidio	0.75 l/ha	Massimo 2 applicazioni ad intervalli di 21 giorni	21 giorni

STAVENTO®

Fungicida multisito per la difesa del frumento.



1l



5l



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Folpet puro 39,7 g (500 g/l)	FRAC: M4	N. REGISTRAZIONE: 17752 del 21-12-2021
--	---	-------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento duro e tenero	Septoria (<i>Zymoseptoria tritici</i>)	1-1,2 L/ha	Trattare da inizio levata fino a foglia bandiera. Eseguire 1 o 2 trattamenti a distanza minima di 14 giorni	42 giorni



Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo: H302 - H304 - H319 - H315 - H332 - H335 - H373 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo: H317 - H319 - H351 - H400 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

TIPTOR® ULTRA

Fungicida sistemico per il controllo delle malattie fogliari e della spiga del frumento



1 l



FORMULAZIONE: Emulsione concentrata	COMPOSIZIONE: Difenoconazolo 9,93 g (100 g/l) Tebuconazolo 24,83 g (250 g/l)	N. REGISTRAZIONE: 14967 del 28-10-2011
--	--	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento tenero, Frumento duro	Fusariosi, Septoria, Stagonospora, Ruggine bruna	1 l/ha	1 applicazione tra lo stadio di inizio spigatura e fine fioritura	Sospendere i trattamenti a fine fioritura

ZAKEO® 250 SC

Fungicida specifico contro le malattie delle colture orticole.



1 l



Prodotto di titolarità del Gruppo Syngenta.

FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Azoxystrobin 23,2 g (250 g/l)	FRAC: C3	N. REGISTRAZIONE: 17099 del 22-01-2018
--	--	-------------	---

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Patata	Rizoctonia, Antracnosi	3 l/ha	Applicare nei solchi di semina; non applicare per immersione dei tuberi o su patate pregerminate. Consentita 1 applicazione ogni due anni	-
Aglio, Cipolla, Scalogno (in pieno campo)	Alternaria, Peronospora, Ruggine	0,8-1 l/ha	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie visibili a prefioritura	14 giorni
Porro (in pieno campo)	Alternaria, Peronospora, Ruggine	0,8-1 l/ha	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 12-14 giorni di intervallo, da prime foglie visibili a prefioritura	21 giorni
Carciofo (in pieno campo)	Peronospora, Oidio	0,8-1 l/ha	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 10-12 giorni di intervallo, dalle prime foglie visibili a pre-emergenza del capolino	7 giorni
Asparago (in pieno campo)	Stemfiliosi, Ruggine	0,8-1 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 10-14 giorni di intervallo, da 10% di sviluppo della superficie fogliare	-
Carota (in pieno campo)	Septoria, Cercospora, Alternaria, Oidio	0,8-1 l/ha	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7 - 10 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta	14 giorni
Sedano (in pieno campo)			Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 10 - 12 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta	14 giorni
Cavolfiore Cavolo cappuccio (in pieno campo)	Alternaria, Micosferella	0,8-1 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 12 - 14 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta	14 giorni
Cetriolo, Cocomero (in pieno campo e serra)	Cancro gommoso Oidio Pseudo-peronospora	0,8 - 1 l/ha pieno campo 0,7-0,8 l/ha serra	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7 - 10 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta	3 giorni
Zucchini, Cetriolino, Melone, Zucca (in pieno campo e serra)		0,8-1 l/ha		3 giorni
Fagiolo e fagiolino (in pieno campo)	Ruggine Oidio Peronospora	0,8-1 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 14 giorni di intervallo, da prime foglie distese ad inizio sviluppo baccelli per fagiolino, fagiolo e pisello da granella; da pre fioritura e fine fioritura per pisello fresco	14 giorni P.fresco 14 giorni P.granella 35 giorni
Lattughe e insalate tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf (in pieno campo)	Peronospora Oidio	0,8-1 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie distese a raccolta	7 giorni
Erbe fresche (in pieno campo e serra)	Peronospora, Septoria	0,8-1 l/ha	Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie distese a raccolta	7 giorni
Pomodoro, Melanzana (in pieno campo e serra)	Alternaria, Cladosporiosi, Peronospora, Oidio	0,8-1 l/ha	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie distese a raccolta	3 giorni
Peperone			Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie distese a raccolta	3 giorni
Fragola	Oidio	0,8-1 l/ha	Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da infiorescenze visibili alla raccolta	3 giorni



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H319 - H335 - H361d - H410 - EUH401



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H332 - H410 - EUH401 - EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

INSETTICIDI

SOMMARIO

APOLLO® SC	71
LAMDEX® EXTRA	72
MAVRIK® SMART	74
MITOR®	75
PIRIMOR® 50	76
SCHERMO® 0.5 G	77





APOLLO® SC

Acaricida contro acari tetranychidi e eriofidi delle colture arboree da frutto, delle orticole, della fragola, del lampone e delle colture floricole e ornamentali in genere.



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Clofentezine 42 g (500 g/l)	IRAC: 10A	N. REGISTRAZIONE: 7541 del 06-10-1988
--	--	--------------	--

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo, Pero	Ragnetti rossi, Acaro della ruggine Uova invernali	40 ml/hl (max 0,4 l/ha)	Massimo 1 applicazione/anno. Intervenire sulle uova invernali 10-15 giorni prima della schiusura oppure intervenire sulle forme mobili in post-fioritura o al primo apparire dell'infestazione (1-3 acari per foglia)	35 giorni
	Ragnetti rossi, Acaro della ruggine In presenza di forme mobili	30 ml/hl (max 0,4 l/ha) in miscela con MITOR®		
Vite da vino	Ragnetti rossi, Ragnetto giallo della vite, Eriofide della vite In presenza di forme mobili	20-25 ml/hl (max 0,4 l/ha) in miscela con MITOR®	Massimo 1 applicazione/anno. Su infestazioni tardive eseguire il trattamento in presenza di pochi acari per foglia. Per infestazioni di <i>E. carpini</i> la dose può essere aumentata fino a 30 ml/hl	30 giorni
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Pompelmo, Bergamotto, Limetta	Ragnetti rossi, Acaro degli agrumi	30 - 40 ml/hl (max 0,4 l/ha) in miscela con MITOR®	Massimo 1 applicazione/anno. Le concentrazioni d'applicazione più elevate sono consigliate nel caso di infestazioni di <i>T. urticae</i>	21 giorni
Lampone (in pieno campo)	Ragnetto rosso	40 ml/hl (max 0,4 l/ha) in miscela con MITOR®	Massimo 1 applicazione/anno	7 giorni
Melone, Pomodoro, Cetriolo, Zucca, Fragola	Ragnetto rosso	40 ml/hl (max 0,4 l/ha) in miscela con MITOR®	Massimo 1 applicazione/anno. Interventi molto precoci con APOLLO® SC da solo (50-60 ml/hl) contrastano la comparsa del fitofago nel periodo più critico della maturazione	3 giorni
Colture Floreali ed Ornamentali (in pieno campo e serra)				-
Nocciolo	Eriofide del nocciolo, Ragnetti rossi, Ragnetto giallo	30 - 40 ml/hl (max 0,4 l/ha)	Massimo 1 applicazione/anno	50 giorni



Avvertenza: -
H411 - EUH208 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



LAMDEX® EXTRA

Insetticida ad ampio spettro per orticole, cereali, mais, barbabietola da zucchero, oleaginose, vite, frutticole.



FORMULAZIONE: Granuli idrosospensibili	COMPOSIZIONE: Lambda-cialotrina 2,5 g (25 g/kg)	IRAC: 3A	N. REGISTRAZIONE: 8259 del 04-05-1993
---	--	-------------	--

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (1,2 kg/ha)		7 giorni
	Cocciniglie (neanidi)	100-160 g/hl		
	Mosca, Cimice verde	60-100 g/hl (0,6-1,6 kg/ha)		
Pesco, Nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,4-0,6 kg/ha)		7 giorni
	Mosca della frutta	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
	Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia)	100-120 g/hl (1-1,2 kg/ha)		
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100-160 g/hl (1-1,6 kg/ha)		
	Tripidi	60-80 g/hl (0,6-0,8 kg/ha)		
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,4-0,8 kg/ha)		7 giorni
	Mosca della frutta	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
	Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia)	100-120 g/hl (1-1,2 kg/ha)		
Ciliegio, Susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,4-0,6 kg/ha)		7 giorni
	Mosca della frutta	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
Melo, Pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60-80 g/hl (0,6-0,8 kg/ha)		7 giorni
	Cemiosoma, Litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della prima generazione), Carpo-capsa	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
	Ricamatrici estive e Lepidotteri	80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha)		
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti)	80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha)		
	2° intervento (prime neanidi della seconda generazione) normalmente in maggio	100-140 g/hl (1-1,2 kg/ha)		
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,28-0,6 kg/ha)		7 giorni
	Lepidotteri tortricidi	80-100 g/hl (0,56-1 kg/ha)		
Actinidia e fruttiferi minori (Ribes nero, Uva spina, Lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40-60 g/hl (0,28-0,6 kg/ha)		7 giorni
Mandorlo, Nocciolo	Agrilo, Maggiolino (sulla vegetazione)	80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha)		7 giorni
Vite da vino e da tavola	Tignola e Tignoletta: prima o seconda generazione	100 g/hl (1 kg/ha)		21 giorni
	Cocciniglie (trattamenti etivi su neanidi)	100 g/hl (1 kg/ha)		
	Cicaline	60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha)		
	Sigaraio	100 g/hl (1 kg/ha)		

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Barbabietola da zucchero	Altica	0,42-0,8 kg/ha		14 giorni
	Afidi (foglie non accartocciate)	0,28-0,6 kg/ha		
	Cleono, Lisso	0,56-0,8 kg/ha		
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		
Cereali (Frumento, Orzo, Avena, Segale, Sorgo)	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia	0,42-0,8 kg/ha (per segale max 0,6 kg/ha)		30 giorni Frumento, Segale, Sorgo 40 giorni Orzo, Avena
	Nottue (allo scoperto)	0,56-0,8 kg/ha (per segale max 0,48 kg/ha)		
Mais e Mais dolce	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia	0,42-0,8 kg/ha		7 giorni
	Piralide, Diabrotica	0,56-1 kg/ha		
	Nottue (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		
Oleaginose (Arachide, Girasole, Colza, Soia, Ravizzone, Cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), Altica, Meligete e Tentredine	0,42-0,8 kg/ha		15 giorni Arachide, Soia, Cotone 30 giorni Colza, Ravizzone 70 giorni Girasole
	Cimici e Cecidomia	0,58-1,2 kg/ha		
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		
Foraggiere (Prati-pascoli, Loglio, Mais, Barbabietola da foraggio, Erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo	0,42-1,2 kg/ha		7 giorni Mais, Erba medica 15 giorni Barbabietola da foraggio 20 giorni Prati e Pascoli 30 giorni Loglio
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		
Mais da foraggio	Diabrotica	0,56-1 kg/ha		7 giorni
Aglio, Cipolla, Carota, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolini di Bruxelles, Carciofo, Cetriolo, Cocomero, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Finocchio, Lattughe e simili, Lenticchia, Melanzana, Melone, Patata, Peperone, Pisello, Pomodoro, Porro, Sedano, Ravanella, Zucchini	Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca	0,28-0,6 kg/ha	Su Carciofo, Finocchio non superare la dose di 0,6 kg/ha Su Aglio non superare la dose di 0,8 kg/ha. Su sedano (solo afidi) 0,4 kg/ha. Su porro (su afidi e mosca bianca) 0,3 kg/ha. Su Rucola, Valerianella, Crescione, Barbarea dose fissa 0,6 kg/ha. Su Lattughe e Scarole non superare la dose di 0,3 kg/ha	3 giorni per tutte le colture tranne: 7 giorni Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolini di Bruxelles, Fagiolo, Fava, Rucola, Pisello, 21 giorni Sedano, Porro (2 appl.), 14 giorni Carciofo, Lenticchia, Porro (1 appl.), Finocchio, Lattughe e simili (esclusa Rucola) 15 giorni Patata
	Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi	0,42-0,8 kg/ha		
	Cimici	0,56-1 kg/ha		
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		
Tabacco	Afidi e Mosca bianca	0,28-0,6 kg/ha		60 giorni
	Tripidi e Pulce del tabacco	0,42-0,8 kg/ha		
	Nottue defoliatrici (allo scoperto)	0,4-0,5 kg/ha		

Nota: Consultare l'etichetta per numero massimo interventi/anno e intervallo tra i trattamenti.



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H302 - H317 - H319 - H332 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MAVRIK® SMART

Insetticida ad ampio spettro per frutticole, vite, orticole, cereali, barbabietola da zucchero e altre colture. La nuova formulazione ottimizzata “Smart” ne ha migliorato miscibilità e bagnatura, continuando ad agire in maniera gentile nei confronti degli insetti utili.



FORMULAZIONE: Emulsione acquosa	COMPOSIZIONE: Tau-fluvalinate 21,4 g (240 g/l)	IRAC: 3A	N. REGISTRAZIONE: 9800 del 02-11-1998
------------------------------------	---	-------------	--

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Limetta, Pompelmo	Afidi, Tignola degli agrumi	0,4 l/ha (20-40 ml/ha)		30 giorni
Ciliegio	Afidi	0,3 l/ha (20-60 ml/hl)		10 giorni
Melo, Pero, Melo cotogno, Nespolo	Afidi, Ditteri cecidomidi, Lepidotteri, forme mobili giovanili di Cocciniglia, Psille e Cimice asiatica	0,6 l/ha (40-120 ml/hl)		30 giorni
Pesco, Albicocco, Nettareno	Afidi, Lepidotteri, Tripidi, Cimice asiatica, Mosche della frutta	0,6 l/ha (40-120 ml/hl)		30 giorni
Vite da vino e da tavola	Cicaline, Tripidi, Moscerino dei piccoli frutti	0,3 l/ha (30-300 ml/hl)		21 giorni
Melanzana	Afidi, Tripidi, Lepidotteri	0,2 l/ha		3 giorni
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini	Afidi, Tripidi	0,2 l/ha		7 giorni
Melone	Afidi, Tripidi	0,3 l/ha		7 giorni
Legumi da consumo fresco con e senza baccello ed essiccati (pisello, fagiolo, fagiolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia)	Afidi, Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi	0,3 l/ha	Massimo 2 trattamenti/anno con intervallo di 14 giorni tra le applicazioni. È consentito l'impiego in colture in pieno campo	7 giorni (consumo fresco), 14 giorni (consumo secco)
Fagiolo, Fagiolino sgranato	Ragnetto rosso	0,3 l/ha		7 giorni (consumo fresco), 14 giorni (consumo secco)
Carota e Bietola rossa	Afidi	0,3 l/ha		14 giorni
Lattughe e simili (lattuga, invidia, scarola)	Afidi, Tripidi, Miridi, Lepidotteri, Minatori fogliari	0,4 l/ha		14 giorni
Fragola	Afidi, Tripidi, Lepidotteri	0,3 l/ha		7 giorni
Patata	Afidi, Dorifora	0,3 l/ha		14 giorni
Frumento, Orzo, Avena, Segale, Triticale	Afidi, Ditteri cecidomidi, Cimici, Cicaline	0,2 l/ha		30 giorni
Barbabietola da zucchero	Afidi, Lepidotteri, Altica, Cleono, Cassida	0,2 l/ha		14 giorni
Colza	Afidi, Coleotteri	0,2 l/ha		30 giorni
Erba medica	Afidi, Coleotteri, Tripidi e Lepidotteri	0,3 l/ha		7 giorni
Colture Floreali e Ornamentali, Forestali e Vivai	Afidi, larve di Cocciniglia, Tripidi, Lepidotteri, Cicaline, Coleotteri e Acari	0,4 l/ha (40-80 ml/hl)		-
Carciofo, Cardo	Afidi, Lepidotteri, Tripidi	0,3 l/ha		7 giorni
Cavolfiore, Cavolo cappuccio, Cavoletto di Bruxelles	Afidi, Tripidi, Lepidotteri	0,3 l/ha	Massimo 1 trattamento/anno	7 giorni

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

MITOR®

Acaricida - Insetticida contro acari, psille e minatori fogliari di vite, melo, pero, arancio, fragola e orticole.



FORMULAZIONE: Emulsione acquosa	COMPOSIZIONE: Abamectina 1,75 g (18 g/l)	IRAC: 6	N. REGISTRAZIONE: 17117 del 07-12-2017
------------------------------------	---	------------	---

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Agrumi	Minatrice serpentina e Acari	0,4-0,8 l/ha (40 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno; intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare alla comparsa delle prime mine a inizio germogliamento e da allegagione a ingrossamento frutti	10 giorni
Pero	Psilla del Pero	0,375-1,2 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno; intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare da caduta petali in avanti, alla comparsa delle prime neanidi	3 giorni
	Acari	0,6-0,96 l/ha (80 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno; intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare da caduta petali in avanti, fino a 3 giorni prima della raccolta, alla comparsa delle prime neanidi	
Melo	Acari	0,6-0,96 l/ha (80 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno; intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare da caduta petali in avanti, fino a 3 giorni prima della raccolta, alla comparsa delle prime neanidi	3 giorni
Vite da vino	Acari	0,5-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 1 trattamento/anno. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare in fioritura	10 giorni
Vite da tavola	Acari	0,5-1,2 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 1 trattamento/anno. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare in fioritura	10 giorni
Lattuga, Dolcetta, Valerianella, Gallinella, Scarola, Indivia (solo pieno campo)	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili.	7 giorni
Peperone (solo pieno campo)	Acari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili	3 giorni
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini (solo in serra)	Acari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio	3 giorni
Fragola (solo in serra)	Acari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio	3 giorni
Pomodoro (in pieno campo e serra)	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili	3 giorni
Melanzana (in pieno campo e serra)	Acari e Minatrici fogliari	0,15-0,8 l/ha (50 - 80 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 7 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili	3 giorni
Melone, Cocomero e Zucca (in pieno campo e serra)	Acari e Minatrici fogliari	0,15-1 l/ha (50 - 100 ml/hl)	Massimo 2 trattamenti/anno, intervallo tra i trattamenti 15 giorni. Trattare in presenza delle forme mobili. Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio	5 giorni pieno campo 3 giorni serra

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
EUH302 - H373 - H410 - EUH208 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

PIRIMOR® 50

Insetticida contro afidi di frutticole, orticole, cereali, mais e oleaginose. Agisce sugli afidi attraverso una triplice azione: contatto, ingestione ed asfissia che, unita alla sua attività in fase di vapore (oltre i 15°C) e all'azione translaminare, permette di controllare anche gli afidi non direttamente bagnati dal trattamento.



1 kg
Misurino incluso



FORMULAZIONE: Granuli disperdibili	COMPOSIZIONE: Pirimicarb 50 g (500 g/kg)	IRAC: 1A	N. REGISTRAZIONE: 4701 del 17-03-1982
---------------------------------------	---	-------------	--

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Pesco, Nettareino, Albicocco, Susino, Ciliegio, Pomacee	Afidi	50-75 g/hl (0,76 kg/ha)	Massimo 1 trattamento/anno	7 giorni
Ortaggi in pieno campo: Fragola, Fagioli e Piselli freschi e da granella (con e senza baccello), Carota, Prezzemolo a radice grossa, Rafano, Barbabietola rossa, Rapa, Navone, Lattughe e insalate (tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf), Carciofo, Cetriolo, Asparago, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Zucchini, Melone, Zucca, Cocomero, Cipolla, Aglio		100 g/hl (0,75 kg/ha)	Massimo 1 trattamento/anno per Fragola, Fagioli e Piselli freschi (con e senza baccello), Carota, Prezzemolo a radice grossa, Rafano, Barbabietola rossa, Rapa, Navone, Asparago, Lattughe e insalate tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf, pomodoro, melanzana, peperone, zucchini. Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 - 12 giorni per Carciofo, Cetriolo, Piselli e Fagioli da granella, melone, zucca, cocomero, cipolla, aglio. Per Asparago trattare dopo la raccolta dei turioni	7 giorni per tutte le colture tranne: 7 mesi (dopo raccolta turioni) Asparago 3 giorni pomodoro, melanzana, peperone, zucchini, melone, zucca, cocomero, cipolla, aglio
Ortaggi in serra: Fragola, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchini		80 g/hl (0,8 kg/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni, tranne Pomodoro e Melanzana 7 -12 giorni	7 giorni
Ortaggi in serra: Peperone, Melone, Cocomero, Zucca		80 g/hl (0,8 kg/ha)	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni	3 giorni
Ortaggi in serra: Lattughe e insalate (tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf), Foglie di Sedano e Prezzemolo		0,5 kg/ha	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7-12 giorni	14 giorni
Patata		0,5 kg/ha	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7-14 giorni	7 giorni
Mais e Sorgo		0,4 kg/ha	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni. Trattamenti ammessi fino alla fase di emergenza dell'infiorescenza	-
Mais dolce		0,4 kg/ha	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni	7 giorni
Frumento, Segale, Triticale, Orzo, Avena		0,26 kg/ha	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 14 giorni. Trattamenti ammessi fino alla fase di maturazione latteo-cerosa	-
Lino, Colza, Girasole		0,5 kg/ha	Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni	21 giorni



Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo:
H301 - H319 - H332 - H351 - H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

SCHERMO® 0.5 G

Geoinsetticida granulare per barbabietola da zucchero, patata, frumento, mais, oleaginose, ortaggi e tabacco.



10 kg



FORMULAZIONE: Microgranulare	COMPOSIZIONE: Teflutrin 0,5 g (5 g/kg)	IRAC: 3A	N. REGISTRAZIONE: 14479 del 26-01-2009
---------------------------------	---	-------------	---

COLTURA	FITOFAGO	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Barbabietola da zucchero	Elateridi, Altica della bietola, Atomaria linearis, Scutigerella immaculata, Tipule	12-15 kg/ha	Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra	
Frumento	Bibionidi, Hylemya sp., Scutigerella immaculata, Tipule	10-12 kg/ha		
	Elateridi, maggiolino	12-15 kg/ha		
Mais, Mais Dolce, Sorgo	Elateridi, Diabrotica, Hylemya sp., Scutigerella immaculata, Tipule	12-15 kg/ha		
Soia, Girasole	Elateridi, Hylemya sp., Altica	12-15 kg/ha		
Pomodoro, Melanzana, Cavolo cappuccio, Cavolfiore, Rapa, Navone, Melone, Cetriolo, Cocomero, Finocchio, Sedano, Dolcetta/valerianella/gallinella, Crescione, Rucola, Barbarea, Senape juncea, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Carota	Elateridi, Punteruolo, Blaniulus guttulatus, Miriapodi, Altica, Mosca della carota, Hylemya sp., maggiolino, Tipule	15-20 kg/ha		
Patata	Elateridi	12-15 kg/ha		
Tabacco	Elateridi, Tipula	12-15 kg/ha		



Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H410 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

SPECIALI

SOMMARIO

BREVIS®	80
EXELGROW®	81
PARLEAF	82



BREVIS®

Diradante specifico per melo e pero.



1 kg



FORMULAZIONE: Granuli idrosolubili	COMPOSIZIONE: Metamitron 15 g (150 g/kg)	HRAC: C1	N. REGISTRAZIONE: 16084 del 16-05-2014
---------------------------------------	---	-------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Melo	1,1 - 2,2 kg/ha	Applicare BREVIS® quando la dimensione media del frutto centrale misura almeno 8 - 10 mm. Qualora necessario, per aumentare l'effetto diradante, ripetere il trattamento a dimensione del frutto centrale di 12-14 mm e non oltre i 16 mm (non effettuare più di 2 trattamenti all'anno per un massimo complessivo di 4.4 kg/ha). La seconda applicazione può essere effettuata non prima di 5-10 giorni dopo la prima. Impianti con forte allegagione possono necessitare di un secondo trattamento, come anche impianti noti per la difficoltà di dirado.	60 giorni
Pero	1,1 - 1,65 kg/ha (dose consigliata 1,1 kg/ha)	Applicare BREVIS® quando la dimensione media del frutto centrale è compresa tra 8 - 12 mm. Non effettuare una seconda applicazione	

EXELGROW®

Biostimolante di origine naturale - soluzione di filtrato di crema di alghe - per vite, frutticole e orticole consentito in Agricoltura Biologica.



1 l

5 l



FORMULAZIONE: Soluzione di filtrato di crema di alghe ottenuto tramite estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina	COMPOSIZIONE: Carbonio (C) organico di origine biologica 10,3% Mannitolo 0,7 g/l	N. REGISTRO BIOSTIMOLANTI: 0023801/18 del 29-04-2010
---	--	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Vite da vino e da tavola	0,5 - 1 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da sviluppo foglie ogni 15 gg 2-3 interventi MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: da distensione grappolo ogni 15 gg 2-3 interventi per migliorare qualità organolettiche	
Melo, Pero	1 l/ha	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: dopo la cascola ogni 14 gg 2-3 interventi per migliorare colore e pezzatura	
Insalate, Beby Leaf *	0,5-1 l/ha 1,5 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da emergenza/post trapianto ogni 7 gg 2-3 interventi DOPO IL TAGLIO: per accelerare il ricaccio	
Agrumi	0,5 - 1 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da distesa foglie ogni 21 gg 2-3 interventi MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: formazione frutto ogni 14 gg 2-3 interventi	
Drupacee	1 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da distesa foglie ogni 21 gg 2-3 interventi MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: frutto noce ogni 14 gg 2-3 interventi	
Actinidia	0,5 - 1 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da distesa foglie ogni 21 gg 2-3 interventi MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: formazione frutto ogni 14 gg 2-3 interventi	
Olivo	1,5 - 2 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da emissione nuovi getti a prefioritura 1-2 interventi MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: fino indurimento nocciolo 2-3 interventi	
Fragola	0,5 - 1 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 21 gg 2-3 interventi MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: da allegagione ogni 21 gg 2-3 interventi	
Pomodoro, Melanzana, Peperone *	0,5 - 1,5 l/ha	PRE-TRAPIANTO: Applicazione con immersione plateau piantine in soluzione allo 0,3% ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 21 gg 2-3 interventi. Per applicazioni in manichetta utilizzare la dose più alta. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: da allegagione ogni 21 gg 2-3 interventi	
Zucchini, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Cocomero *	0,5-1,5 l/ha	PRE-TRAPIANTO: Applicazione con immersione plateau piantine in soluzione allo 0,3% ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 21 gg 2-3 interventi MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: in produzione ogni 21 gg 2-3 interventi	
Carota *	0,5 - 1 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da sviluppo foglie ogni 21 gg 2-3 interventi	
Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro	0,5 - 1,5 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da emergenza/post trapianto ogni 14 gg 2-3 interventi	
Cavoli	0,5 - 1,5 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 21 gg 2-3 interventi	
Ravanello, Rapa	0,5 - 1,5 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da emergenza ogni 14 gg 2-3 interventi	
Tabacco	0,5 - 1,5 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 14 gg 2-3 interventi	
Frutta a guscio	1 l/ha	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: ingrossamento frutto ogni 14 gg 2-3 interventi per migliorare qualità e pezzatura	
Ribes Nero, Lampone, Mora, Uva Spina, Melograno, Kaki, Luppolo	0,5 - 1 l/ha	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: ogni 15 gg 2-3 interventi	
Erbe Fresche	0,5 - 1 l/ha 1,5 l/ha	ACCRESIMENTO VEGETATIVO: da emergenza/post trapianto ogni 7 gg 2-3 interventi DOPO IL TAGLIO: per accelerare il ricaccio	
Colture Floreali e Ornamentali	0,5 - 1,5 l/ha	DURANTE LA STAGIONE VEGETATIVA	
Tappeti Erbosi Ornamentali e Sportivi	0,5 - 1,5 l/ha	DURANTE LA STAGIONE VEGETATIVA: affrancamento zolle e antistress	

* In pieno campo e in serra.

Il numero di interventi consigliati è indicativo e non vincolante, può essere variato in base alle specifiche esigenze della coltura e/o obiettivi aziendali.



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H302 - H318 - H411 - EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Coadiuvante naturale a base di olio vegetale per prodotti fitosanitari ad attività erbicida.



COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Tutte le colture	1-1.25 l/ha	PARLEAF® è un olio vegetale completamente biodegradabile che, aggiunto ai prodotti fitosanitari ad attività erbicida ne migliora la distribuzione, la bagnabilità, l'aderenza e l'assorbimento degli stessi sulle infestanti trattate, garantendo in tal modo una maggiore azione del prodotto erbicida. PARLEAF® riduce inoltre il fenomeno della deriva e il dilavamento causato dalle piogge.	

83

IN CORSO
DI REGISTRAZIONE

Prodotti in corso di registrazione

NOME	COMPOSIZIONE	FORMULAZIONE	N. REGISTRAZIONE
FOLPAN® ENERGY	Folpet puro 19,7 g (= 300 g/l)	Sospensione concentrata	In corso di registrazione
	Fosfonato di potassio puro 44,1 g (= 670 g/l) pari a 29,6 g di acido fosfonico equivalente (= 450 g/L)		
PACK	5 litri		

INDICE SEZIONE TECNICA

SOMMARIO

Classificazione CLP	88
Pittogrammi CLP	90
Consigli di preparazione generale	90
Centri anti veleno	91

Classificazione CLP

Indicazione di pericolo fisico.	
H200	Esplosivo instabile.
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H229	Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H230	Può esplodere anche in assenza di aria.
H231	Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.

Indicazione di pericolo salute.

H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare alterazioni genetiche
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H350	Può provocare il cancro
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>.
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto>
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H360D	Può nuocere al feto.
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto>
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.

H360d	Sospettato di nuocere al feto.
H360f	Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti>
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H371	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti>
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H372	Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti>
	in caso di esposizione prolungata o ripetuta
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H373	Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti>
	in caso di esposizione prolungata o ripetuta
	<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H300 + H310	Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle.
H300 + H330	Mortale se ingerito o inalato.
H310 + H330	Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione.
H300 + H310 + H330	Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
H301 + H311	Tossico se ingerito o a contatto con la pelle.
H301 + H331	Tossico se ingerito o inalato.
H311 + H331	Tossico a contatto con la pelle o se inalato.
H301 + H311 + H331	Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
H302 + H312	Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle.
H302 + H332	Nocivo se ingerito o inalato.
H312 + H332	Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
H302 + H312 + H332	Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto. La “i” minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

Indicazione di pericolo ambiente.

H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H420	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Indicazione di pericolo supplementari.

EUH001	Esplosivo allo stato secco
EUH006	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019	Può formare perossidi esplosivi.
EUH029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031	A contatto con acidi libera gas tossici.
EUH032	A contatto con acidi libera gas molto tossici.
EUH044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH070	Tossico per contatto oculare.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie
EUH201	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUH201A	Attenzione! Contiene piombo.
EUH202	Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203	Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH204	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH206	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
EUH207	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi.
	Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208	Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.
EUH209	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH209A	Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto. La “i” minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

Pittogrammi CLP

SIMBOLO	SIGLA	DESCRIZIONE
	GHS02	INFIAMMABILE
	GHS05	CORROSIVO
	GHS06	TOSSICITÀ ACUTA
	GHS07	PERICOLO PER LA SALUTE
	GHS08	GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE
	GHS09	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
	Nc	NON CLASSIFICATO

Consigli di preparazione generale

Quando usati in miscela si consiglia di introdurre i prodotti nel serbatoio, con agitatore - ricircolo in funzione, secondo la sequenza:

- sacchetti idrosolubili
- granuli idrosolubili (SG)
- granuli dispersibili (WG)
- polveri bagnabili (WP)
- sospensione concentrata (SC)
- suspoemulsioni (SE)
- dispersioni oleose (OD)
- emulsioni acquose (EW)
- emulsioni concentrate (EC)
- concentrati solubili in acqua (SL)
- fertilizzanti

Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell’irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli).

Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

Leggere attentamente le etichette prima di iniziare le operazioni, rispettare le indicazioni contenute nelle stesse

Centri anti veleno



ALTRI CENTRI ANTIVELENI

Per richieste di informazioni di carattere medico suggeriamo di rivolgersi a:

Centro Nazionale Antiveneni
OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - MILANO - Tel. 02.66101029

ANCONA Centro Antiveneni del Centro Universitario Ospedaliero di Farmacovigilanza Via Tronto, 10/A - Torrette	Tel. 071.2181028	NAPOLI Ospedale Cardarelli - Via Cardarelli, 9	Tel. 081.7472870
BOLOGNA Ospedale Maggiore - Largo B. Nigrisoli, 2	Tel. 051.6478955	PAVIA Clinica del Lavoro e della Riabilitazione Fondazione S. Maugeri - Via Ferrata, 8	Tel. 0382.24444
CATANIA Ospedale Garibaldi Centro di Rianimazione Piazza S. Maria di Gesù, 5	Tel. 095.7594120	PORDENONE Ospedale Civile S. Maria degli Angeli Via Montereale, 24	Tel. 0434.550301
CESENA Ospedale M. Bufalini - Via G. Ghirotti, 286	Tel. 0547.352612	REGGIO CALABRIA Ospedali Riuniti - Via G. Melacrino, 1	Tel. 0965.811624
CHIETI Policlinico SS. Annunziata - Via dei Vestini	Tel. 0871.551219	ROMA Policlinico A. Gemelli - Largo F.Vito, 1 Policlinico Umberto I° - Viale del Policlinico, 155	Tel. 06.3054343 Tel. 06.49970698
FIRENZE Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Viale Morgagni, 65	Tel. 055.4277238	TRIESTE Pronto Soccorso Ospedale Infantile Burlo Garofalo Via dell’Istria, 65/1	Tel. 040.3785373 Tel. 040.3785333
GENOVA Istituto Scientifico G. Gaslini - Largo G. Gaslini, 5	Tel. 010.5636245	TORINO Azienda Ospedaliera Molinette Corso Dogliotti, 14	Tel. 011.6637637
LA SPEZIA Ospedale Civile Sant’Andrea - Via V. Veneto, 197	Tel. 0187.533297	PADOVA Università Degli Studi - Largo Meneghetti, 2	Tel.049.8275078
LECCE Ospedale Vito Fazzi - Piazza F. Muratore	Tel. 0832.661374		

SINOTTICO
COLTURE

Actinidia	94
Aglione	94
Agrumi	94
Albicocco	95
Arachide	95
Aree incolte	95
Asparago	95
Avena	96
Barbabietola da foraggio	96
Barbabietola da zucchero	96
Bietola da costa	97
Bietola da foglia	97
Bietola rossa	97
Carciofo	97
Cardo	97
Carota	98
Castagno	98
Cavolfiore	98
Cavolo broccolo	99
Cavolo cappuccio	99
Cavolo di Bruxelles	99
Cece	100
Cetriolino	100
Cetriolo	101
Cicerchia	101
Cicoria	102
Ciliegie	102
Cipolla	102
Cocomero	103
Colza	104
Cotogno	104
Cotone	104
Erba medica	105
Fagiolino	105
Fagiolo	105

Fava	106
Favino	106
Finocchio	106
Floreali, Ornamentali, Forestali	107
Fragola	107
Frumento	108
Frutta a guscio	109
Girasole	109
Indivia	109
Kaki	110
Lampone	110
Lattuga	110
Lattuga e simili	111
Lenticchia	111
Lino	111
Lupino	111
Mais	112
Mais dolce	112
Mandorlo	112
Melanzana	112
Melo	113
Melograno	114
Melone	114
Mora	115
Nashi	116
Navone	116
Nespole	116
Nespole del Giappone	116
Nettarino	116
Nocciolo	117
Noce	117
Olivo	117
Orzo	118
Patata	118
Peperone	119

Pero	119
Pesco	120
Pioppo	121
Pisello	121
Pistacchio	121
Pomodoro	122
Porro	123
Prezzemolo	123
Radicchio	123
Rafano	124
Rapa	124
Ravanello	124
Ravizzone	124
Ribes	124
Riso	124
Rosa	125
Rucola	125
Scalogno	125
Scarola	126
Scorzonera	126
Sedano	126
Segale	127
Senape	127
Soia	127
Sorgo	128
Spinacio	128
Susino	128
Tabacco	128
Tappeti erbosi	129
Trifoglio	129
Triticale	129
Uva spina	129
Valerianella	130
Veccia	130
Vite da tavola	130

Vite da vino	131
Zucca	132
Zucchini	132

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 ACTINIDIA	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	7 gg	72
 AGLIO (IN CAMPO)	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	SULTAN®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	36
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Peronospora, Ruggine	14 gg	67
 AGLIO (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	MIRADOR® TURBO	Ruggini	21 gg	58
 AGRUMI specie autorizzate su pagina prodotto	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	APOLLO® SC	Acari (<i>Panonychus citri</i> , <i>Tetranychus urticae</i> e <i>Eutetranychus banksi</i>)	21 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Cocciniglie, Mosca, Cimice verde	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis</i> spp., <i>Toxoptera aurantii</i>), Tignola degli agrumi	30 gg	74
	MITOR®	Minatrice serpentina, Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	10 gg	75
	MOMENTUM®	Gommosi parassitaria	15 gg	59
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 ALBICOCCO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca della frutta, Lepidotteri	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Hyalopterus amygdali</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus persicae</i>), Lepidotteri, Tripidi, Cimice asiatica, Mosche della frutta	30 gg	74
	MERPAN® 80 WDG	Corineo, Monilia	21 gg	54
	NIMROD® 250 EW	Oidio	7 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	14 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
 ARACHIDE	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Altica, Meligete, Tentredine, Cimice, Cecidomia, Nottue defogliatrici	15 gg	72
 AREE INCOLTE	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 ASPARAGO	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
	MAVITA® 250 EC	Ruggine, Stenfilio	-	53
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 mesi (post raccolta)	76
	ZAKEO® 250 SC	Stemfiliosi, Ruggine	-	67

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 AVENA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	CLEAVE®	Infestanti dicotiledoni	-	20
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrelia, Nottue	40 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>), Ditteri cecidomidi, Cimici, Cicaline	30 gg	74
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro matur. latteo-cerosa	76
	SEEDRON®	Concia dei semi contro Fusariosi, Carbone	-	63
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
	TRIMMER® 50 WG	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	28 gg	41
 BARBABIETOLA DA FORAGGIO	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	45 gg	17
	CONTATTO® 320	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	22
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Nottue defogliatrici	15 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	45 gg	17
	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
	CONTATTO® 320	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	22
	GOLTIX®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	26
	GOLTIX® SUPER	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	27
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Cleono, Lisso, Nottue defogliatrici	14 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Cercospora, Oidio, Ramularia, Ruggine	21 gg	53
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum</i> spp.), Lepidotteri, Altica, Cleono, Cassida	14 gg	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Agriotes</i> sp., <i>Atomaria linearis</i> , <i>Chaetocnema tibialis</i> , <i>Scutigerella immaculata</i> , <i>Tipula</i> sp.)	-	77
	SCIROCCO 125 EW	Cercospora, Oidio, Ramularia, Ruggine	14 gg	62

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	SPYRALE®	Cercospora, Oidio, Ramularia, Ruggine	21 gg	64
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 BIETOLA DA COSTA	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
 BIETOLA ROSSA	CONTATTO® 320	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	22
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Cavariella aegopodii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Semiaphis dauci</i>)	14 gg	74
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
 CARCIOFO	KITAMBA®	Bremia, Alternaria	20 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	14 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis fabae solanella</i> , <i>Capitophorus horni</i> , <i>Brachycaudus cardui</i>), Tripidi, Lepidotteri	7 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Peronospora, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	3 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	ZAKEO® 250 SC	Bremia, Oidio	7 gg	67
 CARDO	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	uso non alimentare	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis fabae solanella</i> , <i>Capitophorus horni</i> , <i>Brachycaudus cardui</i>), Tripidi, Lepidotteri	7 gg	74

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 CAROTA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	25
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Alternaria, Micosferella, Oidio, Septoria, Uromyces	14 gg	53
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Cavariella aegopodii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Semiaphis dauci</i>)	14 gg	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
 CASTAGNO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MERPAN® 80 WDG	Ferla	Entro fine fioritura	54
 CAVOLFIORE	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	7 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Alternaria, Micosferella, Oidio, Septoria, Uromyces	14 gg	53
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Tripidi, Lepidotteri	7 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Peronospora, Micosferella, Ruggine bianca delle crucifere, az. collaterale su Marciume nero del cavolo	14 gg	56

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 CAVOLFIORE	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	SULTAN®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	36
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Micosferella	14 gg	67
 CAVOLO BROCCOLO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	7 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Alternaria, Micosferella, Oidio, Septoria, Uromyces	14 gg	53
	MEXIRAM® HI BIO	Peronospora, Micosferella, Ruggine bianca delle crucifere, az. collaterale su Marciume nero del cavolo	14 gg	56
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 CAVOLO CAPPUCCIO	SULTAN®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	36
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	7 gg	72
 CAVOLO DI BRUXELLES	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Tripidi, Lepidotteri	7 gg	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	SULTAN®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	36
 CAVOLO DI BRUXELLES	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Micosferella	14 gg	67
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
 CAVOLO DI BRUXELLES	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 CAVOLO DI BRUXELLES	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	7 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Tripidi, Lepidotteri	7 gg	74
	SULTAN®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	36
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Micosferella	14 gg	67
 CECE	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	50 gg	17
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	42 gg fresco, 30 gg secco	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi	14 gg	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 CETRIOLINO (IN CAMPO)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum</i> spp.), Tripidi	7 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antracnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 CETRIOLINO (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antracnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp., <i>Phytonemus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 CETRIOLO (IN CAMPO)	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	KITAMBA®	Pseudoperonospora, Alternaria	15 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	MAVITA® 250 EC	Oidio, Alternaria	3 gg	53
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum</i> spp.), Tripidi	7 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antracnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
 CETRIOLO (IN SERRA)	SCIROCCO 125 EW	Oidio	3 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 CICERCHIA	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	KITAMBA®	Pseudoperonospora, Alternaria	15 gg	52
	MAVITA® 250 EC	Oidio, Alternaria	3 gg	53
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antracnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Oidio	3 gg	58
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp., <i>Phytonemus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	3 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 CICERCHIA	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi	14 gg	74

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 CICORIA (IN CAMPO)	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Bremia, Oidio	7 gg	67
 CICORIA (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	76
 CILIEGIO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca della frutta	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (Myzus spp.)	10 gg	74
	MERPAN® 80 WDG	Corineo, Monilia	21 gg	54
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
 CIPOLLA (IN CAMPO)	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 CIPOLLA (IN CAMPO)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	39
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Peronospora, Ruggine	14 gg	67
 CIPOLLA (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	MIRADOR® TURBO	Ruggini	21 gg	58
 COCOMERO (IN CAMPO)	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	65 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	KITAMBA®	Pseudoperonospora, Alternaria	7 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antrcnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	7 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MITOR®	Acari (Tetranychus spp., Panonychus spp.)	5 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	7 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 COCOMERO (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MITOR®	Acari (Tetranychus spp., Panonychus spp.)	3 gg	75

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 COCOMERO (IN SERRA)	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	7 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 COLZA	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	17
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Altica, Meligete, Tentredine, Cimice, Cecidomia, Nottue defogliatrici	30 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	100 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Coleotteri	30 gg	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	21 gg	76
 COTOGNO	SULTAN®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	36
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	BANJO®	Ticchiolatura, Alternaria	60 gg	46
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), ditteri cecidomidi Lepidotteri, Cimice asiatica, forme mobili giovanili di Cocciniglia e Psille	30 gg	74
	MERPAN® 80 WDG	Ticchiolatura, Gleosporio, Maculatura bruna del pero	21 gg	54
	MERPLUS®	Ticchiolatura, Maculatura bruna, Cancri, Patologie post-raccolta	28 gg	55
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
 COTONE	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	17
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Altica, Meligete, Tentredine, Cimice, Cecidomia, Nottue defogliatrici	15 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 ERBA MEDICA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	45 gg	17
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	25
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Nottue defogliatrici	7 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro chiusura fila	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Coleotteri, Tripidi, Lepidotteri	7 gg	74
 FAGIOLINO	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	42 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi, Ragnetto rosso	7 gg	74
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 FAGIOLO	ZAKEO® 250 SC	Ruggine, Antracnosi, Oidio, Peronospora	14 gg	67
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	40 gg fresco, 50 gg secco	17
	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	7 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	42 gg fresco, 30 gg secco	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi, Ragnetto rosso	7 gg fresco, 14 gg secco	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
 FAGIOLO	ZAKEO® 250 SC	Ruggine, Antracnosi, Oidio, Peronospora	14 gg	67

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 FAVA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	50 gg	17
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	7 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	42 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi	7 gg fresco, 14 gg secco	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 FAVINO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	50 gg	17
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	42 gg fresco, 30 gg secco	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi	14 gg	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PRAXIM®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	32
 FINOCCHIO	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	14 gg	72
	MAVITA® 250 EC	Ramularia	3 gg	53
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
 FINOCCHIO TRAPIANTATO	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	40 gg	25

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI specie autorizzate su pagina prodotto	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	17
	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	-	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	FOLPAN® 80 WDG	Botrite, Marciumi radicali e basali e Fitoftora	-	50
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	29
	MAVRIK® SMART	Afidi, larve di cocciniglia, Tripidi, Lepidotteri, Cicaline, Coleotteri, Acari	-	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	SCIROCCO 125 EW	Oidio, Ruggine	-	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 FRAGOLA (IN CAMPO)	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	KITAMBA®	Marciume bruno	40 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Lepidotteri tortricidi	7 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis gossypii</i>), Tripidi, Lepidotteri	7 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Marciume bruno del colletto, Vaiolatura, Maculatura zonata, Maculatura rosso-bruna, Maculatura angolare	3 gg	56
	NIMROD® 250 EW	Oidio	3 gg	60
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	1 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	ZAKEO® 250 SC	Oidio	3 gg	67
 FRAGOLA (IN SERRA)	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	KITAMBA®	Marciume bruno	40 gg	52
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp., <i>Phytonemus</i> spp.)	3 gg	75

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 FRAGOLA (IN SERRA)	NIMROD® 250 EW	Oidio	3 gg	60
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	1 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Oidio	3 gg	67
 FRUMENTO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	CERERIS	Ruggini e Fusariosi della spiga	35 gg	48
	CLEAVE®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	20
	ELEGANT® 2FD	Infestanti dicotiledoni e Fumaria (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	24
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrelia, Nottue	30 gg	72
	MAVRİK® SMART	Afidi (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>), Ditteri cecidomidi, Cimici, Cicaline	30 gg	74
	MIRADOR® SC	Ruggini, Septoria, Rincosporiosi	35 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septoria	35 gg	58
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro matur. latteo-cerosa	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Bibio hortulanus</i> , <i>Hylemya</i> sp., <i>Scutigerella immaculata</i> , <i>Tipula</i> sp., <i>Agriotes</i> sp., <i>Melolontha melolontha</i>)	-	77
	SCIROCCO 125 EW	Oidio, Ruggini, Septoria, Rincosporiosi	entro fioritura	62
	SEEDRON®	Concia dei semi contro Fusariosi, Carie, Carbone	-	63
	STAVENTO®	Septoria	42 gg	65
	STOPPER P	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	34
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TIMELINE® TRIO	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	38
	TIPTOR® ULTRA	Fusariosi, Septoria, Stagonospora, Ruggine bruna	entro fioritura	66
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
	TOPIK® 240 EC	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	40
	TRIMMER® 50 WG	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	28 gg	41

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 FRUTTA A GUSCIO specie autorizzate su pagina prodotto	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MERPAN® 80 WDG	Varie patologie fungine delle colture autorizzate (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro fine fioritura	54
 GIRASOLE	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	17
	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Altica, Meligete, Tentredine, Cimice, Cecidomia, Nottue defogliatrici	70 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	21 gg	76
	PRAXIM®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	32
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Agriotes</i> sp., <i>Agrotis</i> sp., <i>Chaetocnema tibialis</i> , <i>Hylemya</i> sp.)	-	77
 INDIVIA (IN CAMPO)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	14 gg	72
	MAVRİK® SMART	Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Uroleucon cichorii</i>), Tripidi, Miridi, Lepidotteri, Minatori fogliari	14 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Polyphagotarsonemus</i> spp.); Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	7 gg	75
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Bremia, Oidio	7 gg	67

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 INDIVIA (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	76
 KAKI	EXELGROW®	Biostimolante per miglioramento delle produzioni	-	81
 LAMPONE	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	7 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	7 gg	72
 LATTUGA (IN CAMPO)	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	14 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Uroleucon cichorii</i>), Tripidi, Miridi, Lepidotteri, Minatori fogliari	14 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Polyphagotarsonemus</i> spp.); Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	7 gg	75
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Bremia, Oidio	7 gg	67
 LATTUGA (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	76
 LATTUGA E SIMILI specie autorizzate su pagina prodotto	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	14 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Uroleucon cichorii</i>), Tripidi, Miridi, Lepidotteri, Minatori fogliari	14 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	ZAKEO® 250 SC	Bremia, Oidio	7 gg	67
 LENTICCHIA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	50 gg	17
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	14 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi	14 gg	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 LINO	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	17
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	21 gg	76
 LUPINO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	50 gg	17
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 MAIS	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrelia, Piralide, Diabrotica, Nottue	7 gg	72
	NICOGAN® V.O.	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	30
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro la fioritura	76
	PYXIDES® DUO	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	33
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Agriotes</i> sp., <i>Agrotis</i> sp., <i>Diabrotica</i> sp. <i>Hylemya</i> sp., <i>Scutigerella immaculata</i> , <i>Tipula</i> sp.)	-	77
	SULCOTREK®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	35
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
 MAIS DOLCE	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrelia, Piralide, Diabrotica, Nottue	7 gg	72
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Agriotes</i> sp., <i>Agrotis</i> sp., <i>Diabrotica</i> sp. <i>Hylemya</i> sp., <i>Scutigerella immaculata</i> , <i>Tipula</i> sp.)	-	77
 MANDORLO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Agrilo, Maggiolino	7 gg	72
	MERPAN® 80 WDG	Fusicocco, Bolla,Ticchiolatura, Corineo, Polistigma	entro fine fioritura	54
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 MELANZANA (IN CAMPO)	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 MELANZANA (IN CAMPO)	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Cladosporiosi, Alternaria, Oidio, Micosferella, Septoria, Uromyces	7 gg	53
	MAVRİK® SMART	Afidi (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum</i> spp.), Tripidi, Lepidotteri	3 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Marciume pedale del fusto, Antracnosi, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Alternaria, Peronospora, Oidio	3 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Oidio	3 gg	58
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	3 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	7 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Cladosporiosi, Fitoftora, Oidio	3 gg	67
 MELANZANA (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	MAVITA® 250 EC	Cladosporiosi, Alternaria, Oidio, Micosferella, Septoria, Uromyces	3 gg	53
	MEXIRAM® HI BIO	Marciume pedale del fusto, Antracnosi, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Alternaria, Peronospora, Oidio	3 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Oidio	3 gg	58
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	3 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria,Cladosporiosi, Fitoftora, Oidio	3 gg	67
 MELO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	APOLLO® SC	Acari (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> e <i>Epirimerus pyri</i> .)	35 gg	71

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 MELO	BANJO®	Ticchiolatura, Alternaria	60 gg	46
	BREVIS®	Dirado	60 gg	80
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Cemiostoma, Litocollete, Carpocapsa, Ricamatrici estive, Lepidotteri, Psilla	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Ticchiolatura, Oidio	14 gg	53
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), Ditteri cecidomidi Lepidotteri, Cimice asiatica, forme mobili giovanili di Cocciniglia e Psille	30 gg	74
	MERPAN® 80 WDG	Ticchiolatura, Gleosporio, Maculatura bruna del pero	21 gg	54
	MERPLUS®	Ticchiolatura, Maculatura bruna, Cancri, Patologie post-raccolta	28 gg	55
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	14 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	14 gg	62
 MELOGRANO	EXELGROW®	Biostimolante per miglioramento delle produzioni	-	81
 MELONE (IN CAMPO)	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	65 gg	17
	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Pseudoperonospora	7 gg	49
	KITAMBA®	Pseudoperonospora, Alternaria	20 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 MELONE (IN CAMPO)	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum</i> spp.), Tripidi	7 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antracnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	7 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	5 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	7 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 MELONE (IN SERRA)	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Pseudoperonospora	7 gg	49
	KITAMBA®	Pseudoperonospora, Alternaria	20 gg	52
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Oidio	7 gg	58
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
 MORA	SCIROCCO 125 EW	Oidio	7 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 MORA	EXELGROW®	Biostimolante per miglioramento delle produzioni	-	81

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 NASHI	BANJO®	Ticchiolatura, Alternaria, Maculatura bruna	60 gg	46
	MERPAN® 80 WDG	Ticchiolatura, Gleosporio, Maculatura bruna del pero	21 gg	54
	MERPLUS®	Ticchiolatura, Maculatura bruna, Cancri, Patologie post-raccolta	28 gg	55
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
 NAVONE	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
 NESPOLO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	BANJO®	Ticchiolatura, Alternaria	60 gg	46
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), Ditteri cecidomidi Lepidotteri, Cimice asiatica, forme mobili giovanili di Cocciniglia e Psille	30 gg	74
 NESPOLO DEL GIAPPONE	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	BANJO®	Ticchiolatura, Alternaria	60 gg	46
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 NETTARINO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca della frutta, Lepidotteri, Cocciniglie, Tripidi	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Hyalopterus amygdali</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus persicae</i>), Lepidotteri, Tripidi, Cimice asiatica, Mosche della frutta	30 gg	74
	MERPAN® 80 WDG	Bolla, Corineo, Fusicocco, Monilia	21 gg	54
	NIMROD® 250 EW	Oidio	7 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 NETTARINO	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	14 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
 NOCCIOLO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	APOLLO® SC	Acari (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Phytoptus avellanae</i> e <i>Eotetranychus carpini</i>)	50 gg	71
	LAMDEX® EXTRA	Agrilo, Maggiolino	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MERPAN® 80 WDG	Alternaria, Antracnosi	entro fine fioritura	54
 NOCE	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 OLIVO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MERPAN® 80 WDG	Antracnosi	entro fine fioritura	54
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 OLIVO	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	21 gg	28
	MAVITA® 250 EC	Occhio di pavone	30 gg	53
	MEXIRAM® HI BIO	Occhio di pavone, Cercosporiosi, Lebbra, Rogna, Fumaggine, az. collaterale su Marciume delle drupe	14 gg	56
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto), controllo dei polloni	30 gg (o. da tavola) 90 gg (o. da olio)	39

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 ORZO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	CERERIS	Fusariosi della spiga	35 gg	48
	CLEAVE®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	20
	ELEGANT® 2FD	Infestanti dicotiledoni e Fumaria (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	24
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrelia, Nottue	40 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>), Ditteri cecidomidi, Cimici, Cicaline	30 gg	74
	MIRADOR® SC	Ruggini, Septoria, Rincosporiosi	35 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Oidio, Ruggini, Rincosporiosi, Elmintosporiosi	35 gg	58
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro matur. Latteo-cerosa	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio, Ruggini, Septoria, Rincosporiosi	entro fioritura	62
	SEEDRON®	Concia dei semi contro Fusariosi, Carbone, Striatura bruna	-	63
	STOPPER P	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	34
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
	TRIMMER® 50 WG	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	28 gg	41
 PATATA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	40 gg	17
	BANJO®	Peronospora	7 gg	46
	CARSON 45 WG	Peronospora	14 gg	47
	CLEMATIS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	21
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
	KITAMBA®	Fitoftora, Alternaria	20 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	15 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Alternaria, Micosferella, Oidio, Septoria, Uromyces	3 gg	53
	MAVRIK® SMART	Dorifora, Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbia</i>)	14 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Peronospora, Batteriosi	7 gg	56

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 PATATA	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	PRAXIM®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	32
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Agriotes</i> spp.)	-	77
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	ZAKEO® 250 SC	Rizoctosi, Antracnosi	-	67
 PEPERONE (IN CAMPO)	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	MEXIRAM® HI BIO	Fitoftora	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Alternaria, Peronospora, Oidio	3 gg	57
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	3 gg	60
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	7 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Cladosporiosi, Fitoftora, Oidio	3 gg	67
 PEPERONE (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	MEXIRAM® HI BIO	Fitoftora	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Alternaria, Peronospora, Oidio	3 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Oidio	3 gg	58
	NIMROD® 250 EW	Oidio	3 gg	60
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Cladosporiosi, Fitoftora, Oidio	3 gg	67
 PERO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	APOLLO® SC	Acari (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> e <i>Epirimerus pyri</i> .)	35 gg	71

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 PERO	BANJO®	Ticchiolatura, Alternaria, Maculatura bruna	60 gg	46
	BREVIS®	Dirado	60 gg	80
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Cemiostoma, Litocollete, Carpocapsa, Ricamatrici estive, Lepidotteri, Psilla	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Ticchiolatura, Oidio	14 gg	53
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i>), Ditteri cecidomidi, Lepidotteri, Cimice asiatica, forme mobili giovanili di Cocciniglia e Psille	30 gg	74
	MERPAN® 80 WDG	Ticchiolatura, Gleosporio, Maculatura bruna del pero	21 gg	54
	MERPLUS®	Ticchiolatura, Maculatura bruna, Cancri, Patologie post-raccolta	28 gg	55
	MITOR®	Psilla, Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	3 gg	75
	MOMENTUM®	Gemme nere	15 gg	59
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	14 gg	62
 PESCO	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca della frutta, Lepidotteri, Cocciniglie, Tripidi	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Bolla del pesco, Monilia	7 gg	53
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Hyalopterus amygdali</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus persicae</i>), Lepidotteri, Tripidi, Cimice asiatica, Mosche della frutta	30 gg	74
	MERPAN® 80 WDG	Bolla, Corineo, Fusicocco, Monilia	21 gg	54
	NIMROD® 250 EW	Oidio	7 gg	60

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 PESCO	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	14 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
 PIOPPPO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	40 gg fresco, 50 gg secco	17
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	25
 PISELLO	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	7 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	42 gg fresco, 30 gg secco	29
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Acyrtosiphon pisum</i> , <i>Aphis fabae</i>), Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi	7 gg fresco, 14 gg secco	74
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	ZAKEO® 250 SC	Ruggine, Antracnosi, Oidio, Peronospora	14 gg fresco, 35 gg secco	67
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
 PISTACCHIO	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MERPAN® 80 WDG	Septoria, Alternaria, Cancri rameali	entro fine fioritura	54

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 POMODORO (IN CAMPO)	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	CARSON 45 WG	Peronospora	10 gg industria 3 gg mensa	47
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Fitoftora	10 gg industria 3 gg mensa	49
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	25
	FOLPAN® 80 WDG	Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Septoria e Botrite	10 gg	50
	KITAMBA®	Fitoftora, Alternaria, Batteriosi	10 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Cladosporiosi, Alternaria, Oidio, Micosferella, Septoria, Uromyces	7 gg	53
	MEXIRAM® HI BIO	Fitoftora, Marciume zonato, Septoria, Cladosporiosi, Alternaria, Nerume del pomodoro, Batteriosi	10 gg industria 3 gg mensa	56
	MIRADOR® SC	Alternaria, Peronospora, Oidio	3 gg	57
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	3 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	QUANTUM® L	Peronospora	7 gg	61
 POMODORO (IN SERRA)	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	SCIROCCO 125 EW	Oidio, Cladosporiosi	7 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria,Cladosporiosi, Fitoftora, Oidio	3 gg	67
	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Fitoftora	3 gg	49
	FOLPAN® 80 WDG	Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Septoria e Botrite	10 gg	50

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 POMODORO (IN SERRA)	KITAMBA®	Fitoftora, Alternaria, Batteriosi	10 gg	52
	MAVITA® 250 EC	Cladosporiosi, Alternaria, Oidio, Micosferella, Septoria, Uromyces	3 gg	53
	MEXIRAM® HI BIO	Fitoftora, Marciume zonato, Septoria, Cladosporiosi, Alternaria, Nerume del pomodoro, Batteriosi	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Alternaria, Peronospora, Oidio	3 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Oidio	3 gg	58
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	3 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria,Cladosporiosi, Fitoftora, Oidio	3 gg	67
 PORRO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	14 gg	72
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Peronospora, Ruggine	21 gg	67
 PREZZEMOLO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Peronospora, Septoria	7 gg campo 14 gg serra	67
 RADICCHIO (IN CAMPO)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	14 gg	72
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Bremia, Oidio	7 gg	67

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 RADICCHIO (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	76
 RAFANO	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
 RAPA	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
 RAVANELLO	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
 RAVIZZONE	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Altica, Meligete, Tentredine, Cimice, Cecidomia, Nottue defogliatrici	30 gg	72
 RIBES	EXELGROW®	Biostimolante per miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	7 gg	72
 RISO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee e riso crodo (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	17
	CLEMATIS®	Controllo dei giovani	-	21
	MIRADOR® SC	Brusone, Elmintosporiosi	28 gg	57
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 RISO	POSTSCRIPT®	Erbicida per varietà e ibridi di riso Full Page® e tolleranti agli erbicidi Imidazolinoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	31
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 ROSA	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	-	71
	FOLPAN® 80 WDG	Botrite, Marciumi radicali e basali e Fitoftora	-	50
	MAVRİK® SMART	Afidi, larve di Cocciniglia, Tripidi, Lepidotteri, Cicaline, Coleotteri, Acari	-	74
	NIMROD® 250 EW	Oidio	-	60
	SCIROCCO 125 EW	Oidio, Ruggine	-	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 RUCOLA (IN CAMPO)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	7 gg	72
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
 RUCOLA (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	76
 SCALOGNO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 SCALOGNO	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	ZAKEO® 250 SC	Alternaria, Peronospora, Ruggine	14 gg	67
 SCAROLA (IN CAMPO)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	14 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Myzus persicae</i> , <i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Uroleucon cichorii</i>), Tripidi, Miridi, Lepidotteri, Minatori fogliari	14 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Polyphagotarsonemus</i> spp.); Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	7 gg	75
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Bremia, Oidio	7 gg	67
 SCAROLA (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	MEXIRAM® HI BIO	Bremia, Cercosporiosi delle insalate, Alternariosi delle crucifere, Antrcnosi, Batteriosi	7 gg	56
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	14 gg	76
 SCORZONERA	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	21 gg	72
 SEDANO (IN CAMPO)	MAVITA® 250 EC	Alternaria, Micosferella, Oidio, Septoria, Uromyces	14 gg	53
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
	ZAKEO® 250 SC	Septoria, Cercospora, Alternaria, Oidio	14 gg	67

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 SEDANO (IN SERRA)	MAVITA® 250 EC	Alternaria, Micosferella, Oidio, Septoria, Uromyces	14 gg	53
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
 SEGALE	CLEAVE®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	20
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrelia, Nottue	30 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>), Ditteri cecidomidi, Cimici, Cicaline	30 gg	74
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro matur. latteo-cerosa	76
	SEEDRON®	Concia dei semi contro Fusariosi, Carbone	-	63
	STOPPER P	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	34
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
 SENAPE	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	EXTASE® R	Bremia	7 gg	49
 SOIA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	17
	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
	CLEMATIS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	21
	DAVAI®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	23
	FEINZIN® 70 DF	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	25
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Altica, Meligete, Tentredine, Cimice, Cecidomia, Nottue defogliatrici	15 gg	72
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	60 gg	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PRAXIM®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	32
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Agriotes</i> sp., <i>Agrotis</i> sp. <i>Chaetocnema tibialis</i> , <i>Hylemya</i> sp.)	-	77
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	VALLEY®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	42

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 SORGO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrelia, Nottue	30 gg	72
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro la fioritura	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Agriotes</i> sp., <i>Agrotis</i> sp., <i>Diabrotica</i> sp. <i>Hylemya</i> sp., <i>Scutigerella immaculata</i> , <i>Tipula</i> sp.)	-	77
 SPINACIO	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	17
	ANTIGRAM® GOLD	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	18
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 SUSINO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca della frutta	7 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	tratt. senza frutti	29
	MERPAN® 80 WDG	Corineo, Monilia	21 gg	54
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
 TABACCO	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	40 gg	17
	AVANA®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto) e controllo gemme ascellari	21 gg	19
	CLEMATIS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	21
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	60 gg	72

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 TABACCO	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	40 gg	29
	MEXIRAM® HI BIO	Peronospora	20 gg	56
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (<i>Agriotes</i> spp., <i>Agrotis</i> spp., <i>Tipula</i> spp.)	-	77
 TAPPETI ERBOSI	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AVANA®	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	19
	EXELGROW®	Biostimolante per affrancamento zolle e antistress	-	81
 TRIFOGLIO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	45 gg	17
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro chiusura fila	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 TRITICALE	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	CLEAVE®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	20
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Sitobion avenae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>), Ditteri cecidomidi, Cimici, Cicaline	30 gg	74
	MIRADOR® TURBO	Fusariosi, Oidio, Ruggini, Septoria	35 gg	58
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro matur. latteo-cerosa	76
	SEEDRON®	Concia dei semi contro Fusariosi, Carbone	-	63
	STOPPER P	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	90 gg	34
	TOMIGAN®	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	15 gg	39
	TRIMMER® 50 WG	Infestanti dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	28 gg	41
 UVA SPINA	EXELGROW®	Biostimolante per miglioramento delle produzioni	-	81
	LAMDEX® EXTRA	Afidi	7 gg	72

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 VALERIANELLA (IN CAMPO)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	KITAMBA®	Bremia	15 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Tripidi, Pulce del tabacco, Nottue defogliatrici	14 gg	72
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Polyphagotarsonemus</i> spp.); Minatrici fogliari (<i>Liriomyza</i> spp.)	7 gg	75
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCHERMO® 0.5 G	Insetti terricoli e fogliari (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	77
 VECCIA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	45 gg	17
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	entro chiusura fila	29
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
 VITE DA TAVOLA	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	CARSON 45 WG	Peronospora	28 gg	47
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Peronospora	21 gg	49
	FOLPAN® 80 WDG	Peronospora, Escoriosi, Marciume nero e bianco; az. collaterale su Oidio, Botrite e Marciumi secondari	56 gg	50
	KITAMBA®	Peronospora	28 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Tignola, Tignoletta, Cocciniglie, Cicaline, Sigaraio	21 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	45 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Black rot, Oidio	21 gg	53
	MAVRİK® SMART	Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> , <i>Scaphoideus titanus</i>), Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Drepanothrips reuteri</i>), Drosifila	21 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Peronospora, az. collaterale su Escoriosi, Black rot, Melanosi, Rossore parassitario	21 gg	56
	MIRADOR® TURBO	Oidio	21 gg	58
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp.)	10 gg	75

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 VITE DA TAVOLA	MOMENTUM®	Peronospora	28 gg	59
	NIMROD® 250 EW	Oidio	14 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	QUANTUM® L	Peronospora	10 gg	61
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	30 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 VITE DA VINO	ACTIVUS® ME	Infestanti graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	16
	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	30 gg	17
	APOLLO® SC	Acari (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i> , <i>Eotetranychus carpini</i> e <i>Calepitrimerus vitis</i>)	30 gg	71
	BANJO®	Peronospora	21 gg	46
	CARSON 45 WG	Peronospora	28 gg	47
	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Peronospora	21 gg	49
	FOLPAN® 80 WDG	Peronospora, Escoriosi, Marciume nero e bianco; az. collaterale su Oidio, Botrite e Marciumi secondari	28 gg	50
	FOLPAN® GOLD	Peronospora	28 gg	51
	KITAMBA®	Peronospora	28 gg	52
	LAMDEX® EXTRA	Tignola, Tignoletta, Cocciniglie, Cicaline, Sigaraio	21 gg	72
	LENNS®	Infestanti graminacee e dicotiledoni emerse (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	28
	LEOPARD® 5 EC	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	45 gg	29
	MAVITA® 250 EC	Black rot, Oidio	21 gg	53
	MAVRİK® SMART	Cicaline (<i>Empoasca vitis</i> , <i>Scaphoideus titanus</i>), Tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Drepanothrips reuteri</i>), Drosifila	21 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Peronospora, az. collaterale su Escoriosi, Black rot, Melanosi, Rossore parassitario	21 gg	56
	MIRADOR® TURBO	Oidio	21 gg	58
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp.)	10 gg	75
	MOMENTUM®	Peronospora	28 gg	59
	NIMROD® 250 EW	Oidio	14 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82

Sinottico colture

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 VITE DA VINO	QUANTUM® L	Peronospora	10 gg	61
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	30 gg	62
	TAIFUN® MK CL	Diserbo non selettivo contro graminacee e dicotiledoni (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	37
 ZUCCA (IN CAMPO)	AGIL®	Infestanti graminacee (vd dettaglio su pagina prodotto)	65 gg	17
	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antracnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	7 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	5 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 ZUCCA (IN SERRA)	APOLLO® SC	Acari (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 gg	71
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PARLEAF	Coadiuvante naturale per miscela con erbicidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	-	82
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
 ZUCCHINO (IN CAMPO)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	EXTASE® R	Pseudoperonospora	3 gg	49
	LAMDEX® EXTRA	Afidi, Mosca bianca, Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi, Cimici, Nottue defogliatrici	3 gg	72
	MAVRIK® SMART	Afidi (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum</i> spp.), Tripidi	7 gg	74
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antracnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60

COLTURA	PRODOTTO	AVVERSITÀ	INTERVALLO SICUREZZA	PAGINA
 ZUCCHINO (IN CAMPO)	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	3 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	3 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67
 ZUCCHINO (IN SERRA)	EXELGROW®	Biostimolante per accrescimento vegetativo e miglioramento delle produzioni	-	81
	MEXIRAM® HI BIO	Pseudoperonospora, Antracnosi, Maculatura angolare, az. collaterale su Marciume molle batterico, Botrite	3 gg	56
	MIRADOR® SC	Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	57
	MIRADOR® TURBO	Oidio	3 gg	58
	MITOR®	Acari (<i>Tetranychus</i> spp., <i>Panonychus</i> spp., <i>Phytonemus</i> spp.)	3 gg	75
	NIMROD® 250 EW	Oidio	1 gg	60
	PIRIMOR® 50	Afidi (vd dettaglio su pagina prodotto)	7 gg	76
	SCIROCCO 125 EW	Oidio	3 gg	62
	ZAKEO® 250 SC	Cancro gommoso, Oidio, Pseudoperonospora	3 gg	67

Note

**ADAMA****Listen ▶ Learn ▶ Deliver**

Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Adama Italia non risponde di eventuali danni causati dall'uso dei prodotti in dosi e in modi non conformi a quanto indicato nella etichetta ministeriale. Prodotti fitosanitari Autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

RICORDATI
DI SCARICARE
LA APP ADAMA!



Adama Italia S.r.l. Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia - www.adama.com