# Catalogo 2027

ADAMA.COM

ADAMA



2027

# In Campo con ADAMA

Ogni nuova campagna rappresenta un'opportunità per guardare avanti e confermare il nostro impegno nel supportare l'agricoltura italiana con soluzioni sempre più complete, innovative e vicine alle esigenze del territorio. La campagna 2026-2027 segna un nuovo passo in questo percorso, costruito attraverso investimenti continui, ricerca e una presenza costante al fianco di agricoltori e distributori.

La nostra strategia nasce dall'ascolto delle esigenze del mercato e si traduce nello sviluppo di soluzioni concrete, pensate per rispondere alle specificità dei diversi areali produttivi italiani. È un percorso che negli ultimi anni ha visto un importante rafforzamento della nostra offerta e che continua oggi con nuove proposte capaci di generare valore per tutta la filiera.

Negli ultimi anni abbiamo introdotto importanti novità per il mondo cerealicolo con il lancio di Edaptis®, Maxentis®, Maganic® e Avastel®, confermando il nostro impegno nel mettere a disposizione degli agricoltori soluzioni sempre più complete e performanti. Oggi questo percorso prosegue con Timeline® FX, che arricchisce la nostra gamma dedicata ai cereali e rappresenta un ulteriore tassello di un piano di sviluppo di lungo periodo.

Nei prossimi anni continueremo a investire per offrire una proposta sempre più completa e innovativa per il mais, con importanti novità che nasceranno dall'introduzione della nuova tecnologia formulativa Isondalis®. Un'innovazione che testimonia la volontà di ADAMA di anticipare le esigenze del mercato, mettendo a disposizione soluzioni sempre più efficaci, pratiche e orientate alla sostenibilità dell'agricoltura moderna.

Accanto a questa linea, continuiamo a sviluppare un portafoglio di soluzioni complete dedicate alle principali colture italiane, tra cui vite, pomacee, riso, soia e orticole, con l'obiettivo di sostenere ogni azienda agricola nelle diverse sfide produttive.

Oggi più che mai vogliamo essere al fianco di chi crede e investe nell'agricoltura italiana. Lo facciamo con oltre 70 anni di esperienza, una presenza consolidata in più di 100 Paesi e, soprattutto, con la volontà di creare valore attraverso l'innovazione, la solidità ed affidabilità delle nostre soluzioni e una presenza costante sul territorio.

Il nostro percorso non si ferma qui. Continueremo a investire nello sviluppo di nuove soluzioni e vi invitiamo fin da ora a visitare i nostri campi prova nella prossima primavera, per vedere da vicino i risultati dell'innovazione ADAMA e costruire insieme il futuro dell'agricoltura.

**VALORE**
per i nostri partner

**INNOVAZIONE**
dei nostri prodotti

**FORZA**
del gioco di squadra

# La nostra storia

## 1945
Viene fondata Agan Chemical

## 1952
Viene fondata Makhteshim Chemical Works

## 1958
Vlene fondata Sanonda

## 1982
Agan viene quotato al TASE

## 1992
Makhteshim viene quotato al TASE

## 1993
Sanonda diventa quotata in borsa alla Borsa di Shenzhen

## 1998
Fusione di Makhteshim e Agan. Quotata al TASE

## 2005
ChemChina diventa il maggiore azionista di Sanoda

## 2011
ChemChina acquisisce il 60% della proprietà

## 2014
Lancio del marchio globale ADAMA. Nuova struttura organizzativa della leadership

ADAMA

## 2016
ChemChina acquisisce il 100% della proprietà

## 2017
ADAMA e Sanonda si uniscono per creare il primo leader globale e cinese integrato nella protezione delle colture.

ADAMA Ltd. diventa quotata in borsa alla Borsa di Shenzhen

## 2020
ADAMA diventa un membro distintivo del leader del settore Syngenta Group

ADAMA

# Listen ▸ Learn ▸ Deliver

## LISTEN

Un’esperienza attiva che richiede abilità, pensiero e intenzione.

Creare opportunità di ascolto coerenti con agricoltori, clienti, esperti e colleghi.

## LEARN

Integrare le informazioni e il sapere che acquisiamo esternamente con le competenze e il know-how che offriamo.

Trasformare intuizioni in idee concrete.

## DELIVER

Fornire risposte è nel nostro DNA: sfruttare il nostro approccio completo per rispondere in modo specifico alle esigenze dei clienti.

Forniamo soluzioni solo dopo aver prima ascoltato e imparato.

Progettiamo e realizziamo il prodotto partendo dal campo, attraverso l’ascolto degli agricoltori e dei bisogni locali, fornendo soluzioni che rispondono direttamente alle loro esigenze.

ADAMA

# Adama nel mondo

## Con un patrimonio di oltre 70 anni, ADAMA è una delle più grandi aziende nel settore globale nella protezione delle colture.

ADAMA fornisce soluzioni ad agricoltori e clienti di tutto il mondo per combattere le problematiche di tutti i giorni aiutandoli a crescere.

Un percorso di evoluzione e trasformazione nel quale ADAMA Italia porta in dote una profonda conoscenza del sistema agricolo italiano, delle sue colture specifiche e dei suoi protagonisti.

**$ 4.1 Miliardi di vendite**

**>7600 Persone**

**Presente in oltre 100 paesi**

**+300 Principi attivi**

**4 Centri globali di Sviluppo Prodotti**

**20 Siti produttivi**



# Adama in campo

ADAMA è sempre al tuo fianco quando si parla di difesa delle colture. Le prove in campo dei prodotti sono un'occasione per condividere esperienze e conoscenze e vedere in anteprima le nostre soluzioni.

## VIVILE CON NOI!


Grosseto


Ascoli Satriano




Ravenna


Bologna


Foggia


Marsala


Piacenza

ADAMA in CAMPO

# Sommario generale




| | |
|---|---|
| ACTIVUS® ME | 17 |
| AGIL® | 18 |
| APYZA® WG | 61 |
| ARRODIM® | 19 |
| AVASTEL® | 43 |
| BANJO® | 44 |
| BREVIS® | 71 |
| CONTATTO® 320 | 20 |
| COSAYR® 200 SC Novità | 62 |
| DAVAI® | 21 |
| DIODE® | 22 |
| EDAPTIS® | 23 |
| ELEGANT® 2FD | 24 |
| EXELGROW® | 72 |
| FOLPAN® 80 WDG | 45 |
| FOLPAN® ENERGY | 46 |
| FOLPAN® GOLD | 47 |
| GOLTIX® BETA | 25 |
| GOLTIX® TOP | 26 |
| HIGHCARD® | 27 |
| LAMDEX® EXTRA | 63 |
| LAZULIE® Novità | 48 |
| LEOPARD® 5 EC | 28 |
| MAGANIC® | 49 |
| MAVITA® 250 EC | 50 |
| MAVRIK® SMART | 65 |
| MAXENTIS® | 51 |
| MERPAN® 80 WDG | 52 |
| MIRADOR® SC | 53 |
| NICOGAN® V.O. | 29 |
| NIMROD® 250 EW | 54 |
| PARLEAF® | 73 |
| PIRIMOR® 50 | 66 |
| POSTSCRIPT® 80 XL | 30 |
| POWERFILM® | 74 |
| SCHERMO® 0.5 G | 67 |
| SONAVIO® | 31 |
| STAVENTO® | 55 |
| STOPPER® P | 32 |
| SULTAN® | 34 |
| SULCOTREK® | 33 |
| TAIFUN® MK CL | 35 |
| TIMELINE® FX Novità | 36 |
| TOMIGAN® | 37 |
| TRIMMER® 50 WG | 38 |
| VALLEY® | 39 |
| ZAKEO® 250 SC | 56 |

# ERBICIDI

## Sommario


| | |
|---|---|
| ACTIVUS® ME | 17 |
| AGIL® | 18 |
| ARRODIM® | 19 |
| CONTATTO® 320 | 20 |
| DAVAI® | 21 |
| DIODE® | 22 |
| EDAPTIS® | 23 |
| ELEGANT® 2FD | 24 |
| GOLTIX® BETA | 25 |
| GOLTIX® TOP | 26 |
| HIGHCARD® | 27 |
| LEOPARD® 5 EC | 28 |
| NICOGAN® V.O. | 29 |
| POSTSCRIPT® 80 XL | 30 |
| SONAVIO® | 31 |
| STOPPER® P | 32 |
| SULCOTREK® | 33 |
| SULTAN® | 34 |
| TAIFUN® MK CL | 35 |
| TIMELINE® FX Novità | 36 |
| TOMIGAN® | 37 |
| TRIMMER® 50 WG | 38 |
| VALLEY® | 39 |



# ACTIVUS® ME




Erbicida residuale di pre e post-emergenza precoce, per orticole, frutticole, vite ed estensive.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione acquosa concentrata di capsule | Pendimetalin (400 g/L) | 3 (K1) | 17116 del 07/12/2017 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Agrumi, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Pesco Nettarino, Albicocco, Ciliegio, Susino | 3 L/ha | Da post-raccolta fino a inizio allegagione, in pre-emergenza delle infestanti | - |
| Mandorlo, Nocciolo, Castagno, Noce, Pistacchio | 3 L/ha | Da post-raccolta a inizio allegagione, in pre-emergenza delle infestanti | - |
| Uva da vino, Uva da tavola | 3 L/ha | Da post-raccolta fino a bottoni fiorali separati, in pre-emergenza delle infestanti | - |
| Fragola | 3 L/ha | In pre-trapianto o, durante il periodo invernale, in post-trapianto tra le file | - |
| Patata | 3 L/ha | In pre-emergenza | - |
| Carota | 2,5 L/ha | In pre-emergenza o post-emergenza (3-4 foglie) | - |
| Aglio, Scalogno, Cipolla, Porro | 2,5 L/ha | In pre-trapianto (fino al giorno prima), in pre-emergenza o in post-emergenza/post-trapianto (2-4 foglie) | - |
| Pomodoro, Melanzana, Peperone, Melone | 2,5 L/ha | In pre-trapianto | - |
| Cavoli a testa, Cavoli a infiorescenza, Cavoletti di Bruxelles | 2,5 L/ha | In pre-trapianto | - |
| Lattughe, Scarole, Cicorie (eccetto Witloof/Belga) | 2,5 L/ha | In pre-trapianto | - |
| Carciofo | 3 L/ha | In pre-emergenza o pre-ricaccio o, su coltura in vegetazione, solo nelle interfile e intorno ai ceppi | - |
| Fagioli e Fagiolini, Piselli, Fava, Favino, Cece, Lenticchia, Veccia, Lupino, Leguminose da foraggio | 2,5 L/ha | In pre-emergenza | - |
| Soia | 2,5 L/ha | In pre-emergenza | - |
| Girasole | 3 L/ha | In pre-emergenza | - |
| Riso seminato in asciutta, compresi gli arginelli | 2,5 L/ha | In pre-emergenza | - |
| Mais e Mais dolce | 3 L/ha | In pre-emergenza o post-emergenza (2 foglie) | - |
| Sorgo | 3 L/ha | In pre-emergenza | - |
| Tappeti erbosi | 2,5 L/ha | In post-emergenza dal secondo anno d'impianto | - |
| Piante ornamentali, Pioppo, Vivai | 3 L/ha | Durante la fase di dormienza | - |
| Tabacco | 3 L/ha | In pre trapianto | |
| Cereali | 2,5 L/ha | In pre-emergenza o post-emergenza prima di inizio accestimento. | |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| **Graminacee** |
| Digitaria sanguinalis (Sanguinella) |
| Panicum dicothomiflorum (Giavone americano) |
| **Dicotiledoni** |
| Anagallis arvensis (Anagallide) |
| Lamium spp. (Falsa ortica) |
| Sinapis arvensis (Senape selvatica) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI | |
|---|---|
| **Graminacee** | |
| Alopecurus myosuroides (Coda di volpe) | |
| Echinochloa crus-galli (Giavone comune) | |
| Setaria spp. (Pabbio) | |
| Sorghum halepense (Sorghetta - da seme) | |
| **Dicotiledoni** | |
| Amaranthus spp. (Amaranto) | Portulaca oleracea (Porcellana comune) |
| Chenopodium spp. (Farinello) | Senecio vulgaris (Senecione) |
| Papaver rhoeas (Papavero) | Solanum nigrum (Erba morella) |
| Matricaria chamomilla (Camomilla) | Urtica urens (Ortica) |
| Polygonum spp. (Poligono) | Veronica spp. (Veronica) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H410, H361D, EUH401, EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# AGIL®

1L 5L

Erbicida graminicida di post-emergenza, selettivo per soia e altre oleaginose, orticole, frutticole e vite.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Concentrato emulsionabile | Propaquizafop (100 g/L) | 1 (A) | 9005 del 02-12-1996 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Lino, Colza, Girasole, Soia | 0,8-2,0 L/ha | - | 90 giorni |
| Cocomero, Melone, Zucca | 0,8-2,0 L/ha | - | 65 giorni |
| Cotone | 0,8-2,0 L/ha | - | 60 giorni |
| Barbabietola da zucchero e da foraggio | 0,8-2,0 L/ha | - | 45 giorni |
| Tabacco | 0,8-2,0 L/ha | - | 40 giorni |
| Melo, Pero, Nespolo del Giappone, Cotogno, Pesco, Nettarino, Albicocco, Susino, Ciliegio, Vite, Arancio, Clementino, Mandarino, Limone, Pompelmo, Chinotto, Bergamotto, Cedro, Frutta a guscio, Pomodoro, Melanzana, Broccoli, Cavolfiore, Cavolo cappuccio | 0,8-2,0 L/ha | - | 30 giorni |
| Piante ornamentali, Vivai e piante forestali | 0,8-2,0 L/ha | - | - |
| Fagiolo e pisello (per consumo secco, fresco con e senza baccello), Cece, Favino, Fava, Lenticchia, Lupino | 0,8-1,5 L/ha | - | 40 giorni (consumo fresco) 50 giorni (consumo secco) |
| Erba medica, Trifoglio, Veccia | 0,8-1,5 L/ha | - | 45 giorni |
| Patata | 0,8-1,5 L/ha | - | 40 giorni |
| Carota, Prezzemolo a grossa radice, Aglio, Cipolla, Scalogno | 0,8-1,5 L/ha | - | 30 giorni |
| Spinacio | 0,8-1,5 L/ha | - | 30 giorni |
| Lattuga, Asparago, Finocchio | 0,8-1,2 L/ha | - | 30 giorni |
| Riso | 1-1,2 L/ha | Trattamenti in pre-semina, dopo l'emergenza di riso crodo e giavone | - |
| Basilico | 0.8-1.2 L/ha | - | 30 giorni |
| Prezzemolo | 0.8-1.2 L/ha | - | 30 giorni |
| Coriandolo da seme | 0.8-2 L/ha | - | - |
| Carciofo | 0.8-1.2 L/ha | - | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Avena spp. (Avena) |
| Bromus sterilis (Forasacco rosso) |
| Echinochloa crus-galli (Giavone) |
| Hordeum vulgare (Orzo) |
| Lolium spp. (Loglio) |
| Panicum dichotomiflorum (Giavone americano) |
| Panicum miliaceum (Miglio) |
| Phalaris spp. (Falaride) |
| Setaria spp. (Setaria) |
| Sorghum halepense (Sorghetta) |
| Triticum spp. (Frumento) |
| nonché nascite spontanee di cereali |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Agropyron repens (Falsa gramigna) |
| Alopecurus myosuroides (Coda di volpe) |
| Cynodon dactylon (Gramigna) |
| Digitaria sanguinalis (Sanguinella) |
| Oryza rufipogon (Riso crodo) |
| Poa spp. (Fienarola) |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H304, H319, H332, H411, EUH066, EUH208, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# ARRODIM®

1L 5L

Erbicida graminicida di post-emergenza, selettivo per soia, pomodoro e barbabietola da zucchero.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Concentrato emulsionabile | Clethodim (240 g/L) | 1 (A) | 18111 del 10-10-2023 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Pomodoro | 1,25 L/ha | - | 30 giorni |
| Barbabietola da zucchero e da foraggio | 1,25 L/ha | - | 60 giorni |
| Soia | 1,25 L/ha | - | 60 giorni |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Avena spp. (Avena) |
| Ricacci di cereali |
| Echinochloa spp. (Giavone) |
| Lolium spp. (Loglio) |
| Panicum spp. (Falso panico) |
| Phalaris spp. (Falaride) |
| Setaria spp. (Setaria) |
| Sorghum halepense (Sorghetta) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Digitaria sanguinalis (Sanguinella) |
| Poa spp. (Fienarola) |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H304, H317, H336, H411, EUH066, EUH 401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# CONTATTO® 320




Erbicida di post-emergenza selettivo per barbabietola da zucchero, da foraggio e bietola rossa.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Fenmedifam (320 g/L) | 5 (C1) | 9790 del 30-10-1998 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Barbabietola da zucchero e da foraggio, Bietola rossa | 2-3 L/ha | Dall'emergenza della coltura fino alla chiusura delle file. Consigliato in miscela con prodotti a base di Etofumesate con coltura allo stadio di almeno 2-4 foglie vere | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Amaranthus retroflexus (Amaranto comune) |
| Chenopodium album (Farinaccio comune) |
| Daucus carota (Carota selvatica) |
| Echinochloa crus-galli (Giavona comune) |
| Fumaria officinalis (Fumaria) |
| Lamium amplexicaule (Falsa ortica reniforme) |
| Mercurialis annua (Mercorella comune) |
| Lolium multiflorum (Loglio italico) |
| Papaver (Papavero comune) |
| Polygonum aviculare (Correggiola) |
| Polygonum convolvolus (Poligono convolvolo) |
| Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso) |
| Rapistrum rugosum (Rapistro peloso) |
| Senecio (Erba calderina) |
| Setaria verticillata (Pabbio verticillato) |
| Stellaria media (Centocchio) |
| Urtica dioica (Ortica minore) |
| Veronica hederaefolia (Veronica comune) |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H318, H410, EUH401, EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# DAVAI®




Erbicida di post-emergenza, selettivo per la soia con formulazione innovativa iready a elevata biodisponibilità.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Concentrato solubile | Imazamox (80 g/L) | 2 (B) | 17209 del 21-10-2019 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Soia | 0,5 - 0,65 L/ha | In post-emergenza della coltura tra lo stadio di 2 e 4 foglie trifogliate | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Amaranthus retroflexus (Amaranto comune) |
| Datura stramonium (Stramonio) |
| Polygonum spp. (Poligoni) |
| Salsola kali (Erba kali) |
| Solanum nigrum (Erba morella) |
| Sorghum halepense (Sorghetta) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Abutilon theophrasti (Cencio molle) |
| Amaranthus blitoides (Amaranto blitoide) |
| Ambrosia artemisiifolia (Ambrosia) |
| Chenopodium album (Farinello) |
| Echinochloa crus-galli (Giavone) |
| Mercurialis annua (Mercorella comune) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H319, H332, H410, EUH401, H361d, EUH450

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# DIODE®

1L 5L

Erbicida di pre e post-emergenza per mais e mais dolce e di post-emergenza per sorgo.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione Concentrata | Mesotrione (100 g/L) | HRAC 27 (F2) | 18694 del 26.03.2025 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Mais | 1 - 1,5 L/ha | Un'applicazione in pre-emergenza o un'applicazione in post-emergenza (da 2 a 9 foglie)<br>due applicazioni frazionate (da pre-emergenza a 9 foglie) | - |
| Mais dolce | 0,75 L/ha | Un'applicazione in pre-emergenza<br>o un'applicazione in post-emergenza (da 2 a 9 foglie)<br>due applicazioni frazionate (da pre-emergenza a 9 foglie) | - |
| Sorgo | 0,5 L/ha | Un'applicazione in post-emergenza (da 2 a 9 foglie)<br>due applicazioni frazionate (da 2 a non oltre le 9 foglie della coltura) | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Amaranto (Amaranthus spp.) |
| Cencio molle (Abutilon theophrasti) |
| Centocchio (Stellaria spp.) |
| Erba morella (Solanum nigrum) |
| Farinello comune (Chenopodium album) |
| Farinello ibrido (Chenopodium hybridum) |
| Nappola (Xantium spp.) |
| Persicaria (Polygonum persicaria) |
| Senecione comune (Senecio vulgaris) |
| Stramonio (Datura stramonium) |
| Viola (Viola arvensis) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Correggiola (Polygonum aviculare) |
| Convolvolo (Polygonum convolvulus) |
| Mercorella comune (Mercurialis annua) |
| Giavone (Echinochloa crus-galli) |
| Sanguinella (Digitaria sanguinalis) |

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H361d, H410, H373, EUH401, EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# EDAPTIS®

1L 5L

Erbicida di post-emergenza per frumento duro, frumento tenero e triticale.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Dispersione oleosa | Mesosulfuron-methyl (12 g/L)<br>Pinoxaden (60 g/L)<br>Mefenpyr-diethyl, antidoto agronomico (35 g/L) | 2 (B)<br>1 (A) | 18176 del 07.08.2024 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Frumento tenero e duro, Triticale | 1 L/ha | Impiegare in post-emergenza della coltura dall'inizio dell'accestimento all'emissione della foglia a bandiera | - |

**In vendita abbinata a PARLEAF®**

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SUSCETTIBILI |
|---|
| **Graminacee** |
| Avena (Avena spp.) |
| Coda di volpe (Alopecurus myosuroides) |
| Fienarola annuale (Poa annua) |
| Falaride o Scagliola (Phalaris spp.) |
| Fienarola comune (Poa trivialis) |
| Loglio (Lolium spp.) |
| Miglio annuale (Milium vernale) |

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H361d, H410, EUH401, EUH208, H351, EUH451

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



ERBICIDI

# ELEGANT® 2FD

750 ml

Erbicida dicotiledonicida di post-emergenza, selettivo per frumento e orzo.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Suspoemulsione | Florasulam (6,25 g/L)<br>2,4 D (452 g/L) | 2 (B)<br>4 (O) | 16553 del 24-12-2015 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Frumento tenero e duro, Orzo | 0,75 L/ha | Impiegare in post-emergenza da inizio accestimento fino alla levata | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Galium aparine (Attaccamani) |
| Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore) |
| Anthemis spp. (Camomilla) |
| Matricaria chamomilla (Camomilla volgare) |
| Stellaria media (Centocchio) |
| Hypecoum imberbe (Cornacchina a foglie grandi) |
| Chrysanthemum segetum (Crisantemo campestre) |
| Sonchus oleraceus (Grespino comune) |
| Papaver rhoeas (Papavero) |
| Fallopia convolvulus (Poligono convolvolo) |
| Sinapis arvensis (Senape) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Cirsium arvense (Stoppione) |
| Fumaria officinalis (Fumaria) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H317, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.





# GOLTIX® BETA

1L 5L

Erbicida dicotiledonicida di pre e post-emergenza, selettivo per la barbabietola da zucchero.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Metamitron puro (700g/L) | 5 (C1) | 18813 del 25-11-2024 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Barbabietola da zucchero | 2 lt/ha | Pre-emergenza (1 applicazione per anno) | - |
| Barbabietola da zucchero | 2 lt/ha<br>0.5-0.7 lt/ha | Pre-emergenza (1 applicazione per anno)<br>Post-emergenza (1-3 applicazioni) | - |
| Barbabietola da zucchero | 0.5-0.7 lt/ha | Post emergenza (1-3 applicazioni) | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Amaranthus spp (Amaranto) |
| Chenopodium album (Farinello) |
| Polygonum aviculare (Correggiola) |
| Polygonum persicaria (Poligono persicaria) |
| Solanum nigrum (Erba morella) |
| Matricaria chamomilla (Camomilla) |
| Stachys annua (Stregona annuale) |
| Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso) |
| Papaver rhoeas (Papavero) |
| Stellaria media (Centocchio) |
| Anagallis arvensis (Anagallide) |
| Diplotaxis erucoides (Ruchetta violacea) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H302, H410, EUH401, EUH 208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# GOLTIX® TOP

1L

Erbicida selettivo di pre-emergenza efficace nel controllo delle infestanti a foglia larga dello spinacio, bietola da foglia e da costa, bietola rossa da orto.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Metamitron 700 g/L | 5 (C1) | 18814 del 25-11-2024 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Spinacio | 1-1,5 L/ha | Pre-emergenza (1 applicazione per anno) | - |
| Bietola da foglia | 1-1,5 L/ha | Pre-emergenza (1 applicazione per anno) | - |
| Bietola da costa | 1-1,5 L/ha | Pre-emergenza (1 applicazione per anno) | - |
| Bietola rossa da orto | 2-5 L/ha | Applicazione pre-emergenza (1 applicazione/anno) | - |
| | 2-3 L/ha + 0,5-0,7 | Applicazione pre-emergenza (1 applicazione/anno) + applicazione di post emergenza (1- 3 applicazioni/ anno) | - |
| | 0,5- 0,7 L/ha | Applicazione di post emergenza (1-3 applicazioni/anno) | - |

*Non superare la dose massima annua di 5 L/ha.

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Amaranthus spp. (Amaranto) |
| Chenopodium album (Farinello) |
| Polygonum aviculare (Correggiola) |
| Polygonum persicaria (Poligono persicaria) |
| Solanum nigrum (Erba morella) |
| Matricaria chamomilla (Camomilla) |
| Stachys annua (Stregona annuale) |
| Polygonum lapathifolium (Poligono nodoso) |
| Papaver rhoeas (Papavero) |
| Stellaria media (Centocchio) |
| Anagallis arvensis (Anagallide) |
| Diplotaxis erucoides (Ruchetta violacea) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H302, H410, EUH401, EUH 208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# HIGHCARD®

5L

Erbicida di post-emergenza per varietà ed ibridi di riso Max-Ace®.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Emulsione concentrata | Quizalofop-P-ethyl (105 g/L) Isoxadifen etile, antidoto agronomico (74 g/L) | 1 (A) | 17995 del 8/02/2024 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Riso | 1.25-1.5 L/ha. | Intervenire su terreno sgrondato (semina in acqua) o asciutto (seminata a file interrata) con coltura dallo stadio di due foglie fino al terzo culmo di accestimento.<br>Sommergere la risaia 3-4 giorni dopo il trattamento.<br>Ripetere il trattamento alle stesse modalità e dosi indicate per il primo intervento dopo almeno 10 giorni ed entro lo stadio di terzo culmo di accestimento.<br>Risommergere la risaia dopo 3-4 giorni dall'applicazione. | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI | SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|---|
| Giavone (Echinochloa crus-galli | Giavone maggiore (Echinochloa oryzicola od oryzoides) |
| Riso crodo (Oryza sativa) | Giavoni del genere Echinochloa (Echinochloa spp.) |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H304, H319, H411, EUH066, EUH208, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# LEOPARD® 5 EC

1L 5L

Erbicida di post-emergenza, selettivo per orticole, frutticole, vite ed estensive.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Concentrato emulsionabile | Quizalofop-p-etile (50 g/L) | 1 (A) | 11243 del 15-03-2002 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Cavoli a testa, Cavolfiore, Broccolo | 1 - 3 L/ha | Applicare da superamento della crisi di trapianto fino a tempo di carenza. Massimo 1 trattamento/anno | 30 giorni |
| Pomodoro e Melanzana | 1 - 3 L/ha | Applicare da superamento della crisi di trapianto fino ad allegagione. Massimo 1 trattamento/anno | 30 giorni |
| Colza, Patata, Erba medica, Trifoglio e Veccia | 1 - 3 L/ha | Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno | 100 giorni per Colza; 30 giorni per Patata |
| Tabacco | 1 - 3 L/ha | Applicare fino al termine dell'allungamento degli internodi. Massimo 1 trattamento/anno | 40 giorni |
| Vite da vino e da tavola, Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Pesco e Nettarino | 1 - 3 L/ha | Applicare prima che i frutti inizino ad assumere la colorazione specifica. Massimo 1 trattamento/anno | 45 giorni per Vite; 30 giorni per Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone, Pesco e Nettarino |
| Agrumi, Albicocco, Susino, Ciliegio e Frutta a guscio | 1 - 3 L/ha | Trattamento in assenza di frutti. Massimo 1 trattamento/anno | - |
| Ornamentali, Vivai e Forestali | 1 - 3 L/ha | Trattamento di post-emergenza delle malerbe solo mediante l'impiego di attrezzature schermate. Massimo 1 trattamento/anno | - |
| Lino e Cotone | 1 - 3 L/ha | Trattamento di post-emergenza prima che le parti eduli della coltura si siano formate. Massimo 1 trattamento/anno | 60 giorni per Cotone |
| Soia, Girasole, Barbabietola da zucchero, Barbabietola rossa e da foraggio | 1 - 2,5 L/ha | Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno | 60 giorni |
| Cipolla, Aglio, Scalogno | 1 - 2,5 L/ha | Applicare fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del bulbo. Massimo 1 trattamento/anno | 30 giorni |
| Carota, Rapa e Ravanello | 1 - 2,5 L/ha | Applicare fino al raggiungimento del 30% del diametro finale del fittone. Massimo 1 trattamento/anno | 30 giorni |
| Cece, Lenticchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino e Pisello | 1 - 2,5 L/ha | Applicare fino al termine dell'allungamento degli internodi o entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno | 30 giorni per Cece, Lenticchia, Fagiolo e Pisello (consumo secco); 42 giorni per Fagiolo e Pisello (consumo fresco), Fagiolino, Favino e Fava |
| Cardo (uso non alimentare) | 1 - 2 L/ha | Applicare entro la chiusura della fila. Massimo 1 trattamento/anno | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI | | |
|---|---|---|
| **Graminacee annuali** | | **Graminacee poliennali** |
| Alopecurus spp. (Coda di topo) | Lolium spp. (Loietto) | Agropyron repens (Agropiro comune) |
| Avena spp. (Avena) | Phalaris spp. (Scagliola) | Cynodon dactylon (Gramigna comune) |
| Digitaria spp. (Sanguinella) | Poa annua (Fienarola) | Sorghum halepense (Sorghetta da seme) |
| Echinochloa spp. (Giavone) | Setaria spp. (Pabbio) | |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H304, H315, H319, H336, H411, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# NICOGAN® V.O.

1L 5L

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Dispersione Oleosa | Nicosulfuron (40 g/L) | 2 (B) | 13242 del 10-06-2010 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Mais | 1 - 1,5 L/ha | Sulle infestanti sensibili e presenti nelle prime fasi di sviluppo. Intervenire in post-emergenza della coltura e delle infestanti fino alle 5-8 foglie della coltura | - |
| Mais | 1 + 0,5 L/ha | In presenza di infestanti a foglia larga sensibili più sviluppate o di infestanti mediamente sensibili è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in 2 interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni. Intervenire in post-emergenza della coltura e delle infestanti fino alle 5-8 foglie della coltura | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| **Graminacee** |
| Alopecurus myosuroides (Coda di volpe) |
| Echinochloa crus galli (Giavone comune) |
| Setaria spp. (Panicastrella) |
| Sorghum halepense da seme e rizoma (Sorghetta) |
| **Dicotiledoni** |
| Amaranthus spp. (Amaranto) |
| Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore) |
| Fumaria officinalis (Fumaria) |
| Matricaria chamomilla (Camomilla) |
| Mercurialis annua (Mercurella) |
| Sinapis arvensis (Senape selvatica) |
| Sonchus oleraceus (Crespigno) |
| Stellaria media (Centocchio) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| **Graminacee** |
| Panicum spp. (Panico) |
| Digitaria sanguinalis (Sanguinella) |
| **Dicotiledoni** |
| Galinsoga parviflora (Galinsoga) |
| Polygonum persicaria (Persicaria) |
| Polygonum lapathifolium (Persicaria maggiore) |
| Datura stramonium (Stramonio) |
| Solanum nigrum (Erba morella) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H317, H410, EUH401, EUH451

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# POSTSCRIPT® 80 XL

5L

Erbicida per Risi FullPage. POSTSCRIPT 80 XL® va utilizzato in combinazione con il bagnante dedicato Powerfilm.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Concentrato Solubile | Imazamox (80 g/L) | 2 (B) | 17585 del 23-12-2021 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Riso FullPage / resistente IMI | 0,4375 lt / ha | Due applicazioni intervallate di 20 gg<br>Sommergere la risaia 3/4 giorni dopo ogni intervento | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Eterantere (Heteranthera spp.) |
| Riso crodo (Oryza sativa) |
| Sanguinella comune (Digitaria sanguinalis) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Ammannia arrossata (Ammannia coccinea) |
| Eterantera a fiori bianchi (Heteranthera reniformis) |
| Giavone rosso (Echinochloa crus-galli) |
| Poligono persicaria (Persicaria maculosa) |
| Vandellia delle risaie (Lindernia dubia) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H319, H332, H361d, EUH401, EUH450

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# SONAVIO®

1L 5L

Erbicida per il diserbo di pomodoro, valerianella, dolcetta, gallinella, lattughe, scarola, indivia, radicchio, carota, cipolla, aglio, scalogno, carciofo e prezzemolo.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Bifenox (480 g/L) | 14 (E) | 18072 del 08/02/2024 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Pomodoro | 0,8 - 1 L/ha | Pre-trapianto (almeno 5 giorni prima della messa a dimora delle piante) | - |
| Valerianella, Dolcetta, Gallinella, Lattughe, Scarola, Invidia, Radicchio | 0,8 - 1 L/ha | Pre-trapianto (almeno 5 giorni prima della messa a dimora delle piante). Non impiegare su crescione, barbarea, rucola, senape juncea e prodotti baby leaf | - |
| Cipolla, Aglio, Scalogno (da bulbo e bullbillo) | 0,8 - 1 L/ha<br>0,4 - 0,5 L/ha | Post-trapianto / Pre-emergenza della coltura oppure<br>Post-emergenza della coltura con due applicazioni frazionate eseguendo il primo intervento quando la coltura ha differenziato la terza foglia vera ed il secondo intervento almeno 7 giorni dopo il primo. Non impiegare su cipolla, aglio e scalogno seminate | - |
| Carota | 0,8 - 1 L/ha | Post-emergenza / trapianto della coltura, quando ha differenziato le prime 3-4 foglie vere | - |
| Carciofo | 0,8 - 1 L/ha | Pre-trapianto (almeno 5 giorni prima della messa a dimora delle piante). È inoltre possibile intervenire durante il periodo di riposo vegetativo della coltura | |
| Prezzemolo | 0,8 - 1 L/ha | Pre-trapianto (almeno 5 giorni prima della messa a dimora delle piante) | - |
| Sedano e Finocchio | 0.8 - 1 L/ha | Pre-trapianto (almeno 5 giorni prima della messa a dimora delle piante) | - |

Non applicare SONAVIO® se sono previste forti piogge

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Amaranto (Amaranthus spp.) |
| Portulaca (Portulaca oleracea) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Erba morella (Solanum nigrum) |
| Farinaccio (Chenopodium spp.) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
EUH208, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



ERBICIDI

# STOPPER® P

5L

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per frumento, orzo, segale, triticale.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Pendimetalin (400 g/L)<br>Diflufenican (40 g/L) | 3 (K1)<br>12 (F1) | 15229 del 28-10-2013 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Frumento, Orzo, Segale, Triticale | 1,5-2,5 L/ha | In pre-emergenza o in post-emergenza precoce (fino ad accestimento). Effettuare un solo trattamento per stagione | 90 giorni |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Capsella bursa-pastoris (Borsa del Pastore) |
| Papaver rhoeas (Papavero) |
| Polygonum aviculare (Correggiola) |
| Polygonum persicaria (Poligono persicaria) |
| Sinapis arvensis (Senape) |
| Stellaria media (Centocchio) |
| Veronica spp. (Veronica) |
| Viola spp. (Viola) |
| Calepina spp. (Calepina) |
| Poa spp. (Poa) |
| Lamium purpureum (Falsa ortica) |
| Matricaria spp. (Camomilla) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Chenopidium album (Farinaccio) |
| Fumaria officinalis (Fumaria) |
| Lolium spp. (Loglietto) |
| Alopecurus myosuroides (Coda di volpe) |
| Senecio vulgaris (Senecio) |
| Sonchus spp. (Sonco) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H410, H361D, EUH401, EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.





# SULCOTREK®

5L 15L

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per il mais.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Terbutilazina (327 g/L)<br>Sulcotrione (173 g/L) | 5 (C1)<br>27 (F2) | 10585 del 06-09-2000 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Mais | 2 - 2,6 L/ha | In pre-emergenza oppure in post-emergenza della coltura fino allo stadio di 6 foglie. In post-emergenza intervenire con infestanti nei primi stadi di sviluppo (entro la 4° foglia). Effettuare un solo trattamento per stagione | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| **In pre-emergenza** |
| Abutilon Theophrasti (Cencio molle) |
| Amaranthus spp. (Amaranto) |
| Chenopodium album (Farinello comune) |
| Datura stramonium (Stramonio) |
| Polygonum persicaria (Persicaria) |
| Portulaca oleracea (Porcellana comune) |
| Solanum nigrum (Erba morella) |
| **In post-emergenza** |
| Abutilon Theophrasti (Cencio molle) |
| Amaranthus spp. (Amaranto) |
| Capsella bursa-pastoris (Borsa del Pastore) |
| Chenopodium album (Farinello comune) |
| Datura stramonium (Stramonio) |
| Mercurialis annua (Mercorella comune) |
| Solanum nigrum (Erba morella) |
| Xantium strumarium (Lappola) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Echinochloa crus galli (Giavone comune) |
| Digitaria sanguinalis (Sanguinella) in post-emergenza |

NOTA: in seguito al rinnovo della Sostanza Attiva Terbutilazina è stato introdotto il vincolo di applicazione ogni tre anni; la misura di applicare il prodotto ogni tre anni sullo stesso appezzamento si applica per tutte le applicazioni effettuate successivamente al 14 giugno 2022 come da Comunicato_Reg_UE_2021_824 del 10 Giugno 2021.



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H302, H317, H361d, H373, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# SULTAN®

1L

Erbicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per colza, cavoli e aglio.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Metazaclor (500 g/L) | 15 (K3) | 11526 del 06-12-2002 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Aglio | 1,5 - 2 L/ha | Subito dopo la messa a dimora dei bulbilli o in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie | - |
| Colza | 2 L/ha | In pre-emergenza, subito dopo la semina e al più tardi entro 3 giorni. In post-emergenza precoce, quando la coltura ha sviluppato le prime 2 foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula | - |
| Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Cavoli a foglia | 1,5 - 2 L/ha | Subito dopo la messa a dimora della coltura e prima della crisi di trapianto. In caso di abbondanti irrigazioni, impiegare il dosaggio più basso | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| **Monocotiledoni annuali** |
| Apera spica-venti (Cappellini dei campi) |
| Alopecurus spp. (Coda di topo) |
| Poa spp. (Fienarola) |
| Echinochloa spp. (Giavone) |
| Lolium spp. (Loglio) |
| Setaria spp. (Pabbio) |
| Digitaria sanguinalis (Sanguinella comune) |
| **Dicotiledoni annuali** |
| Amaranthus retroflexus (Amaranto comune) |
| Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore) |
| Matricaria spp. (Camomilla) |
| Anthemis spp. (Camomilla inodore) |
| Stellaria spp. (Centocchio) |
| Lamium spp. (Falsa ortica) |
| Chenopodium spp. (Farinello) |
| Sonchus spp. (Grespino) |
| Mercurialis annua (Mercorella comune) |
| Solanum spp. (Erba morella) |
| Myosotis spp. (Nontiscordardime) |
| Urtica urens (Ortica minore) |
| Papaver spp. (Papavero) |
| Polygonum persicaria (Persicaria) |
| Ranunculus spp. (Ranuncolo) |
| Veronica spp. (Veronica) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H302, H317, H351, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.





# TAIFUN® MK CL

1L 5L 20L

Erbicida non selettivo per frutticole, vite, olivo, orticole e preparazione dei letti di semina di mais, cereali e altre colture.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Soluzione concentrata | Glifosate acido (360 g/L) (da sale isopropilamminico) | 9 (G) | 15401 del 22-06-2012 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| **Diserbo lungo la fila:** Agrumi, Melo, Pero, Noce, Nocciolo, Olivo, Vite da vino e da tavola, Albicocco, Ciliegio, Nettarina, Pesco, Susino, Mandorlo. | 1 - 3 L/ha | Annuali e biennali: Coda di volpe, Avena, Loietto, Mercorella, Fienarola, Riso Crodo, Visnaga maggiore, Amaranto, Calendula, Farinaccio, Succhiamele, Porcellana, Rafano, Senecio, Senape, Centocchio, Veronica | 7 giorni per Olivo da olio |
| **Diserbo interfila:** Carciofo, Carota, Fagiolino, Fava, Melanzana, Pisello, Pomodoro, Patata, Mais, Soia, Barbabietola da zucchero, Rosa, Vivai e Semenzali di Floreali, Ornamentali, Forestali, Pioppo. | 3,5 - 4,5 L/ha | Perenni: Gramaccia, Carice, Cardo campestre, Euforbia, Gramignone, Iperico, Asperella, Falaride, Romice, Grespino, Sorghetta | 7 giorni per Olivo da olio |
| | 5 - 6 L/ha | Perenni: Piantaggine d'acqua, Asfodelo, Giunco, Giunco fiorito, Cipollino, Ferula, Nardo, Scirpo, Coltellaccio, Tossilagine | 7 giorni per Olivo da olio |
| **In assenza della coltura su terreni destinati** a Fragola, Ortaggi, Barbabietola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Mais, Soia, Prati, Vivai. | 7 - 9 L/ha | Perenni: Cappellini dei campi, Aglio selvatico, Assenzio selvatico, Canna selvatica, Gramigna, Panaceo, Ellera, Ossalide, Cannuccia, Felce, Ranuncolo, Rovo, Tifa, Ortica | 7 giorni per Olivo da olio |
| | 10 L/ha | Perenni: Aristolochia, Clematide, Vilucchio, Robbia | 7 giorni per Olivo da olio |
| **Incolti** (aree rurali e industriali, aree e opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline di asciutta) | 4 - 6 L/ha | Arbusti: Acero, Frassino, Ginestra, Salice, Sambuco, Mirtillo | 7 giorni per Olivo da olio |
| | 10 L/ha | Arbusti: Brugo, Cisto, Erica, Caprifoglio | 7 giorni per Olivo da olio |

Per tutti gli usi consentiti non superare la dose massima di 10 L/ha/anno di prodotto. Su olivo non superare la dose di 6 L/ha.
Attenzione: il prodotto non è selettivo. Seguire le modalità d'impiego e utilizzare le attrezzature indicate in etichetta per salvaguardare le colture.

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI |
|---|
| **1 - 3 L/ha** |
| Alopecurus sp. (Coda di volpe), Avena sp. (Avena), Lolium sp. (Loglietto), Mercurialis sp. (Mercorella), Poa sp. (Fienarola), Oriza sativa var. silvatica (Riso crodo), Ammi majus (Visnaga maggiore), Amaranthus sp. (Amaranto), Calendula sp. (Calendula), Chenopodium sp. (Farinaccio), Orobanche (Succhiamele), Portulaca sp. (Porcellana comune), Raphanus sp. (Rafano), Senecio sp. (Senecio), Sinapis sp. (Senape), Stellaria sp. (Centocchio),Veronica sp. (Veronica) |
| **SPECIE INFESTANTI VIVACI E PERENNI** |
| **3,5 - 4,5 L/ha** |
| Agropyron repens (Gramaccia), Carex sp. (Carice), Cirsium sp. (Cardo campestre), Euphorbia sp. (Euforbia), Glyceria sp. (Gramignone), Hipericum sp. (Iperico), Leersia oryzoidea (Asperella), Phalaris sp. (Falaride), Rumex sp. (Romice), Sonchus sp. (Grespino), Sorghum halepense (Sorghetta) |
| **5 - 6 L/ha** |
| Alisma sp. (Piantaggine d'acqua), Asfodelus sp. (Asfodelo), Butomus sp. (Giunco fiorito), Cyperus sp. (Cipollino), Ferula sp. (Ferula), Juncus sp. (Giunco), Nardus sp. (Nardo), Scirpus sp. (Scirpo), Sparganium sp. (Coltellaccio), Tussilago sp. (Tossilagine) |
| **7 - 9 L/ha** |
| Agrostis sp. (Cappellini dei campi), Alium sp. (Aglio selvatico), Artemisia sp. (Assenzio selvatico), Arundo sp. (Canna selvatica), Cynodon sp. (Gramigna), Eracleum sp. (Panaceo), Glechoma sp. (Ellera), Oxalis sp. (Ossalide), Paspalum sp., Phragmines sp. (Cannuccia), Pteridium sp. (Felce), Ranunculus sp. (Ranuncolo), Rubus sp. (Rovo), Tipha sp. (Tifa), Urtica sp. (Ortica) |
| **10 L/ha** |
| Aristolochia sp. (Aristolachia), Clematis sp. (Clematide), Convolvolus sp. (Vilucchio), Rubia peregrina (Robbia) |

| SPECIE INFESTANTI ARBOREE E ARBUSTIVE | |
|---|---|
| **4 – 6 L/ha** | **10 L/ha** |
| Acer sp. (Aceri), Fraxinus sp. (Frassino), Genista sp. (Ginestra), Salix sp. (Salice), Sambucus sp. (Sanbuco), Vaccinum sp. (Mirtillo) | Calluna sp. (Brugo), Cistus sp. (Cisto), Erica sp. (Erica), Lonicera sp. (Caprifoglio) |

Indicazioni di pericolo:
EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# TIMELINE® FX

Novità

5L 10L

Timeline FX è un erbicida di post-emergenza a spettro completo per i cereali.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Concentrato emulsionabile | Pinoxaden 30 g/L<br>Florasulam 1.75 g/L<br>Fluroxypyr-meptyl 75 g/L<br>Cloquintocet-mexyl 7.5 g/L | 1 (A)<br>2 (B)<br>4 (O) | 18146 del 24-11-2025 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Frumento tenero e duro, segale | 2 L/ha | Applicare il prodotto in post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata (graminacee) o fra lo stadio di cotiledoni e quello di abbozzi fiorali (dicotiledoni). | - |

*in attesa di estensione di etichetta su orzo

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Avena spp. (Avena) |
| Lolium spp. (Loietto) |
| Alopecurus myosuroides (Alopecuro) |
| Phalaris spp. (Falaride) |
| Galium aparine (Attaccamani) |
| Papaver rhoeas (Papavero) |
| Sinapis arvensis (Senape selvatica) |
| Stellaria media (Centocchio) |
| Vicia sativa (Veccia dolce) |
| Anagallis arvensis (Anagallide) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Polygonum aviculare (Correggiola) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H317, H319, H316d, H410, EUH 401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# TOMIGAN®

1L

Erbicida selettivo per frumento, segale, triticale, orzo, avena, mais, cipolla, pomacee, drupacee, agrumi, olivo, prati/pascoli, aree non coltivate.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Emulsione concentrata | Fluroxipir (200 g/L) | 4 (O) | 16312 del 13-01-2022 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Frumento tenero e duro, Segale, Triticale, Orzo, Avena | 0,75 – 1 L/ha | Applicare in post-emergenza, dall'accestimento alla fine della levata. È consentita una sola applicazione l'anno | - |
| Mais | 0.75–1 L/ha (unico int.) 0.4–0.5 L/ha (int. frazionato) | Applicare in post-emergenza della coltura, dalla terza all'ottava foglia. Non superare la dose di 1 L/ha per stagione | - |
| Cipolla | 0,4–0,5 L/ha | Applicare in post-emergenza delle infestanti, quando la coltura ha raggiunto la terza foglia | 90 |
| Prati/pascoli (escluse leguminose foraggere) | 1.5 L/ha | Applicare su coltura affrancata. È consentita una sola applicazione | 15 |
| Aree non coltivate | 1–1.5L/ha | Applicare in post-emergenza delle malerbe; sono consentite 2 applicazioni l'anno nel periodo primaverile e autunnale | - |
| Pomacee (melo, pero), drupacee (albicocco, pesco, nettarino, ciliegio, susino) e agrumi | 1-1.5L/ha | Applicare in post-emergenza delle infestanti alla dose di 1,5 L/ha in applicazioni primaverili, oppure alla dose di 1 L/ha. È consentita una sola applicazione l'anno | 15 |
| Olivo (da olio e da tavola) | 1.5–2 L/ha per il controllo delle malerbe. 0.35–0.67 l/hl, per il controllo dei polloni | Per il controllo delle infestanti, applicare in post-emergenza. Eseguire una sola applicazione localizzata per il controllo dei polloni. Impiegare su polloni erbacei di 10-15 cm di lunghezza con schermature idonee ad impedire che la deriva raggiunga la chioma. | 30 giorni per olivo da tavola.<br>90 giorni per olivo da olio |
| Fruttiferi a guscio (nocciolo, mandorlo, noce) | 1,5 l/ha per il controllo delle infestanti 0,35–0,67 l/hl per il controllo dei polloni | Applicare in post-emergenza delle infestanti. È consentita una sola applicazione l'anno nel periodo primaverile. Non applicare in frutteti di età inferiore a 4 anni. | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI | |
|---|---|
| Attaccamano (Galium aparine) | Malva (Malva sp.) |
| Becco di grù maggiore (Erodium ciconium) | Nappola (Xanthium orientale) |
| Cardo mariano (Silybum marianum) | Peverina dei campi (Cerastium glomeratum) |
| Cencio molle (Abutilon theophrasti) | Poligono convolvolo (Fallopia convolvulus) |
| Centocchio (Stellaria media) | Porcellana (Portulaca oleracea) |
| Cocomero asinino (Ecballium europaeum) | Romice (Rumex spp.) |
| Correggiola (Polygonum aviculare) | Saeppola (Erigeron sp.) |
| Erba morella (Solanum nigrum) | Senape selvatica (Sinapis arvensis) |
| Enula cespita (Dittrichia graveolens) | Stramonio (Datura stramonium) |
| Erba medica (Medicago sativa) | Tarassaco (Taraxacum officinale) |
| Fiorrancio selvatico (Calendula arvensis) | Vedovella annuale (Jasione montana) |
| Forbicina (Bidens tripartita) | Uccellina comune (Ornithopus compressus) |
| Geranio (Geranium spp.) | Ventaglina dei campi (Aphanes arvensis) |
| Giunco delle pozze (Juncus bufonius) | Vilucchio (Convolvulus arvensis) |
| Grespino comune (Sonchus oleraceus) | |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Acetosella (Oxalis corniculata) |
| Amaranto (Amaranthus spp.) |
| Arabetta comune (Arabidopsis thaliana) |
| Aspraggine (Picris echioides) |
| Borsa di pastore (Capsella bursa-pastoris) |
| Colza (Brassica napus) |
| Chenopodio (Chenopodium album) |
| Falsa ortica (Lamium amplexicaule) |
| Fumaria (Fumaria officinalis) |
| Lattuga selvatica (Lactuca serriola) |
| Camomilla (Matricaria sp.) |
| Mercorella comune (Mercurialis annua) |
| Nontiscordardime (Myosotis arvensis) |
| Ortica (Urtica urens) |
| Papavero comune (Papaver rhoeas) |
| Poligono persicaria (Polygonum persicaria) |
| Senecione comune (Senecio vulgaris) |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H304, H318, H336, H410, EUH066, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# TRIMMER® 50 WG




Erbicida dicotiledonicida di post-emergenza, selettivo per frumento, orzo, avena e triticale.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli idrosolubili | Tribenuron-methyl (50%) | 2 (B) | 16575 del 19-09-2018 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Frumento tenero e duro, Orzo, Avena, Triticale | 20-30 g/ha | In suoli a reazione acida, dalla terza foglia a botticella | 28 giorni prima della raccolta se i cereali sono destinati all'impiego foraggero |
| Frumento tenero e duro, Orzo, Avena, Triticale | 20-28 g/ha | In suoli a reazione alcalina, dalla fase d'inizio accestimento a botticella | 28 giorni prima della raccolta se i cereali sono destinati all'impiego foraggero |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Capsella bursa-pastoris (Borsa del Pastore) |
| Matricaria spp. (Camomilla) |
| Anthemis arvensis (Camomilla bastarda) |
| Fallopia convolvulus (Convolvolo nero) |
| Papaver rhoeas (Papavero) |
| Sinapis arvensis (Senape selvatica) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Cirsium arvense (Cardo campestre) |
| Stellaria media (Centocchio) |
| Fumaria officinalis (Fumaria) |
| Veronica spp. (Veronica) |
| Viola arvensis (Viola) |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H410, H373, EUH401, EUH208, EUH451

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.





# VALLEY




Erbicida dicotiledonicida di pre-emergenza e post-emergenza precoce, selettivo per la soia.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Bifenox (480 g/L) | 14 (E) | 16616 del 08-03-2018 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Soia | 1 L/ha | Impiegare in pre-emergenza o post-emergenza precoce della coltura, quando ha differenziato le prime 2-3 foglie vere | - |

## Spettro d'azione

| SPECIE INFESTANTI SENSIBILI |
|---|
| Amaranthus spp. (Amaranto) |

| SPECIE INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI |
|---|
| Portulaca spp. (Portulaca) |
| Solanum nigrum (Erba morella) |
| Chenopodium spp. (Farinaccio) |
| Galinsoga parviflora (Galinsoga) |
| Viola arvensis (Viola) |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H410, EUH401, EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# FUNGICIDI

## Sommario


| | |
|---|---|
| AVASTEL® | 43 |
| BANJO® | 44 |
| FOLPAN® 80 WDG | 45 |
| FOLPAN® ENERGY | 46 |
| FOLPAN® GOLD | 47 |
| LAZULIE® Novità | 48 |
| MAGANIC® | 49 |
| MAVITA® 250 EC | 50 |
| MAXENTIS® | 51 |
| MERPAN® 80 WDG | 52 |
| MIRADOR® SC | 53 |
| NIMROD® 250 EW | 54 |
| STAVENTO® | 55 |
| ZAKEO® 250 SC | 56 |



# AVASTEL®

Avastel® è il fungicida per il controllo delle principali malattie dei cereali dalle prime fasi di sviluppo alla botticella.

1L 5L

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Concentrato emulsionabile | Protioconazolo puro 150 g/L<br>Fluxapyroxad 75 g/L | 3<br>7 | 18089 del 27/06/2025 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Frumento | Septoriosi (Zymoseptoria tritici), Oidio (Blumeria graminis sp. tritici), Ruggine gialla (Puccinia striiformis), Ruggine bruna (Puccinia recondita), Fusariosi (Fusarium spp., Microdochium spp.) | 1-1,25 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 125-400 l/ha. | Eseguire massimo un trattamento per anno. |
| Orzo | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), Elmintosporiosi (Helminthosporium gramineum o Pyrenophora teres), Ramularia (Ramularia collo-cygni), Ruggine bruna (Puccinia hordei), Oidio (Blumeria graminis sp. hordei) | 1-1,25 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 125-400 l/ha. | Eseguire massimo un trattamento per anno. |
| Segale | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), Ruggine bruna (Puccinia recondita), Septoriosi (Zymoseptoria tritici,) Ruggine gialla (Puccinia striiformis) | 1-1,25 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 125-400 l/ha. | Eseguire massimo un trattamento per anno. |
| Triticale | Ruggine bruna (Puccinia recondita), Ruggine gialla (Puccinia striiformis), Septoriosi (Zymoseptoria tritici), Oidio (Blumeria graminis) | 1-1,25 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 125-400 l/ha. | Eseguire massimo un trattamento per anno. |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H318, H362, H411, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# BANJO®




Fungicida di copertura contro ticchiolatura e alternaria di melo e pero, maculatura bruna del pero, peronospora e botrite della vite da vino e peronospora della patata.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Fluazinam (500 g/L) | 29 C5 | 13905 del 09-12-2010 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Melo | Ticchiolatura e Alternaria | 70-100 ml/hl | Non superare 1 L/ha e 3 applicazioni all'anno.Iniziare i trattamenti dopo la fase di bottoni rosa. Massimo 3 trattamenti/ anno con intervallo minimo di 14 giorni tra le applicazioni | 60 giorni |
| Vite da vino | Botrite<br>Peronospora | 100-150 ml/hl | Non superare 1,5 L/ha e 1 applicazione all'anno nelle fasi di maggiore suscettibilità della malattia.<br>Nelle varietà a grappolo compatto effettuare<br>il trattamento in pre-chiusura grappolo | 21 giorni |
| Patata | Peronospora | 0,3-0,4 L/ha | Massimo 10 trattamenti/anno. Intervenire prima della comparsa della malattia (normalmente quando le piante hanno raggiunto i 10-15 cm di altezza), ripetendo il trattamento ogni 7-10 giorni, in funzione della piovosità | 7 giorni |
| Pero | Ticchiolatura, Alternaria e Maculatura bruna | 70-100 ml/hl | Non superare 1 L/ha e 3 applicazioni all'anno. Iniziare i trattamenti dopo la fase di bottoni rosa. Massimo 3 trattamenti/ anno con intervallo minimo di 14 giorni tra le applicazioni | 60 giorni |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H361d, H410, EUH208, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# FOLPAN® 80 WDG




Fungicida antiperonosporico di copertura ad azione multi-sito, attivo sulle principali patologie fungine di vite, pomodoro, ornamentali e floreali.
Ideale per la gestione preventiva delle resistenze.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli idrodisperdibili | Folpet (80%) | M4 | 8601 del 03-12-1994 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Vite da vino e da tavola | Escoriosi, Marciume Nero | 2kg/ha (200 g/hl) | Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/ anno per uva da tavola. Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. Intervenire in vite da vino da ripresa vegetativa a invaiatura e in vite da tavola da ripresa vegetativa a pre-fioritura | 28 giorni per Vite da vino. 56 giorni per Vite da tavola |
| Vite da vino e da tavola | Peronospora, Botrite, Oidio, Marciumi secondari | 1,25-1,5 kg/ha (125-150 g/hl) | Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/anno per uva da tavola.<br>Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni. Intervenire dalla pre-fioritura per la protezione dall'Oidio e in pre-chiusura grappolo per la Botrite.<br>Su Peronospora applicare anche in fase di allevamento e in vivai | 28 giorni per Vite da vino. 56 giorni per Vite da tavola |
| Vite da vino e da tavola | Marciume bianco (in genere indotto da una grandinata) | 1,6-1,8 kg/ha (160-180 g/hl) | Massimo 10 trattamenti/anno per uva da vino e 4 trattamenti/anno per uva da tavola.Intervenire tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata. Intervallo tra le applicazioni di 7-10 giorni | 28 giorni per Vite da vino. 56 giorni per Vite da tavola |
| Pomodoro (in pieno campo e serra) | Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi, Septoriosi, Botrite | 1,5 kg/ha (150 g/hl) | Massimo 3 trattamenti/anno (serra) e 4 trattamenti/anno (pieno campo); intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni | 10 giorni |
| Floreali e Ornamentali | Botrite, Marciumi radicali e basali e Phytophthora spp | 2-3 kg/ha (200-300 g/hl) | - | - |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H317,H319,H351, H372,H410, EUH066, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# FOLPAN® ENERGY




Una combinazione in formulazione liquida unica: due fungicidi antiperonosporici, uno con attività di contatto multisito e uno sistemico che si distribuisce rapidamente in tutta la pianta proteggendo la vegetazione in crescita.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata (SC) | Folpet puro (300 g/L)<br>Fosfonato di potassio puro (670 g/L) | M4 e 33 | 16749 del 02-12-2022 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Vite da vino | Peronospora,<br>Escoriosi,<br>Marciume nero | 300-400 ml/hl (dose massima 4 L/ha)<br>350 ml/hl (dose massima 4 L/ha)<br>400 ml/hl (dose massima 4 L/ha) | Effettuare un massimo di 5 trattamenti all'anno con un intervallo minimo di 14 giorni tra le applicazioni. Iniziare i trattamenti nella fase di sviluppo della vegetazione e interromperli a invaiatura completa | 28 giorni |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H317, H318, H351, H372, H410, EUH066, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# FOLPAN® GOLD




Fungicida antiperonosporico ad azione preventiva e curativa,ideale per la difesa della vegetazione in fase di accrescimento della vite e dei primi stadi di crescita del grappolo. La sua speciale formulazione NATIVE GOLD conferisce al prodotto notevoli vantaggi in termini di sicurezza per l'operatore e praticità d'uso.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli idrodisperdibili | Metalaxil-m (4,85%)<br>Folpet (40%) | 4 A1 e M4 | 12878 del 03-01-2006 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Vite da vino | Peronospora | 2 kg/ha (200 g/hl) | Massimo 3 trattamenti con cadenza di 7-14 giorni. Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria | 28 giorni |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H317, H319, H332, H351, H372, H410, EUH066, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# LAZULIE®

Novità

1kg

Fungicida ad azione preventiva e curativa, dotato di forte affinità con la cuticola vegetale, assicurando un'eccellente resistenza al dilavamento. Il favorevole profilo tossicologico ne consente l'impiego anche in prossimità della raccolta su numerose colture.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli Idrodispersibili (WG) | Fenhexamid puro (500 g/kg) | 17 | 14793 del 11-12-2009 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Vite (uva da tavola e da vino) | Botrite | 1-1,5 kg/ha (100-150 g/hl) | Suggeriti due trattamenti da fioritura a maturazione, rispettando un intervallo minimo di 20 giorni. | 7 giorni |
| Pesco, albicocco, susino, ciliegio | Botrite, Monilia | 1-1,5 kg/ha (100-150 g/hl) | Eseguendo 1-2 trattamenti in fioritura ed 1-2 trattamenti nelle due settimane precedenti la raccolta con cadenza minima di 7 giorni. | 3 giorni |
| Fragola (in pieno campo ed in serra) | Botrite | 1-1,5 kg/ha (100-150 g/hl) | Trattamenti a cadenza di 10-14 giorn da inizio fioritura a pre-raccolta. | 3 giorni |
| Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino (in pieno campo e in serra) e peperone (in serra) | Botrite | 1-1,5 kg/ha (100-150 g/hl) | Da inizio fioritura a pre-raccolta con trattamenti a cadenza di 10-14 giorni. | 3 giorni |
| Lattughe e insalate (in pieno campo e in serra) | Botrite, Sclerotonia | 1-1,5 kg/ha (100-150 g/hl) | Da sviluppo delle foglie a pre-raccolta con trattamenti a cadenza di 10-12 giorni. | 3 giorni |
| Erbe fresche e fiori commestibili (in pieno campo e in serra) | Botrite, Sclerotonia | 1-1,5 kg/ha (100-150 g/hl) | Da sviluppo delle foglie a pre-raccolta con trattamenti a cadenza di 10-12 giorni. | 3 giorni |
| Fagiolino (in serra e in pieno campo) | Botrite, Sclerotonia | 1,5 kg/ha (150 g/hl) | Da bottoni fiorali visibili a fine sviluppo baccelli con trattamenti a cadenza di 10-12 giorni. | 3 giorni |
| Cipolla (in pieno campo) | Botrite, Sclerotonia | 1,2 kg/ha (120 g/hl) | Da fine sviluppo delle foglie a raccolta con trattamenti a cadenza di 10-12 giorni. | 3 giorni |
| Actinia | Botrite | 0,120 g/hl | Eseguendo un trattamento in post-raccolta per irrorazione dei frutti o per immersione nella sospensione acquosa. | 60 giorni |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H411, EUH401, EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# MAGANIC®

1L 5L

Fungicida per frumento, orzo, triticale e segale.

POWERED BY Asorbital® FORMULATION TECHNOLOGY

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Emulsione concentrata | Protioconazolo (175 g/L)<br>Difenoconazolo (125 g/L) | 3 G1 | 17955 del 05.06.2024 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Frumento tenero e duro (invernale e primaverile) | Septoria (Septoria tritici), Ruggini (Puccinia recondita), Fusariosi della spiga (Fusarium spp. e Microdochium spp.) | 0,8 -1 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 100-400 L/ha. | Eseguire massimo un trattamento per anno. |
| Orzo (invernale e primaverile) | Maculatura reticolare e puntiforme o Elimintosporiosi (Pyrenophora teres), Ramularia (Ramularia collo-cygni) | 0,8 - 1 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 100-400 L/ha. | Eseguire massimo un trattamento per anno. |
| Segale | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), Ruggine (Puccinia recondita) | 0,8 - 1 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 100-400 L/ha. | Eseguire massimo un trattamento per anno. |
| Triticale | Septoria (Septoria tritici), Ruggini (Puccinia striiformis e Puccinia recondita) | 0,8 - 1 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 100-400 L/ha. | Eseguire massimo un trattamento per anno. |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H314, H317, H351, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# MAVITA® 250 EC

1L

Fungicida sistemico contro ticchiolatura e oidio di melo e pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, e altre malattie di barbabietola da zucchero e orticole.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Concentrato emulsionabile | Difenoconazolo (250 g/L) | 3 G1 | 15293 del 29-12-2011 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Barbabietola da zucchero | Cercosporiosi | 0,2-0,3 L/ha (20-30 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni a cadenza di 21 giorni da copertura fogliare del 10% della superficie del terreno | 21 giorni |
| Melo e Pero | Ticchiolatura, Oidio | 0,3 L/ha (15 ml/hl) | Massimo 4 applicazioni a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura | 14 giorni |
| Asparago (pieno campo) | Ruggine e Stemfiliosi dell'asparago | 0,5 L/ha (50 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare | - |
| Carota, Cavolfiore (pieno campo) | Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggine, Septoria | 0,4-0,5 L/ha (40-50 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare | 14 giorni |
| Sedano (pieno campo) | Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggine, Septoria | 0,4-0,5 L/ha (40-50 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare | 14 giorni |
| Sedano (serra) | Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggine, Septoria | 0,4-0,5 L/ha (40-50 ml/hl) | Massimo 2 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare | 14 giorni |
| Patata | Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggine, Septoria | 0,4-0,5 L/ha (40-50 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni preventive a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo tuberi | 3 giorni |
| Pomodoro e Melanzana (pieno campo e serra) | Alternaria, Cladosporiosi, Oidio, Micosferella, Ruggine, Septoria | 0,4-0,5 L/ha (40-50 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare | 7 giorni in pieno campo e 3 giorni in serra |
| Cetriolo (pieno campo e serra) | Oidio, Alternaria | 0,5 L/ha (50 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni a cadenza di 8 giorni da inizio fioritura | 3 giorni |
| Finocchio (pieno campo) | Ramularia | 0,5 L/ha (50 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni a cadenza di 8 giorni da inizio sviluppo fogliare | 3 giorni |
| Vite da vino e da tavola | Black-rot, Oidio | 0,2 L/ha (20 ml/hl) | Massimo 4 applicazioni a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo | 21 giorni |
| Pesco | Bolla, Monilia | 0,3-0,45 L/ha (30 ml/hl) | Massimo 2 applicazioni a cadenza di 7 giorni da apertura gemme | 7 giorni |
| Olivo | Occhio di Pavone | 0,5 L/ha (50 ml/hl) | Massimo 2 applicazioni a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo vegetativo | 30 giorni |
| Broccoli (pieno campo) | Alternaria, Micosferella, Oidio, Ruggini, Septoria | 0,5 L/ha (50 ml/hl) | Massimo 3 applicazioni a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo germogli | 14 giorni |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H319, H304, H410, EUH401, EUH066

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# MAXENTIS®

1L 5L

Fungicida per frumento, orzo, segale e triticale.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Protioconazolo (150 g/L)<br>Azoxystrobin (200 g/L) | 3 G1 e 11 C3 | 18067 del 14/06/2024 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Frumento tenero e duro (invernale e primaverile) | Septoria (Zymoseptoria tritici, Septoria nodorum), Oidio (Blumeria graminis), Ruggini (Puccinia striiformis, Puccinia recondita). Fusarium (Fusarium spp., Microdochium spp.) | 0.8 - 1 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 100-400 L/ha | Eseguire massimo un trattamento per anno tra le fasi di inizio levata e fine spigatura |
| Orzo (invernale e primaverile) | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), Maculatura reticolare e puntiforme o Elimintosporiosi (Helminthosporium gramineum o Pyrenophora teres), Ramularia (Ramularia collo-cygni), Ruggini (Puccinia sp.), Oidio (Blumeria graminis) | 0.8 - 1 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 100-400 L/ha | Eseguire massimo un trattamento per anno tra le fasi di inizio levata e fine spigatura |
| Segale | Rincosporiosi (Rhyncosporium secalis), Ruggine (Puccinia recondita) | 0.8 - 1 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 100-400 L/ha | Eseguire massimo un trattamento per anno tra le fasi di inizio levata e fine spigatura |
| Triticale | Septoria (Zymoseptoria tritici), Ruggine bruna (Puccinia recondita) | 0.8 - 1 L/ha | Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua di 100-400 L/ha | Eseguire massimo un trattamento per anno tra le fasi di inizio levata e fine spigatura |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H302, H317, H332, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# MERPAN® 80 WDG




Fungicida di copertura ad azione multi-sito, attivo sulle principali patologie fungine di pomacee (incluse le patologie di post-raccolta), drupacee e frutta a guscio.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli idrodisperdibili | Captano (80%) | M4 | 8102 del 09-11-1992 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Melo, Cotogno, Pero, Nashi | Ticchiolatura, Maculatura bruna del Pero, Gleosporium spp. | Massimo 2 kg/ha (150-160 g/hl) | Non superare i 10 trattamenti l'anno | 21 giorni |
| Pesco, Nettarine | Bolla, Corineo, Fusicocco, Moniliosi | Massimo 4,5 kg/ha (300 g/hl) | Per trattamenti da caduta foglie a rottura gemme | 21 giorni |
| Pesco, Nettarine | Bolla, Corineo, Fusicocco, Moniliosi | Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl) | Per trattamenti da inizio e in vegetazione. Massimo 4 trattamenti/anno come somma dei due periodi di applicazione | 21 giorni |
| Albicocco, Susino | Corineo, Moniliosi | Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl) | Massimo 4 trattamenti/anno | 21 giorni |
| Ciliegio | Corineo, Moniliosi | Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl) | Massimo 2 trattamenti/anno. Applicazioni in pre-fioritura, post-fioritura e pre-raccolta | 21 giorni |
| Nocciolo | Alternaria e Antracnosi | Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl) | Massimo 4 trattamenti/anno da caduta foglie a pre-fioritura, con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni | Sospendere i trattamenti al termine della fioritura |
| Mandorlo | Fusicocco, Bolla, Ticchiolatura delle drupacee, Corineo, Macchie fogliari rosse del Mandorlo | Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl) | Massimo 4 trattamenti/anno da caduta foglie a pre-fioritura, con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni | Sospendere i trattamenti al termine della fioritura |
| Pistacchio | Septoriosi, Cancri rameali e Alternaria | Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl) | Massimo 4 trattamenti/anno da caduta foglie a pre-fioritura, con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni | Sospendere i trattamenti al termine della fioritura |
| Noce | Antracnosi | Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl) | Massimo 4 trattamenti/anno da caduta foglie a pre-fioritura, con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni | Sospendere i trattamenti al termine della fioritura |
| Castagno | Fersa | Massimo 2,25 kg/ha (150 g/hl) | Massimo 4 trattamenti/anno da caduta foglie a pre-fioritura, con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni | Sospendere i trattamenti al termine della fioritura |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H317, H319, H351, H361f, H372, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.





# MIRADOR® SC




Fungicida contro le malattie della parte aerea di frumento e orzo, contro brusone ed elminosporiosi del riso e contro oidio e peronospora di solanacee e cucurbitacee.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Azoxystrobin (250 g/L) | 11 C3 | 15111 del 25-03-2011 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Frumento e Orzo | Oidio, Ruggini, Septoriosi, Rincosporiosi | 0,8-1 L/ha | Massimo 2 applicazioni/anno, intervenire tra il 2° nodo e la fioritura | 35 giorni |
| Riso | Brusone ed Elmintosporiosi | 1 L/ha | Massimo 2 applicazioni/anno, intervenire tra botticella e inizio spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni. Trattare in asciutta | 28 giorni |
| Melone, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino, Cocomero e Zucca (pieno campo e serra) | Oidio Peronospora | 0.7 L/ha su oidio<br>0.7-0.8 L/ha su peronospora | In serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di **MIRADOR SC** con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti. Intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni su Oidio e 5-7 giorni su Peronospora. Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto | 3 giorni |
| Pomodoro, Peperone e Melanzana (pieno campo e serra) | Peronospora e Alternariosi Oidio | 0.8-1 L/ha su peronospora e alternaria<br>0.7 L/ha su oidio | In pieno campo non utilizzare **MIRADOR SC** per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. In serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di **MIRADOR SC** con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti. Intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni. Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto | 3 giorni |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H332, H410, EUH401, EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# NIMROD® 250 EW

1L

Fungicida antioidico ad azione preventiva, curativa ed eradicante per pomacee, drupacee, vite, orticole, rose e laurocerasо. È attivo anche a basse temperature e selettivo ad alte.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Emulsione olio/acqua | Bupirimate (250 g/L) | 8 A2 | 13771 del 02-04-2007 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Melo | Oidio | 0,9 L/ha (60 ml/hl) | Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di pre-fioritura fino a maturazione | 14 giorni |
| Vite da vino e da tavola | Oidio | 0,8-1,5 L/ha (100 ml/hl) | Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, da inizio germogliamento fino a maturazione | 14 giorni |
| Pesco, Albicocco e Nettarino | Oidio | 0,75-1 L/ha (100 ml/hl) | Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di piena fioritura fino a maturazione | 7 giorni |
| Fragola (in pieno campo e serra) | Oidio | 1 L/ha | Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di prima foglia vera fino a maturazione | 3 giorni |
| Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo e serra) | Oidio | 1 L/ha | Massimo 4 applicazioni/anno in pieno campo e 3 applicazioni/anno in serra. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione | 1 giorno |
| Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (in pieno campo e serra) | Oidio | 1 L/ha | Massimo 3 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10 giorni, dallo stadio di 3 foglie vere fino a maturazione | 1 giorno |
| Pomodoro, Melanzana, Peperone (in pieno campo e serra) | Oidio | 1-2 L/ha | Massimo 4 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 10-12 giorni, dallo stadio di 2 foglie vere fino a maturazione | 3 giorni |
| Rosa e Laurocerasо (in pieno campo e serra) | Oidio | 1-1,5 L/ha (150-300 ml/hl) | Massimo 2 applicazioni/anno. Intervenire in modo preventivo, ogni 7-10 giorni, dallo stadio di prime foglie separate fino allo stadio di fine caduta foglie | - |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H351, H317, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# STAVENTO®

1L 5L

Fungicida multisito per la difesa del frumento.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Folpet puro g 39.7 (500 g/l) | M4 | 17752 del 21-12-2021 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Frumento duro e tenero | Septoria (Zymoseptoria tritici) | 1 – 1,2 L/ha | Trattare da inizio levata fino a foglia bandiera. Eseguire 1 o 2 trattamenti a distanza minima di 14 giorni | 42 giorni |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H317, H319, H351, H372, H410, EUH066, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# ZAKEO® 250 SC

1L

Fungicida specifico contro le malattie delle colture orticole.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | FRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Azoxystrobin (250 g/L) | 11 C3 | 17099 del 22-01-2018 |

| COLTURA | PATOLOGIA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Patata | Rizoctonia, Antracnosi | 3 L/ha | Applicare nei solchi di semina; non applicare per immersione dei tuberi o su patate pregerminate. Consentita 1 applicazione ogni due anni | - |
| Aglio, Cipolla, Scalogno (in pieno campo) | Alternaria, Peronospora, Ruggine | 0.8-1 L/ha | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie visibili a prefioritura | 14 giorni |
| Porro (in pieno campo) | Alternaria, Peronospora, Ruggine | 0.8-1 L/ha | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 12-14 giorni di intervallo, da prime foglie visibili a prefioritura | 21 giorni |
| Carciofo (in pieno campo) | Peronospora, Oidio | 0.8-1 L/ha | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 10-12 giorni di intervallo, dalle prime foglie visibili a pre-emergenza del capolino | 7 giorni |
| Asparago (in pieno campo) | Stemfiliosi, Ruggine | 0.8-1 L/ha | Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 10-14 giorni di intervallo, da 10% di sviluppo della superficie - fogliare | - |
| Carota (in pieno campo) | Septoria, Cercospora, Alternaria, Oidio | 0.8-1 L/ha | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7 - 10 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta | 14 giorni |
| Sedano (in pieno campo) | Septoria, Cercospora, Alternaria, Oidio | 0.8-1 L/ha | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 10 - 12 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta | 14 giorni |
| Cavolfiore, Cavolo cappuccio (in pieno campo) | Alternaria, Micosferella | 0,8-1 L/ha | Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 12 - 14 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta | 14 giorni |
| Cetriolo, Cocomero (in pieno campo e serra) | Cancro gommoso, Oidio, Pseudo-peronospora | 0,8 - 1 L/ha pieno campo<br>0,7-0,8 L/ha serra | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7 - 10 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta | 3 giorni |
| Zucchino, Cetriolino, Melone, Zucca (in pieno campo e serra) | Cancro gommoso, Oidio, Pseudo-peronospora | 0,8-1 L/ha | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7 - 10 giorni di intervallo, da prime foglie visibili fino a raccolta | 3 giorni |
| Fagiolo e fagiolino (in pieno campo) | Ruggine, Oidio, Peronospora | 0,8-1 L/ha | Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 14 giorni di intervallo, da prime foglie distese a inizio sviluppo baccelli per fagiolino, fagiolo e pisello da granella; da pre fioritura e fine fioritura per pisello fresco | 14 giorni |
| Pisello fresco, Pisello da granella (in pieno campo) | Ruggine, Oidio, Peronospora | 0,8-1 L/ha | Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 14 giorni di intervallo, da prime foglie distese a inizio sviluppo baccelli per fagiolino, fagiolo e pisello da granella; da pre fioritura e fine fioritura per pisello fresco | P.fresco 14 giorni<br>P.granella 35 giorni |
| Lattughe e insalate tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf (in pieno campo) | Peronospora Oidio | 0,8-1 L/ha | Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie distese a raccolta | 7 giorni |
| Erbe fresche (in pieno campo e serra) | Peronospora, Septoria | 0,8-1 L/ha | Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie distese a raccolta | 7 giorni |
| Pomodoro, Melanzana (in pieno campo e serra) | Alternaria, Cladosporiosi, Peronospora, Oidio | 0,8-1 L/ha | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie distese a raccolta | 3 giorni |
| Peperone | Alternaria, Cladosporiosi, Peronospora, Oidio | 0,8-1 L/ha | Al massimo 2 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da prime foglie distese a raccolta | 3 giorni |
| Fragola | Oidio | 0,8-1 L/ha | Al massimo 3 applicazioni all'anno a distanza di 7-10 giorni di intervallo, da infiorescenze visibili alla raccolta | 3 giorni |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H332, H410, EUH401, EUH208

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.





# INSETTICIDI

## Sommario


| | |
|---|---|
| APYZA® WG | 61 |
| COSAYR® 200 SC Novità | 62 |
| LAMDEX® EXTRA | 63 |
| MAVRIK® SMART | 65 |
| PIRIMOR® 50 | 66 |
| SCHERMO® 0.5 G | 67 |



# APYZA® WG

500 g

Insetticida sistemico indicato per il controllo delle principali specie di afidi che attaccano i fruttiferi e gli ortaggi e per il controllo della mosca bianca su orticale (pomodoro e cucurbitacee).

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | IRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli idrodispersibili | Flonicamid (50%) | 29 | 18156 del 17-10-2023 |

| COLTURA | FITOFAGO | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Agrumi | Afidi | 0,10 kg/ha | Massimo 2 trattamenti con cadenza di 14 giorni | 60 giorni |
| Melo e Pero | Afidi | 0,12 - 0,14 kg/ha | Massimo 3 trattamenti con cadenza di 14 giorni | 21 giorni |
| Pesco e Susino | Afidi | 0,12 - 0,14 kg/ha | Massimo 2 trattamenti con cadenza di 14 giorni | 14 giorni Pesco<br>35 giorni Susino |
| Pomodoro (in campo aperto e serra) | Afidi (Myzus persicae e Aphis gossypii) | 0,10-0,12 kg/ha | Massimo 3 trattamenti con cadenza di 7 giorni.<br>Il prodotto può essere applicato anche tramite irrigazione a goccia o con manichetta per il controllo delle mosche bianche (Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci). Si può intervenire con 2 trattamenti alla dose di 0,20 kg/ha | 3 giorni |
| Cucurbitacee (melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, zucchino) in campo aperto e serra | Afidi (Aphis gossypii) | 0,10 kg/ha | Massimo 3 trattamenti con cadenza di 7 giorni.<br>Il prodotto può essere applicato anche tramite irrigazione a goccia o con manichetta per il controllo delle mosche bianche (Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci). Si può intervenire con 2 trattamenti alla dose di 0,20 kg/ha | 3 giorni |

Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H319, H412, EUH401, EUH208, EUH451

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# COSAYR® 200 SC

Novità

200 ml | 1L

Insetticida selettivo specifico per pomacee, drupacee, noce, castagno, mandorlo, vite da vino e da tavola, agrumi (non in produzione), patate, mais e mais dolce.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | IRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Chlorantraniliprole (200g/L) | 28 | n. 18561 del 04/02/2026 |

| COLTURA | FITOFAGO | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Vite da vino e da tavola | E. ambiguella, L. botrana, A. pulchellana, P. vitegenella | 150-270 mL/ha (vite da vino)<br>150-216 mL/ha (vite da tavola) | Massimo 1 appl./anno (vite da vino)<br>Massimo 2 appl./anno (vite da tavola) | 30 giorni (vite da vino) e 3 giorni (vite da tavola) |
| Patata | Leptinotarsa decemlineata<br>P. operculella | 50-60 mL/ha<br>125-175 mL/ha | Massimo 2 applicazioni/anno | 14 giorni |
| Melo e Pero | Cydia pomonella, Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana, Pandemis spp., Ostrinia nubilialis e Cydia molesta | 180-300 mL/ha | Massimo 2 applicazioni/anno | 14 giorni |
| | Phyllonorycter blancardella, P. corylifoliella, Leucoptera scitella | 160-270 mL/ha | | |
| Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino | C. molesta, A. pulchellana, Cydia funebrana, Operophtera brumata, A. lineatella | 180-300 mL/ha | Massimo 2 applicazioni/anno | 14 giorni |
| Mais e Mais Dolce | O.nubilalis, S. nonagrioides, H. armigera | 100-150 mL/ha | Massimo 2 applicazioni/anno | 7 giorni |
| Noce, Castagno (in coltura allevata) | C. Pomonella, A. lineatella, C. fagiglandana, C. elephas | 180-300 mL/ha | Massimo 2 applicazioni/anno | 21 giorni |
| Mandorlo | A. lineatella | 180-300 mL/ha | Massimo 2 applicazioni/anno | 21 giorni |
| Arancio, limone, mandarino (solo su colture non ancora in produzione) | P. citrella | 50-75 mL/ha | Massimo 2 applicazioni/anno | - |

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H410, EUH208, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# LAMDEX® EXTRA

1kg

Insetticida ad ampio spettro per orticole, cereali, mais, barbabietola da zucchero, oleaginose, vite, frutticole.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | IRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli idrosospensibili | Lambda-cialotrina (2,5%) | 3A | 8259 del 04-05-1993 |

| COLTURA | FITOFAGO | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Arancio, Limone, Mandarino, Clementino | Afidi (foglie non accartocciate) | 40-60 g/hl (1,2 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Arancio, Limone, Mandarino, Clementino | Cocciniglie (neanidi) | 100-160 g/hl | - | 7 giorni |
| Arancio, Limone, Mandarino, Clementino | Mosca, Cimice verde | 60-100 g/hl (0,6-1,6 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Pesco, Nettarine | Afidi (foglie non accartocciate) | 40-60 g/hl (0,4-0,6 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Pesco, Nettarine | Mosca della frutta | 60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Pesco, Nettarine | Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia) | 100-120 g/hl (1-1,2 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Pesco, Nettarine | Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi) | 100-160 g/hl (1-1,6 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Pesco, Nettarine | Tripidi | 60-80 g/hl (0,6-0,8 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Albicocco | Afidi (foglie non accartocciate) | 40-60 g/hl (0,4-0,8 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Albicocco | Mosca della frutta | 60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Albicocco | Lepidotteri in genere (Cidia, Anarsia) | 100-120 g/hl (1-1,2 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Ciliegio, Susino | Afidi (foglie non accartocciate) | 40-60 g/hl (0,4-0,6 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Ciliegio, Susino | Mosca della frutta | 60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Melo, Pero | Afidi (foglie non accartocciate) | 60-80 g/hl (0,6-0,8 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Melo, Pero | Cemiostoma, Litocollete (prima della comparsa delle mine e in presenza di uova mature della prima generazione), Carpo-capsa | 60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Melo, Pero | Ricamatrici estive e Lepidotteri | 80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Melo, Pero | Psilla del pero:<br>1° intervento (adulti svernanti)<br>2° intervento (prime neanidi della seconda generazione) normalmente in maggio | 80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha)<br>100-140 g/hl (1-1,2 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Fragola | Afidi (foglie non accartocciate) | 40-60 g/hl (0,28-0,6 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Fragola | Lepidotteri tortricidi | 80-100 g/hl (0,56-1 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Actinidia e fruttiferi minori (Ribes nero, Uva spina, Lampone) | Afidi (foglie non accartocciate) | 40-60 g/hl (0,28-0,6 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Mandorlo, Nocciolo | Agrilo, Maggiolino (sulla vegetazione) | 80-100 g/hl (0,8-1 kg/ha) | - | 7 giorni |
| Vite da vino e da tavola | Tignola e Tignoletta: prima o seconda generazione | 100 g/hl (1 kg/ha) | - | 21 giorni |
| Vite da vino e da tavola | Cocciniglie (trattamenti etivi su neanidi) | 100 g/hl (1 kg/ha) | - | 21 giorni |

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



INSETTICIDI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vite da vino e da tavola | Cicaline | 60-100 g/hl (0,6-1 kg/ha) | - | 21 giorni |
| Vite da vino e da tavola | Sigaraio | 100 g/hl (1 kg/ha) | - | 21 giorni |
| Barbabietola da zucchero | Altica | 0,42-0,8 kg/ha | - | 14 giorni |
| Barbabietola da zucchero | Afidi (foglie non accartocciate) | 0,28-0,6 kg/ha | - | 14 giorni |
| Barbabietola da zucchero | Cleono, Lisso | 0,56-0,8 kg/ha | - | 14 giorni |
| Barbabietola da zucchero | Nottue Defogliatrici (allo scoperto) | 0,4-0,5 kg/ha | - | 14 giorni |
| Cereali (Frumento, Orzo, Avena, Segale, Sorgo) | Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia | 0,42-0,8 kg/ha (per segale max 0,6 kg/ha) | - | 30 giorni Frumento, Segale, Sorgo<br>40 giorni Orzo, Avena |
| Cereali (Frumento, Orzo, Avena, Segale, Sorgo) | Nottue (allo scoperto) | 0,56-0,8 kg/ha (per segale max 0.48 kg/ha) | - | 30 giorni Frumento, Segale, Sorgo<br>40 giorni Orzo, Avena |
| Mais e Mais dolce | Afidi, Lema, Tripidi, Cecidomia, Idrellia | 0,42-0,8 kg/ha | - | 7 giorni |
| Mais e Mais dolce | Piralide, Diabrotica | 0,56-1 kg/ha | - | 7 giorni |
| Mais e Mais dolce | Nottue (allo scoperto) | 0,4-0,5 kg/ha | - | 7 giorni |
| Oleaginose (Arachide, Girasole, Colza, Soia, Ravizzone, Cotone) | Afidi (foglie non accartocciate), Altica, Meligete e Tentredine | 0,42-0,8 kg/ha | - | 15 giorni Arachide, Soia, Cotone<br>30 giorni Colza, Ravizzone<br>70 giorni Girasole |
| Oleaginose (Arachide, Girasole, Colza, Soia, Ravizzone, Cotone) | Cimici e Cecidomia | 0,58-1,2 kg/ha | - | 15 giorni Arachide, Soia, Cotone<br>30 giorni Colza, Ravizzone<br>70 giorni Girasole |
| Oleaginose (Arachide, Girasole, Colza, Soia, Ravizzone, Cotone) | Nottue Defogliatrici (allo scoperto) | 0,4-0,5 kg/ha | - | 15 giorni Arachide, Soia, Cotone<br>30 giorni Colza, Ravizzone<br>70 giorni Girasole |
| Foraggere (Prati-pascoli, Loglio, Mais, Barbabietola da foraggio, Erba medica) | Afidi (foglie non accartocciate), Apion, Fitonomo | 0,42-1,2 kg/ha | - | 7 giorni Mais, Erba medica<br>15 giorni Barbabietola da foraggio<br>20 giorni Prati e Pascoli<br>30 giorni Loglio |
| Foraggere (Prati-pascoli, Loglio, Mais, Barbabietola da foraggio, Erba medica) | Nottue Defogliatrici (allo scoperto) | 0,4-0,5 kg/ha | - | 7 giorni Mais, Erba medica<br>15 giorni Barbabietola da foraggio<br>20 giorni Prati e Pascoli<br>30 giorni Loglio |
| Mais da foraggio | Diabrotica | 0,56-1 kg/ha | - | 7 giorni |
| Aglio, Cipolla, Carota, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolini di Bruxelles, Carciofo, Cetriolo, Cocomero, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Finocchio, Lattughe e simili, Lenticchia, Melanzana, Melone, Patata, Peperone, Pisello, Pomodoro, Porro, Sedano, Ravanello, Zucchino | Afidi (foglie non accartocciate), Mosca bianca | 0,28-0,6 kg/ha | Su Carciofo, Finocchio non superare la dose di 0,6 kg/ha<br>Su Aglio non superare la dose di 0,8 kg/ha.<br>Su Sedano (solo afidi) 0,4 kg/ha. Su Porro (su afidi e mosca bianca) 0,3 kg/ha.<br>Su Rucola, Valerianella, Crescione, Barbarea dose fissa 0,6 kg/ha.<br>Su Lattughe e Scarole non superare la dose di 0,3 kg/ha | 3 giorni per tutte le colture tranne:<br>7 giorni Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolini di Bruxelles, Fagiolo, Fava, Rucola, Pisello, 21 giorni Sedano, Porro (2 appl.), 14 giorni Carciofo, Lenticchia, Porro (1 appl.), Finocchio, Lattughe e simili (esclusa Rucola)<br>15 giorni Patata |
| | Dorifora, Cavolaia, Tripidi, Piralidi | 0,42-0,8 kg/ha | | |
| | Cimici | 0,56-1 kg/ha | | |
| | Nottue Defogliatrici (allo scoperto) | 0,4-0,5 kg/ha | | |
| Tabacco | Afidi e Mosca bianca | 0,28-0,6 kg/ha | - | 60 giorni |
| Tabacco | Tripidi e Pulce del tabacco | 0,42-0,8 kg/ha | - | 60 giorni |
| Tabacco | Nottue Defogliatrici (allo scoperto) | 0,4-0,5 kg/ha | - | 60 giorni |

Nota: Consultare l'etichetta per numero massimo interventi/anno e intervallo tra i trattamenti.



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H302, H317, H319, H332, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# MAVRIK® SMART

1L

Insetticida ad ampio spettro per frutticole, vite, orticole, cereali, barbabietola da zucchero e altre colture. La nuova formulazione ottimizzata "Smart" ne ha migliorato miscibilità e bagnatura, continuando ad agire in maniera selettiva nei confronti degli insetti utili.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | IRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Emulsione acquosa | Tau-fluvalinate (240 g/L) | 3A | 9800 del 02-11-1998 |

| COLTURA | FITOFAGO | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Arancio, Mandarino, Clementino, Limone, Limetta, Pompelmo | Afidi, Tignola degli agrumi | 0,4 L/ha (20-40 mL/ha) | | 30 giorni |
| Ciliegio | Afidi | 0,3 L/ha (20-60 ml/hl) | | 10 giorni |
| Melo, Pero, Melo cotogno, Nespolo | Afidi, Ditteri cecidomidi, Lepidotteri, forme mobili giovanili di Cocciniglia, Psille e Cimice asiatica | 0,6 L/ha (40-120 ml/hl) | | 30 giorni |
| Pesco, Albicocco, Nettarino | Afidi, Lepidotteri, Tripidi, Cimice asiatica, Mosche della frutta | 0,6 L/ha (40-120 ml/hl) | | 30 giorni |
| Vite da vino e da tavola | Cicaline, Tripidi, Moscerino dei piccoli frutti | 0,3 L/ha (30-300 ml/hl) | | 21 giorni |
| Melanzana | Afidi, Tripidi, Lepidotteri | 0,2 L/ha | | 3 giorni |
| Cetriolo, Cetriolino, Zucchino | Afidi, Tripidi | 0,2 L/ha | | 7 giorni |
| Melone | Afidi, Tripidi | 0,3 L/ha | | 7 giorni |
| Legumi da consumo fresco con e senza baccello ed essiccati (pisello, fagiolo, fagiolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia) | Afidi, Tripidi, Lepidotteri, Ditteri cecidomidi | 0,3 L/ha | Massimo 2 trattamenti/anno con intervallo di 14 giorni tra le applicazioni.<br>È consentito l'impiego in colture in pieno campo | 7 giorni (consumo fresco), 14 giorni (consumo secco) |
| Fagiolo, Fagiolino sgranato | Ragnetto rosso | 0,3 L/ha | | 7 giorni (consumo fresco), 14 giorni (consumo secco) |
| Carota e Bietola rossa | Afidi | 0,3 L/ha | | 14 giorni |
| Lattughe e simili (lattuga, invidia, scarola) | Afidi, Tripidi, Miridi, Lepidotteri, Minatori fogliari | 0,4 L/ha | | 14 giorni |
| Fragola | Afidi, Tripidi, Lepidotteri | 0,3 L/ha | | 7 giorni |
| Patata | Afidi, Dorifora | 0,3 L/ha | | 14 giorni |
| Frumento, Orzo, Avena, Segale, Triticale | Afidi, Ditteri cecidomidi, Cimici, Cicaline | 0,2 L/ha | | 30 giorni |
| Barbabietola da zucchero | Afidi, Lepidotteri, Altica, Cleono, Cassida | 0,2 L/ha | | 14 giorni |
| Colza | Afidi, Coleotteri | 0,2 L/ha | | 30 giorni |
| Erba medica | Afidi, Coleotteri, Tripidi e Lepidotteri | 0,3 L/ha | | 7 giorni |
| Colture Floreali e Ornamentali, Forestali e Vivai | Afidi, larve di Cocciniglia, Tripidi, Lepidotteri, Cicaline, Coleotteri e Acari | 0,4 L/ha (40-80 ml/hl) | | - |
| Carciofo, Cardo | Afidi, Lepidotteri, Tripidi | 0,3 L/ha | | 7 giorni |
| Cavolfiore, Cavolo cappuccio, Cavoletto di Bruxelles | Afidi, Tripidi, Lepidotteri | 0,3 L/ha | Massimo 1 trattamento/anno | 7 giorni |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# PIRIMOR® 50

1kg

Insetticida contro afidi di frutticole, orticole, cereali, mais e oleaginose. Agisce sugli afidi attraverso una triplice azione: contatto, ingestione e asfissia che, unita alla sua attività in fase di vapore (oltre i 15°C) e all'azione translaminare, permette di controllare anche gli afidi non direttamente bagnati dal trattamento.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | IRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli disperdibili | Pirimicarb (50%) | 1A | 4701 del 17-03-1982 |

| COLTURA | FITOFAGO | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Pesco, Nettarino, Albicocco, Susino, Ciliegio, Pomacee | Afidi | 50-75 g/hl (0,76 kg/ha) | Massimo 1 trattamento/anno | 7 giorni |
| Ortaggi in pieno campo: Fragola, Fagioli e Piselli freschi e da granella (con e senza bacello), Carota, Prezzemolo a radice grossa, Rafano, Bietola rossa, Rapa, Navone, Lattughe e insalate (tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf), Carciofo, Cetriolo, Asparago, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Zucchino, Melone, Zucca, Cocomero, Cipolla, Aglio | Afidi | 100 g/hl (0,75 kg/ha) | Massimo 1 trattamento/anno per Fragola, Fagioli e Piselli freschi (con e senza bacello), Carota, Prezzemolo a radice grossa, Rafano, Barbabietola rossa, Rapa, Navone, Asparago, Lattughe e Insalate tranne Spinacio baby leaf e Bietola da foglia baby leaf, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Zucchino.<br><br>Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 - 12 giorni per Carciofo, Cetriolo, Piselli e Fagioli da granella, Melone, Zucca, Cocomero, Cipolla, Aglio.<br><br>Per Asparago trattare dopo la raccolta dei turioni | 7 giorni per tutte le colture tranne:<br><br>7 mesi (dopo raccolta turioni) Asparago<br><br>3 giorni pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, melone, zucca, cocomero, cipolla, aglio |
| Ortaggi in serra: Fragola, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchino | Afidi | 80 g/hl (0,8 kg/ha) | Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni, tranne Pomodoro e Melanzana 7-12 giorni | 7 giorni |
| Ortaggi in serra: Peperone, Melone, Cocomero, Zucca | Afidi | 80 g/hl (0,8 kg/ha) | Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni | 3 giorni |
| Ortaggi in serra: Lattughe e insalate (tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf), Foglie di Sedano e Prezzemolo | Afidi | 0,5 kg/ha | Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7-12 giorni | 14 giorni |
| Patata | Afidi | 0,5 kg/ha | Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7-14 giorni | 7 giorni |
| Mais e Sorgo | Afidi | 0,4 kg/ha | Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni. Trattamenti ammessi fino alla fase di emergenza dell'infiorescenza | - |
| Mais dolce | Afidi | 0,4 kg/ha | Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni | 7 giorni |
| Frumento, Segale, Triticale, Orzo, Avena | Afidi | 0,26 kg/ha | Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 14 giorni. Trattamenti ammessi fino alla fase di maturazione latteo-cerosa | - |
| Lino, Colza, Girasole | Afidi | 0,5 kg/ha | Massimo 2 trattamenti/anno a distanza di 7 giorni | 21 giorni |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H301, H319, H332, H351, H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# SCHERMO® 0.5 G

10kg

Geoinsetticida granulare per barbabietola da zucchero, patata, frumento, mais, oleaginose, ortaggi e tabacco.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | IRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Microgranulare | Teflutrin (0,5%) | 3A | 14479 del 26-01-2009 |

| COLTURA | FITOFAGO | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Barbabietola da zucchero | Elateridi, Altica della bietola, Atomaria linearis, Scutigerella immaculata, Tipule | 12-15 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |
| Frumento | Bibionidi, Hylemya sp., Scutigerella immaculata, Tipule | 10-12 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |
| Frumento | Elateridi, maggiolino | 12-15 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |
| Mais, Mais Dolce, Sorgo | Elateridi, Diabrotica, Hylemya sp., Scutigerella immaculata, Tipule, Nottue (Agrotis sp.) | 12-15 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |
| Soia, Girasole | Elateridi, Hylemya sp., Altica,Nottue (Agrotis sp.) | 12-15 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |
| Pomodoro, Melanzana,Rapa, Navone, Melone, Cetriolo, Cocomero, Finocchio, Sedano, Dolcetta/valerianella/ gallinella, Crescione, Rucola, Barbarea, Senape juncea, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Carota, | Elateridi, Punteruolo, Blaniulus guttulatus, Miriapodi, Altica, Mosca della carota, Hylemya sp., maggiolino, Tipule, Nottue (Agrotis sp.) | 15-20 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |
| Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolfiore | Delia radicum, Elateridi, Nottue, Punteruolo, Blaniulus, Miriapodi, Altica, Mosca della carota, Hylemya, Maggiolino, Tipule | 15-20 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |
| Patata | Elateridi | 12-15 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |
| Tabacco | Elateridi, Tipula, Nottue (Agrotis spp.) | 12-15 kg/ha | Massimo 1 trattamento per ciclo vegetativo. Divieto di utilizzo in serra | - |



Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo:
H410, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# SPECIALI

## Sommario


| | |
|---|---|
| BREVIS® | 71 |
| EXELGROW® | 72 |
| PARLEAF | 73 |
| POWERFILM® | 74 |



# BREVIS®

Diradante specifico per melo e pero.

1kg

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | HRAC | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|---|
| Granuli idrosolubili | Metamitron (15%) | 5 C1 | 16084 del 16-05-2014 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Melo | 1,1 - 2,2 kg/ha | Applicare BREVIS® quando la dimensione media del frutto centrale misura almeno 8 - 10 mm. Qualora necessario, per aumentare l'effetto diradante, ripetere il trattamento a dimensione del frutto centrale di 12-14 mm e non oltre i 16 mm (non effettuare più di 2 trattamenti all'anno per un massimo complessivo di 4.4 kg/ha). La seconda applicazione può essere effettuata non prima di 5-10 giorni dopo la prima. Impianti con forte allegagione possono necessitare di un secondo trattamento, come anche impianti noti per la difficoltà di dirado | 60 giorni |
| Pero | 1,1 - 1,65 kg/ha (dose consigliata 1,1 kg/ha) | Applicare BREVIS® quando la dimensione media del frutto centrale è compresa tra 8 - 12 mm. Non effettuare una seconda applicazione | 60 giorni |



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H302, H318, H411, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# EXELGROW®

1L 5L

Biostimolante di origine naturale - soluzione di filtrato di crema di alghe - per vite, frutticole e orticole consentito in Agricoltura Biologica.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|
| Soluzione di filtrato di crema di alghe ottenuto tramite estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina | Carbonio (C) organico di origine biologica 10,3%<br>Mannitolo 0,7 g/L | 0023801/18 del 29-04-2010 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Vite da vino e da tavola | 0,5 - 1 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da sviluppo foglie ogni 15 gg 2-3 interventi. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: da distensione grappolo ogni 15 gg 2-3 interventi per migliorare qualità organolettiche | - |
| Melo, Pero | 1 L/ha | MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: dopo la cascola ogni 14 gg 2-3 interventi per migliorare colore e pezzatura | - |
| Insalate, Beby Leaf * | 0,5-1 L/ha<br>1,5 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da emergenza/post trapianto ogni 7 gg 2-3 interventi. DOPO IL TAGLIO: per accelerare il ricaccio | - |
| Agrumi | 0,5 - 1 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da distesa foglie ogni 21 gg 2-3 interventi. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: formazione frutto ogni 14 gg 2-3 interventi | - |
| Drupacee | 1 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da distesa foglie ogni 21 gg 2-3 interventi. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: frutto noce ogni 14 gg 2-3 interventi | - |
| Actinidia | 0,5 - 1 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da distesa foglie ogni 21 gg 2-3 interventi. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: formazione frutto ogni 14 gg 2-3 interventi | - |
| Olivo | 1,5 - 2 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da emissione nuovi getti a prefioritura 1-2 interventi. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: fino indurimento nocciolo 2-3 interventi | - |
| Fragola | 0,5 - 1 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 21 gg 2-3 interventi. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: da allegagione ogni 21 gg 2-3 interventi | - |
| Pomodoro, Melanzana, Peperone * | 0,5 - 1,5 L/ha | PRE-TRAPIANTO: Applicazione con immersione plateau piantine in soluzione allo 0,3%. ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 21 gg 2-3 interventi. Per applicazioni in manichetta utilizzare la dose più alta. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: da allegagione ogni 21 gg 2-3 interventi | - |
| Zucchino, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Cocomero * | 0,5-1,5 L/ha | PRE-TRAPIANTO: Applicazione con immersione plateau piantine in soluzione allo 0,3%. ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 21 gg 2-3 interventi. MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: in produzione ogni 21 gg 2-3 interventi | - |
| Carota * | 0,5 - 1 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da sviluppo foglie ogni 21 gg 2-3 interventi | - |
| Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro | 0,5 - 1,5 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da emergenza/post trapianto ogni 14 gg 2-3 interventi | - |
| Cavoli | 0,5 - 1,5 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 21 gg 2-3 interventi | - |
| Ravanello, Rapa | 0,5 - 1,5 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da emergenza ogni 14 gg 2-3 interventi | - |
| Tabacco | 0,5 - 1,5 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da post trapianto ogni 14 gg 2-3 interventi | - |
| Frutta a guscio | 1 L/ha | MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: ingrossamento frutto ogni 14 gg 2-3 interventi per migliorare qualità e pezzatura | - |
| Ribes Nero, Lampone, Mora, Uva Spina, Melograno, Kaki, Luppolo | 0,5 - 1 L/ha | MIGLIORAMENTO PRODUZIONI: ogni 15 gg 2-3 interventi | - |
| Erbe Fresche | 0,5 - 1 L/ha<br>1,5 L/ha | ACCRESCIMENTO VEGETATIVO: da emergenza/post trapianto ogni 7 gg 2-3 interventi. DOPO IL TAGLIO: per accelerare il ricaccio | - |
| Colture Floreali e Ornamentali | 0,5 - 1,5 L/ha | DURANTE LA STAGIONE VEGETATIVA | - |
| Tappeti Erbosi Ornamentali e Sportivi | 0,5 - 1,5 L/ha | DURANTE LA STAGIONE VEGETATIVA: affrancamento zolle e antistress | - |

* In pieno campo e in serra.

Il numero di interventi consigliati è indicativo e non vincolante, può essere variato in base alle specifiche esigenze della coltura e/o obbiettivi aziendali.

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.



# PARLEAF

2,5L 1L 5L

Coadiuvante naturale a base di olio vegetale per prodotti fitosanitari ad attività erbicida.

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|
| Emulsione | Olio di colza* (864 g/L)<br>* Grado alimentare | 17807 del 12-02-2021 |

| COLTURA | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|
| Tutte le colture | 1-1.25 L/ha | PARLEAF è un olio vegetale completamente biodegradabile che, aggiunto ai prodotti fitosanitari ad attività erbicida, ne migliora la distribuzione, la bagnabilità, l'aderenza e l'assorbimento degli stessi sulle infestanti trattate, garantendo in tal modo una maggiore azione del prodotto erbicida. PARLEAF riduce inoltre il fenomeno della deriva e il dilavamento causato dalle piogge | - |

Indicazioni di pericolo:
EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

# POWERFILM®

5L

Coadiuvante liquido da utilizzare in miscela con gli erbicidi POSTSCRIPT® 80 XL e PYXIDES® DUO

| FORMULAZIONE | COMPOSIZIONE | N. REGISTRAZIONE |
|---|---|---|
| Sospensione concentrata | Olio di colza metilestere (440 g/L) | 17852 del 01-06-2021 |

| COLTURA | FITOFAGO | DOSI | NOTE | INT. SICUREZZA |
|---|---|---|---|---|
| Riso | Bagnante specifico per Postscript 80 XL | 1-2 lt/ha | Bagnate specifico per erbicidi in etichetta | - |

Indicazioni di pericolo:
H304, H317, H410, EUH066, EUH401

Prodotto fitosanitario Autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.





# INDICE
# SEZIONE TECNICA

## Sommario


| | |
|---|---|
| Classificazione CLP | 78 |
| Consigli di preparazione generale | 80 |
| Pittogrammi CLP | 81 |
| Centri anti veleno | 81 |

# Classificazione CLP

| INDICAZIONE DI PERICOLO FISICO | |
|---|---|
| H200 | Esplosivo instabile. |
| H201 | Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. |
| H202 | Esplosivo; grave pericolo di proiezione. |
| H203 | Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione. |
| H204 | Pericolo di incendio o di proiezione. |
| H205 | Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio. |
| H206 | Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto. |
| H207 | Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto. |
| H208 | Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto. |
| H220 | Gas altamente infiammabile. |
| H221 | Gas infiammabile. |
| H222 | Aerosol altamente infiammabile. |
| H223 | Aerosol infiammabile. |
| H224 | Liquido e vapori altamente infiammabili. |
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| H226 | Liquido e vapori infiammabili. |
| H228 | Solido infiammabile. |
| H229 | Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |
| H230 | Può esplodere anche in assenza di aria. |
| H231 | Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata. |
| H232 | Spontaneamente infiammabile all'aria. |
| H240 | Rischio di esplosione per riscaldamento. |
| H241 | Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento. |
| H242 | Rischio d'incendio per riscaldamento. |
| H250 | Spontaneamente infiammabile all'aria. |
| H251 | Autoriscaldante; può infiammarsi. |
| H252 | Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. |
| H260 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente. |
| H261 | A contatto con l'acqua libera gas infiammabili. |
| H270 | Può provocare o aggravare un incendio; comburente. |
| H271 | Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. |
| H272 | Può aggravare un incendio; comburente. |
| H280 | Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. |
| H281 | Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. |
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli. |

| INDICAZIONE DI PERICOLO SALUTE | |
|---|---|
| H300 | Letale se ingerito. |
| H301 | Tossico se ingerito. |
| H302 | Nocivo se ingerito. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H310 | Letale a contatto con la pelle. |
| H311 | Tossico per contatto con la pelle. |
| H312 | Nocivo per contatto con la pelle. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica della pelle. |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H330 | Letale se inalato. |
| H331 | Tossico se inalato. |
| H332 | Nocivo se inalato. |
| H334 | Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. |
| H335 | Può irritare le vie respiratorie. |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| H340 | Può provocare alterazioni genetiche. |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H341 | Sospettato di provocare alterazioni genetiche. |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H350 | Può provocare il cancro. |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio>. |
| H350i | Può provocare il cancro se inalato. |
| H351 | Sospettato di provocare il cancro. |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H360 | Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H360D | Può nuocere al feto. |
| H360Df | Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità. |
| H360F | Può nuocere alla fertilità. |
| H360FD | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. |
| H360Fd | Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |
| H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H360d | Sospettato di nuocere al feto. |
| H360f | Sospettato di nuocere alla fertilità. |
| H360fd | Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. |
| H362 | Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. |
| H370 | Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H371 | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H372 | Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> |
| | in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H373 | Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> |
| | in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
| | <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. |
| H300 + H310 | Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle. |
| H300 + H330 | Mortale se ingerito o inalato. |
| H310 + H330 | Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione. |
| H300 + H310 + H330 | Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. |
| H301 + H311 | Tossico se ingerito o a contatto con la pelle. |
| H301 + H331 | Tossico se ingerito o inalato. |
| H311 + H331 | Tossico a contatto con la pelle o se inalato. |
| H301 + H311 + H331 | Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. |
| H302 + H312 | Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle. |
| H302 + H332 | Nocivo se ingerito o inalato. |
| H312 + H332 | Nocivo a contatto con la pelle o se inalato. |
| H302 + H312 + H332 | Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato. |
| EUH380 | Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani. |
| EUH381 | Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani. |

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto. La "i" minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

| INDICAZIONE DI PERICOLO AMBIENTE | |
|---|---|
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H413 | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H420 | Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera. |
| EUH430 | Può interferire con il sistema endocrino nell'ambiente. |
| EUH431 | Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente. |
| EUH440 | Si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani. |
| EUH441 | Si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani. |
| EUH450 | Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche. |
| EUH451 | Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche. |

| INDICAZIONE DI PERICOLO SUPPLEMENTARI | |
|---|---|
| EUH014 | Reagisce violentemente con l'acqua. |
| EUH018 | Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/ infiammabile. |
| EUH019 | Può formare perossidi esplosivi. |
| EUH044 | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
| EUH070 | Tossico per contatto oculare. |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie |
| EUH201 | Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini. |
| EUH201A | Attenzione! Contiene piombo. |
| EUH202 | Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| EUH203 | Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica. |
| EUH204 | Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica. |
| EUH205 | Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica. |
| EUH206 | Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). |
| EUH207 | Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza. |
| EUH208 | Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica. |
| EUH209 | Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso. |
| EUH209A | Può diventare infiammabile durante l'uso. |
| EUH210 | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. |
| EUH211 | Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. |
| EUH212 | Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri. |
| EUH401 | Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. |

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto. La "i" minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

# Consigli di preparazione generale

Quando usati in miscela si consiglia di introdurre i prodotti nel serbatoio, con agitatore - ricircolo in funzione, secondo la sequenza:

- regolatori di pH
- sacchetti idrosolubili (WSB)
- prodotti micro-granulari (WG-SG)
- polveri bagnabili (WP)
- sospensioni concentrate e dispersioni oleose (SC-OD)
- suspoemulsioni (SE)
- emulsioni acquose (EW/MW)
- emulsioni concentrate (EC)
- concentrati solubili in acqua (SL)
- bagnanti, olii, fertilizzanti, prodotti antideriva

Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli).

Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

Leggere attentamente le etichette prima di iniziare le operazioni, rispettare le indicazioni contenute nelle stesse



# Pittogrammi CLP

| SIMBOLO | SIGLA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
|  | GHS02 | INFIAMMABILE |
|  | GHS05 | CORROSIVO |
|  | GHS06 | TOSSICITÀ ACUTA |
|  | GHS07 | PERICOLO PER LA SALUTE |
|  | GHS08 | GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE |
|  | GHS09 | PERICOLOSO PER L'AMBIENTE |
| | Nc | NON CLASSIFICATO |

# Centri anti veleno



Per richieste di informazioni di carattere medico suggeriamo di rivolgersi a:

**Centro Nazionale Antiveleni OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA**
**Piazza Ospedale Maggiore, 3 - MILANO - Tel. 02.66101029**

Altri centri anti veleno

**BERGAMO**
Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII
Piazza OMS, 1
Tel. 800.883300

**FIRENZE**
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
Viale Morgagni, 65
Tel. 055.7947819

**FOGGIA**
Azienda ospedaliera universitaria riuniti
viale Luigi Pinto, 1
Tel. 800.183459

**NAPOLI**
Ospedale Cardarelli - Via Cardarelli, 9
Tel. 081.7472870
Tel. 081.5453333

**PAVIA**
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione
Fondazione S. Maugeri - Via Ferrata, 8
Tel. 0382.24444

**ROMA**
Policlinico A. Gemelli - Largo F.Vito, 1
Tel. 06.3054343
Policlinico Umberto I° - Viale del Policlinico, 155
Tel. 06.9978000
Ospedale pediatrico Bambino Gesù
Tel. 06.68593726

**VERONA**
Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI)
Piazzale Aristide Stefani, 1
Tel. 800.011858

Rilasciato a Luglio 2026

Impaginazione: DilloStudio

ADAMA

Segui ADAMA
sui nostri canali social

Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Adama Italia non risponde di eventuali danni causati dall'uso dei prodotti in dosi e in modi non conformi a quanto indicato nella etichetta ministeriale. Prodotti fitosanitari Autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.