

CARNIVAL RIO

(CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)
FUNGICIDA PER TRATTAMENTI IN PIENO CAMPO DI
CEREALI
Modalità di azione FRAC 3

CARNIVAL RIO

Registrazione del Ministero della Sanità n° 9634 del
14.05.1998

COMPOSIZIONE

Procloraz puro	39,7 g (=450 g/l)
Coformulanti q.b.a	100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410- molto tossico per
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH 401 - Per evitare rischi per la salute umana e per
l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla
portata dei bambini. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente
in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd
84100 BEER-SHEVA ISRAELE
Rappresentata in Italia da
ADAMA Italia s.r.l.

Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:

ADAMA Makhteshim Ltd - Beer Sheva - Israele
IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)
CHEMARK Zrt. - 8182 Peremarton - Ungheria
SIPCAM OXON Spa - Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Agriculture España SA 8970 HUMANES MADRID (Spagna)

Stabilimento di confezionamento:

KOLLANT S.r.l.- Vigonovo (VE)

Distribuito da:

AGRIBIO CHEMICALS SRL - Frescada di Preganzlol (TV)

Contenuto mL 100-250-500; L1-5-10-15-20-25-50

Partita N.



ATTENZIONE

all'aperto, le quantità non possono superare 450 g procloraz/ha
per ogni applicazione.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti
completamente asciutta.

Il foraggio dei cereali trattati con questo prodotto non deve
essere utilizzato per l'alimentazione animale.

Informazioni per il medico:

Sintomi: nell'animale da esperimento è irritante delle mucose
(lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respira-
zione; possibili effetti epatici.

Terapia: sintomatica

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

Caratteristiche: Il prodotto si caratterizza per un ampio spet-
tro d'azione nei confronti dei principali patogeni di cereali. Agi-
sce per via preventiva e curativa con azione di contatto e trans-
laminare ma non sistemica.

Epoca d'impiego, dosi e modalità d'impiego:

FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, AVENA, SEGALE E TRITICALE

Impiegare il prodotto contro funghi responsabili del mal del
piede e delle malattie delle foglie e della spiga (*Fusarium* spp.,
Cercospora spp., *Oidio*, *Septoria* spp., *Rhynchosporium* spp.,
Helminthosporium spp.).

È possibile effettuare un'applicazione l'anno alla dose di 1 l/ha,
con un volume d'acqua di 200 -600 l/ha:

- da inizio levata fino allo stadio di completa spigatura
per frumento tenero e duro, triticale e segale
- da inizio levata fino allo stadio prime ariste visibili per
orzo e avena.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati rispettare il
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate
le norme precauzionali e le prescrizioni mediche indicate per i
prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossica-
zione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI ORZO E AVENA

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle
condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto
è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio
del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella

presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'effi-
cacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle per-
sone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il mate-
riale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contamina-
zione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi