

LUMA KL

Esca lumachicida granulare per la distruzione di
limacce - lumache - chiocciole e gasteropodi in genere
Esca ricca di proteine attrattive - Resiste nel tempo

LUMA KL

Registrazione Ministero della Salute n. 13402 del 24.01.2007


Composizione:

100 g di prodotto contengono
Metaldeide acetica pura
Coformulanti*

5,00 g

q. b. a 100

g



PERICOLO

*contiene denatonio benzoato,
sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte
di bambini e di animali non bersaglio

INDICAZIONI DI PERICOLO: H361f- Sospettato di nuocere alla fertilità. H318-Provoca gravi lesioni oculari.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280- Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P405-Conservare sottochiave. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P501 – Smaltire il contenuto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG) – Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

Distribuito da:

COMPO Italia S.r.l. – Cesano Maderno (MB)

Contenuto: 100 - 200 - 250 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 25 kg

Partita n. vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Evitare l'ingestione l'inalazione e il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Utilizzare guanti adatti durante l'applicazione del prodotto - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore - Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE

LUMA KL contiene una sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

LUMA KL distrugge limacce, lumache, chiocciole e gasteropodi in genere infestanti le colture di seguito riportate.

LUMA KL attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi; ha una buona resistenza all'ammuffimento, all'umidità e al vento in condizioni d'uso non particolarmente gravose; è di facile e pratico impiego.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

L'esca granulare **LUMA KL** va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuale pioggia o annaffiatura, con terreno coltivato a:

- Fragola (in campo);
- Aglio (in campo); pomodoro, melanzana, peperone (in campo e serra);

- Melone, anguria (in campo);
- Broccoli, cavolfiore (in campo);
- Legumi, piselli, fagiolini, fagioli (in campo);
- Seme di colza, girasole, soia, cotone, barbabietola da zucchero, cereali (orzo, avena, segale, triticale e frumento);
- Mais, miglio, sorgo;
- Colture ornamentali e floreali, vivai, piantine e piantagioni.

Applicare **70 g per ogni 100 m² di superficie**. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7-14 giorni per un massimo di 2 applicazioni per stagione.

Per trattamenti singoli applicare 2-3 g (pochi granuli) attorno alle piante.

Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.

LE ESCHE DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA MINIMIZZARE IL RISCHIO DI INGESTIONE DA PARTE DI ALTRI ANIMALI.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LEGUMI, PISELLI, FAGIOLINI, FAGIOLI; 20 GIORNI PRIMA PER AGLIO; 3 GIORNI PRIMA PER BROCCOLI, CAVOLFOIORE; 90 GIORNI PRIMA PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO; 60 GIORNI PRIMA PER CEREALI (ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE E FRUMENTO)

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.**

ETICHETTA FORMATO STANDARD

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**