





CERERIS®

Fungicida ad azione sistemica e di lunga durata a protezione di rese e qualità.



- ▶ CERERIS® è la nuova soluzione ADAMA per il controllo delle principali patologie fungine di frumento tenero, frumento duro e orzo.
- ▶ A base di prolioconazolo, CERERIS® si distingue per una spiccata sistemica acropeta, sia nei tessuti verdi che nella spiga, e si caratterizza per l'attività preventiva e curativa, oltre che per l'elevata selettività colturale.
- ▶ Grazie a queste proprietà, CERERIS® è lo strumento ideale per l'impiego in qualsiasi fase del ciclo colturale, da inizio levata fino a fine fioritura, senza problemi di miscibilità con erbicidi o altri fungicidi.

Programma per il controllo dei patogeni fungini





CERERIS®: garanzia di produzioni elevate e di qualità



Il complesso della **fusariosi della spiga** è una delle principali patologie del frumento. Le infezioni a suo carico possono determinare elevate riduzioni della produzione e pari al 30% - 70%, oltre che scarsa qualità della granella (minore peso ettolitrico; elevati contenuti di DON). Trattamenti con CERERIS® nel periodo compreso tra fine spigatura e fioritura, permettono un controllo ottimale della malattia, consentendo alla coltura di sviluppare al meglio il proprio potenziale produttivo in termini quantitativi, qualitativi, e di salubrità.

Vantaggi

- ▶ Ampia finestra d'impiego (da fine accestimento a fine fioritura).
- ▶ Protezione di lunga durata contro le principali malattie fogliari e della spiga.
- ▶ Ottima efficacia nel controllo di *Fusariosi della spiga* (con drastica riduzione del contenuto di DON), oltre che *Septoria*, *Ruggini*, *Oidio*, ed *Elmintosporiosi*.
- ▶ Nessun problema di selettività, anche quando impiegato in miscela con erbicidi e/o altri fungicidi.
- ▶ Inserito nei disciplinari regionali di Produzione Integrata.

Dosi e modalità di impiego

COLTURA	PATOLOGIA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Frumento Orzo	Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.), Ruggini	0.8 l/ha	Al massimo 2 trattamenti all'anno a distanza di 10-14 giorni, da inizio levata a piena fioritura. Per il controllo della Fusariosi della spiga, trattare da fine spigatura a fioritura.	35 giorni

N. Registrazione	n° 17803 del 17.02.2021
Composizione	Protiokonazolo puro g 25.38 (250 g/L)
Formulazione	Emulsione concentrata
Classificazione CLP	

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.