

GOLTIX® SUPER

DISERBANTE SELETTIVO PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

SOSPENSIONE CONCENTRATA

MECCANISMO D'AZIONE (HRAC): GRUPPO 5 (C1) E GRUPPO 15 (K3)

GOLTIX® SUPER

Registrazione n° 17580 del 21.12.2021 del Ministero della Salute

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
Metamitron puro 30.7 g (= 350 g/l)
Etofumesate puro 13.16 g (= 150 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100



INDICAZIONI DI PERICOLO:

H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 – Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, nè bere, nè fumare dopo l'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P332 + P313 - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ADAMA AGAN L.t.d.

P.O.B. 262 – 77100 Ashdod – ISRAELE

Rappresentata in Italia da:

ADAMA Italia S.r.l.

Via Zanica,19 – 24050 Grassobbio (BG) Tel. 035328811

Stabilimenti di produzione:

ADAMA AGAN LTD - Ashdod (Israel)

ADAMA Agriculture Espana SA, Humanes de Madrid, Madrid – Spain

ALTHALLER ITALIA S.r.l. – S. Colombano Al Lambro (MI)

I.R.C.A. Service SpA - Fornovo S. Giovanni (BG)

Distribuito da:

ADAMA Italia S.r.l. – Grassobbio (BG)

Contenuto: 1-5-10-15-20 l

Partita n° vedi timbro

GOLTIX® è marchio registrato ADAMA GROUP

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Indossare indumenti da lavoro e guanti durante le fasi di miscelazione e caricamento del prodotto. Indossare indumenti da lavoro durante tutte le attività di rientro in campo. In caso di un'applicazione l'anno alla dose di 3 l/ha in pre-emergenza e nel caso di 1-5 applicazioni l'anno alla dose di 1.5 l/ha in post emergenza, al fine di proteggere residenti e astanti, applicare il prodotto con ugelli anti-deriva o mantenere una zona di rispetto non trattata di 5 metri. In caso di 3-5 applicazioni l'anno alla dose di 1.1-2 l/ha in post emergenza, al fine di proteggere residenti e astanti, applicare il prodotto con ugelli anti-deriva e mantenere una zona di rispetto non trattata di 5 metri.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza di 10 m, vegetata, non trattata, dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Epoca di applicazione	n° applicazioni per anno	Dose/ha per applicazione
Pre-emergenza	1	3 l/ha
+	+	+
Post-emergenza	1 - 5	Massimo 1.5 l/ha
Post-emergenza	3 - 5	1.1 - 2 l/ha

N.B.

Non superare la dose massima di 6 l/ha di prodotto per anno.

Si consiglia di utilizzare volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha.

Negli interventi frazionati di post-emergenza applicare con barbabietole dalla fase di prima foglia visibile vera e ripetere il trattamento dopo 6-20 giorni. È possibile applicare Goltix® Super in miscela con altri prodotti ad azione fogliare per completare lo spettro d'azione.

Il dosaggio è in funzione del tipo di terreno (le dosi maggiori vanno impiegate sui terreni tendenti al pesante), del grado d'infestazione presente e della strategia di intervento prevista (solo interventi di post-emergenza oppure interventi combinati di pre-emergenza e post-emergenza).

INFESTANTI SENSIBILI:

Farinello comune (*Chenopodium album*) Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*)

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:

Centinoda (*Polygonum aviculare*),

Avvertenza: in post-emergenza non trattare barbabietole in stress vegetativo determinato da cause ambientali o parassitarie.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non utilizzare la parte fogliare per alimentazione animale in caso di fallimento della coltura, potatura o nel caso di applicazione eseguite quando la coltura ha raggiunto il 70 % di copertura del terreno.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

In caso di fallimento della coltura è possibile seminare dopo lavorazione del terreno (15-20 cm di profondità) barbabietola da zucchero e da foraggio o mais, patata, pisello e fava nel caso in cui il fallimento della coltura avvenga tardivamente.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenze, si consiglia di attenersi alle indicazioni riportate in etichetta impiegando il prodotto in miscela o in programmi di diserbo che includano l'uso di prodotti a differente meccanismo d'azione, metodi agronomici, meccanici o fisici.

Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le autorità competenti in caso di sospetta resistenza.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: Non esistono incompatibilità note. In caso di miscela con altri formulati si raccomanda di effettuare saggi preliminari e di rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CONSERVAZIONE

Il prodotto è stabile per 2 anni se conservato nella sua confezione integra.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 19 settembre 2022"

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**