



Listen ▸ Learn ▸ Deliver


Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

RICORDATI
DI SCARICARE
LA APP ADAMA!



Adama Italia S.r.l. Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia - www.adama.com

PIRIMOR® 50



IL MELETO VIRTUALE:
UN'ESPERIENZA
DA VIVERE.




Inquadra il QR CODE

**Perché lavorare
con semplicità significa
tranquillità, qualità
e sostenibilità.**

La soluzione ottimale contro
gli afidi delle colture arboree e ortive...
Anche quelli annidati!



ADAMA.COM



PIRIMOR® 50 è un aficida ad elevato effetto abbattente, attivo nei confronti delle specie di più comune diffusione e verso quelle più temute, come *Eriosoma lanigero* e reinfestazioni di *Disaphis* spp. L'elevata selettività nei confronti dell'entomofauna utile e il meccanismo d'azione differente da piretroidi e neonicotinoidi, rendono il prodotto ideale per i programmi di difesa integrata.

FORMULAZIONE: Granuli idrodispersibili	COMPOSIZIONE: Pirimicarb 50% (500 g/kg)	IRAC: 1A	N. REGISTRAZIONE: 4701 del 17-03-1982
COLTURA	DOSE	NOTE	INTERVALLO DI SICUREZZA
Pomacee	0,76 kg/ha	Massimo 1 trattamento all'anno. Si consiglia l'aggiunta di bagnante a olio minerale estivo	7 giorni



Avvertenza: **PERICOLO**
Indicazioni di pericolo:
H301 - H319 - H332 - H351 - H410 - EUH401

Afidi



Nei frutteti di melo la presenza di afidi, seppur soggetta a fluttuazioni, è da considerarsi certa. Tra le specie maggiormente diffuse vi sono: *Dysaphis plantaginea* (afide grigio del melo), *Eriosoma lanigerum* (afide lanigero) e *Aphis pomi* (afide verde del melo).

I danni provocati dagli afidi possono essere anche di notevole entità: dallo sviluppo stentato della vegetazione, alla deformazione dei frutti.



Modalità d'azione

PIRIMOR® 50 ha una triplice azione sull'insetto (contatto, ingestione ed asfissia) che, unita all'attività in fase di vapore (oltre i 15°C) e all'azione translaminare, permette di controllare anche gli afidi non direttamente bagnati dal trattamento.

CONTATTO DIRETTO	PIRIMOR® 50 abbatte rapidamente gli afidi. Questo è evidente nel giro di poche ore in condizioni ideali.
AZIONE FUMIGANTE	PIRIMOR® 50 produce una potente azione fumigante dopo l'applicazione che aiuta a controllare gli afidi nascosti sotto le foglie, all'interno della chioma della coltura e al riparo dal contatto diretto con lo spray. L'attività fumigante è più evidente quando si applica PIRIMOR® 50 a temperature superiori a 20°C.
ATTIVITÀ TRANSLAMINARE	PIRIMOR® 50 penetra nella parte superiore delle foglie irrorate e si sposta verso la parte inferiore delle foglie. Gli afidi che si rifugiano sulla parte posteriore delle foglie vengono controllati quando si nutrono.



Il rapido effetto abbattente che caratterizza PIRIMOR® 50 consente di limitare i danni da suzione e la produzione di melata e può ridurre la trasmissione dei virus.

Efficacia d'uso

L'efficacia dell'attività di vapore di PIRIMOR® 50 è influenzata dalla temperatura:



Nel grafico è possibile osservare l'intervallo di temperatura all'interno del quale si ha il maggior effetto di vapore (in verde), quello in cui tale effetto è minimo (in arancio) e quando, per avere un buon effetto, è necessario impiegare alti volumi di bagnatura e gocce medio grandi (in rosso).

Punti di forza



- ▶ Efficace contro le principali specie di afidi che colpiscono le colture arboree ed ortive
- ▶ Rapido potere abbattente
- ▶ Elevata attività di vapore
- ▶ Marcata capacità translaminare per colpire gli afidi presenti sulla pagina fogliare opposta a quella trattata
- ▶ Efficace anche ad alte temperature
- ▶ Rispettoso nei confronti degli insetti utili e specificatamente su *Aphelinus Mali*
- ▶ Buon profilo residuale e veloce degradazione

Note tecniche

Se si applica PIRIMOR® 50 da solo: aggiungere un tensioattivo non ionico (es. sorbitan mono oleato) per migliorare la copertura, quando l'umidità è bassa (in condizioni di elevata evaporazione).

- PIRIMOR® 50 è resistente alla pioggia entro 1 ora dall'applicazione.