



Listen ▶ Learn ▶ Deliver

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

RICORDATI
DI SCARICARE
LA APP ADAMA!



Adama Italia S.r.l. Via Zanica, 19 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia - www.adama.com



ADAMA

PRAXIM®
Anticipa la protezione
del tuo campo.



**Al tuo fianco per fornirti
le migliori soluzioni
per la difesa dei tuoi raccolti.**

PRAXIM, erbicida di pre emergenza
a base di Metobromuron
per il controllo delle infestanti
a foglia larga.



ADAMA.COM



FORMULAZIONE: Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE: Metobromuron puro 41 g (=500 g/L)	HRAC: C2	N. REGISTRAZIONE: 17066 del 06-10-2017
--	--	-------------	---

COLTURA	DOSI	NOTE	INTERVALLO SICUREZZA
Soia	2-3 l/ha	In pre-emergenza della soia, girasole, patata e favino	-

Avvertenza: **ATTENZIONE**
Indicazioni di pericolo:
H 373 - H410 - EUH401

Efficacia d'uso

SPECIE INFESTANTI SENSIBILI	SPETTRO D'AZIONE
GRAMINACEE	
Giavone comune (<i>Echinochloa Crus galli</i>)	
Fienarola annuale (<i>Poa annua</i>)	
Falso Panico (<i>Setaria viridis</i>)	
DICOTILEDONI	
Amaranto (<i>Amaranthus</i> sp.)	
Ambrosia (<i>Ambrosia artemisifolia</i>)	
Borsa del pastore (<i>Capsella vulgaris</i>)	
Centocchio Comune (<i>Stellaria media</i>)	
Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>)	
Farinaccio (<i>Chenopodium</i> sp.)	
Galinsoga (<i>Galinsoga Parviflora</i>)	
Matricarie (<i>Matricaria</i> sp.)	
Mercorella Comune (<i>mercurialis annua</i>)	
Poligono (<i>Polygonum</i> sp.)	
Porcellana comune (<i>Portulaca oleracea</i>)	
Senecio Comune (<i>Senecio Vulgaris</i>)	
Senape Selvatica (<i>Sinapis arvensis</i>)	
Viola selvatica (<i>Viola arvensis</i>)	

■ Infestanti sensibili ■ Infestanti mediamente sensibili

Linea di pre-emergenza

La strategia anti-resistenza



+

=

Miscela efficace su dicotiledoni (*Amaranthus* spp.) e su graminacee estive (*Sorghum* h.)

+

=

Miscela da utilizzare in presenza di forte presenza di (*Amaranthus* spp., *Abutilon* T.)

+

+

=

Miscela Completa ampio spettro d'azione (*Amaranthus* spp., *Abutilon* T., *Echinochloa* C., *Sorghum* h.)

Il meccanismo di azione di PRAXIM® causa l'inibizione del processo fotosintetico a livello del PS II delle infestanti, che vanno incontro a clorosi, poi necrosi e infine alla morte.

Proprio grazie a questo meccanismo d'azione, PRAXIM®, offre una gestione strategica del diserbo della soia.

PRAXIM® quindi risulta un'arma in più qualora fossimo in presenza di infestanti resistenti agli erbicidi con meccanismo d'azione di inibizione dell'ALS, solitamente usati per gli interventi in post-emergenza.

Punti di forza

- **Spettro d'azione «mirato»:** efficace controllo sulle dicotiledoni più importanti (***Amaranthus* sp, *Chenopodium* A., *Portulacea* O.**);

► **Compatibilità con la maggior parte degli erbicidi di pre-emergenza** più utilizzati su soia;
- **Flessibilità d'uso:** possibilità di modulare il dosaggio quando il prodotto viene impiegato in miscela con altri erbicidi;

► **Buona disponibilità del p.a in qualsiasi tipologia di terreno.**

Indicazioni di utilizzo

- La dose di PRAXIM® deve essere tarata in funzione della tessitura del terreno (max 2 l/ha sabbioso)
- Il prodotto va applicato **immediatamente dopo la semina della soia** e comunque con coltura non emersa (non oltre i 5 giorni dalla data di semina)
- Il prodotto va impiegato su terreno bene affinato e privo di zolle



Chenopodio
Chenopodium album



Amaranto
Amaranthus spp.



Porcellana Comune
Portulaca Oleracea