

FOXPRO

Erbicida per il diserbo della soia, pomodoro, carciofo, prezzemolo, cipolla, aglio, scalogno e carota

Sospensione concentrata

MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo E (HRAC)

FOXPRO

Registrazione del Ministero della Salute
n. 17319 del 30.10.2018

Composizione:

100 g di prodotto contengono
Bifenox puro 40,6 g (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g



ATTENZIONE

ADAMA Deutschland GmbH

Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Köln, (Germania)
Tel. 035 328811

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 – Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare bere o fumare quando si usa il prodotto. P273 – Evitare il rilascio nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P332+P313 - In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P391 - raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Stabilimento di produzione:

ADAMA AGAN Ltd P.O.B. 262 Ashdod ISRAELE
IRCA Service S.p.A. – Forno S. Giovanni (BG)
SIPCAM OXON S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Agricoltura España SA 8970 - Humanes Madrid (Spagna)

Distribuito da:

ADAMA Italia S.r.l. - Via Zanica, 19 Grassano 24050 (BG)

Contenuto: 1 – 5 – 10 – 15 – 20 l Partita n° vedi timbro

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e, in caso di applicazioni su cipolla, aglio, scalogno, indossando guanti protettivi.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di ampiezza pari a:

- 5 m in combinazione con ugelli che riducano la deriva del 30%, alternativamente, di 15 m per soia
- 10 m per applicazioni su pomodoro, carota, aglio, scalogno e cipolla
- 10 m vegetati per applicazioni su prezzemolo e carciofo

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

FOXPRO è un erbicida selettivo a base di Bifenox, un principio attivo che agisce per assorbimento fogliare inibendo l'enzima PPO (protoporfirinogeno ossidasi). Il prodotto, applicato in pre-emergenza su soia, pre-trapianto su pomodoro, carciofo, prezzemolo post-emergenza su carota, cipolla, aglio e scalogno forma uno strato sulla superficie del suolo che risulta efficace nel contenimento delle giovani plantule in fase di emergenza.

CULTURE, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

INFESTANTI SENSIBILI:

Amaranto (*Amaranthus* spp.).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI:

Portulaca (*Portulaca* spp.), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinaccio (*Chenopodium* spp.), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*).

SOIA

Il prodotto si impiega in pre-emergenza o post emergenza precoce della coltura, quando ha differenziato le prime 2-3 foglie vere.

DOSE: **1 l/ha** distribuito con 100-400 litri d'acqua.

POMODORO, PREZZEMOLO e CARCIOFO

Il prodotto si impiega almeno 5 giorni prima del trapianto della coltura in pre-emergenza delle infestanti.

DOSE: **1 l/ha** distribuito con 200-400 litri d'acqua.

CIPOLLA, AGLIO e SCALOGNO

Il prodotto si impiega con due interventi frazionati in post-emergenza della coltura. Applicare il primo trattamento quando la coltura ha differenziato le prime 3-4 foglie vere e ripetere il trattamento dopo almeno 7 giorni.

DOSE: **0.5 l/ha** per ciascuna applicazione, distribuiti con 200-400 litri d'acqua.

Impiegare esclusivamente su colture trapiantate con bulbilli.

CAROTA

Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura, quando ha differenziato le prime 3-4 foglie vere.

DOSE: **1 l/ha** distribuito con 100-400 litri d'acqua. Eseguire massimo un trattamento per anno.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Sciogliere il prodotto in poca acqua, indi versare nell'irroratrice riempita a circa un quarto e portare a volume agitando. Mantenere in agitazione durante il trattamento.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima PPO. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizi fitosanitario regionale di riferimento), in caso di sospetta resistenza.

^{*)}Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29.07.2022 per pomodoro, prezzemolo, cipolla, aglio e scalogno valida dal 13.05.2022 al 09.09.2022;
per carota valida dal 05.07.2022 al 01.11.2022
per carciofo valida dal 29.07.2022 al 25.11.2022"

AVVERTENZE AGRONOMICHE:

Utilizzare solo in condizioni di calma di vento. Adottare possibilmente ugelli antideriva ed evitare che la deriva possa raggiungere colture adiacenti.

FITOTOSSICITA'

A seguito del trattamento di post-emergenza possono verificarsi sintomi transitori quali piccole ustioni e alterazioni della morfologia fogliare che non hanno alcun effetto negativo sulla produzione.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO
LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

¹⁶Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 29.07.2022 per pomodoro, prezzemolo, cipolla, aglio e scalogno valida dal 13.05.2022 al 09.09.2022;
per carota valida dal 05.07.2022 al 01.11.2022
per carciofo valida dal 29.07.2022 al 25.11.2022"