

TIMELINE® FX

Diserbante selettivo per frumento tenero e duro, segale

Concentrato emulsionabile.

Pinoxaden - codice HRAC-WSSA 1;A

Fluroxypyr-metyl - codice HRAC-WSSA 4;O

Florasulam - codice HRAC-WSSA 2;B

Composizione

100 g di prodotto contengono:

pinoxaden puro	g 2,9 (30 g/l)
fluroxypyr-metyl puro	g 7,3 (75 g/l)
florasulam puro	g 0,17 (1,75 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g 0,73 (7,5 g/l)
coformulati q.b. a	g 100

contiene pinoxaden, cloquintocet-mexyl e benzyl alcohol

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare

H361d: Sospettato di nuocere al feto

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Attenzione

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosoli. P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P273: Non disperdersi nell'ambiente. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso P333 + P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P337 + P 313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico P362 + P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente

P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito

P501: Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente

Syngenta Crop Protection AG

Rosentalstrasse 67, 4058 Basilea, (Svizzera)

Rappresentata in Italia da: Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi, 280/6 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Distribuito da: ADAMA Italia s.r.l. – Tel. 035-328811

Stabilimenti di produzione:

CHEMARK ZRT. H-8182 Peremarton-Gyartelep, Hungary
ADAMA Agan Ltd, Haashlag st. Ashdod 7752009, Israel

Stabilimenti di confezionamento:

Sipcam Oxon SpA., Salerano S/Lambro (LO)

Torre S.r.l., Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Stabilimenti di rietichettatura:

ARCO Logistica S.r.l. - Via Battistella, 22 Ferrara (FE)

Arco Logistica S.r.l., Via Monari, 5 Ferrara (FE)

Registrazione Ministero della Salute n. 18146 del 24.11.25

Partita n. vedi corpo della confezione

Contenuto netto: litri 1-3-5-7,5-10-15-20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare tuta da lavoro e guanti durante le fasi di caricamento, miscelazione ed applicazione del prodotto.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare, dalla zona non coltivata, una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri o, in alternativa, di 1 metro con attrezzature che riducano la deriva del 75%.

Pericoloso per le api. Per proteggere api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non utilizzare in presenza di api. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

pinoxaden	2,9%
fluroxypyr-metyl	7,3%
florasulam	0,17%
cloquintocet-mexyl	0,73%

Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Timeline FX è un diserbante graminicida e dicotiledonicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, segale da applicare in post-emergenza.

Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.

Spettro d'azione:

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Avena (*Avena spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Falaride o Scagliola (*Phalaris paradoxa*, *Phalaris brachystachys*, *Phalaris minor*), Attaccamani (*Galium aparine*), Papavero (*Papaver rhoes*), Centocchio (*Stellaria media*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Veccia dolce (*Vicia sativa*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Infestanti mediamente sensibili: Corregiola (*Polygonum aviculare*). I risultati migliori si ottengono applicando Timeline FX su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress, l'efficacia potrebbe non essere ottimale.

Dosi e modalità d'impiego

Epoca di applicazione:

Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata (graminacee) o fra lo stadio di cotiledoni e quello di abbozzi fiorali (dicotiledoni).

Trattare una sola volta l'anno impiegando volumi d'acqua compresi fra 50 e 300 litri per ettaro usando attrezzature da diserbo che consentano una ottimale bagnatura della vegetazione.

Dosi:

1,5 l/ha - 2 l/ha

Utilizzare il dosaggio massimo per le applicazioni tardive e in presenza di Loglio (*Lolium spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*) e per le dicotiledoni.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Il prodotto può dar luogo a fenomeni di resistenza nelle malerbe. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida o aggiungere ad esso prodotti con un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione culturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio Fitosanitario di riferimento) in caso di sospetta resistenza.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o in stato di stress per basse temperature, ristagni d'acqua, siccità o trattamenti con agrofarmaci.

In caso di miscela con altri prodotti e/o di applicazione su varietà di recente introduzione, è consigliato effettuare saggi preliminari, su poche piante, prima di estendere il trattamento sull'intera superficie

Si raccomanda di non eseguire rotazioni culturali con le seguenti colture: aglio, cipolla, scalogno.

Preparazione della soluzione da irrorare

Riempire la cisterna per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della cisterna con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nella cisterna più del tempo necessario per la distribuzione.

Immediatamente dopo l'uso, pulire accuratamente l'attrezzatura di applicazione. Svuotare completamente il sistema e sciacquare il serbatoio, le condutture e gli ugelli due o tre volte con acqua pulita fino a quando tutte le tracce di prodotto sono state rimosse.

Compatibilità

Timeline FX non è miscelabile con dicotiledonicidi contenenti 2,4D o dicamba che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verifichassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche o attacchi parassitari, è possibile seminare frumento, orzo, avena, segale e mais senza attendere alcun intervallo.

In caso di semina di colza, pisello, sorgo soia, barbabietola da zucchero e girasole, attendere almeno 14 gg dal trattamento prima di seminare.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24.11.25

Su cereali possono verificarsi fenomeni di fitotossicità (clorosi, deformazioni, arresto della crescita) che risultano transitori e non influiscono sulla resa della coltura.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato da ADAMA.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 24.11.25