

COSAYR® 200 SC



ADAMA

Il tuo alleato più forte contro
la piralide del mais!



INSETTICIDI

COSAYR® 200 SC è un'insetticida specifico per la lotta ai principali lepidotteri del mais, mais dolce, pomacee, drupacee, vite e della dorifora e tignola della patata.

COSAYR® 200 SC



INSETTICIDI

Il tuo alleato più forte contro la piralide del mais!

COSAYR® 200 SC è un insetticida a base di Chlorantraniliprole che agisce per via citotropica-translaminare e dotato di lunga persistenza. È caratterizzato da un meccanismo d'azione non neurotossico, agisce prevalentemente per ingestione ma anche per contatto.

Benefici di COSAYR® 200 SC



COMODITÀ

Grazie alla lunga persistenza, permette di ridurre in modo significativo il numero di interventi necessari durante la stagione.



VERSATILITÀ


Grazie alla sua attività multistadio fornisce un controllo della Piralide nelle seguenti fasi del ciclo vitale: uova e tutti gli stadi larvali.



QUALITÀ PRODUTTIVA

Formulazione di ultima generazione che garantisce performance superiori e maggiore sicurezza per l'operatore.

Meccanismo d'azione



COSAYR® 200 SC fa parte della famiglia delle Diammidi e, grazie al suo meccanismo di azione, agisce sui modulatori dei recettori rianodinici (Gruppo IRAC 28)

Impiego per coltura

FORMULAZIONE Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE Chlorantraniliprole (200g/L)	IRAC Gruppo 28	N. REGISTRAZIONE n. 18561 del 04/02/2026
Coltura	Fitofago		Dose
Mais e Mais Dolce*	<i>O.nubilalis</i> , <i>S. nonagrioides</i> , <i>H. armigera</i>		100-150 mL/ha
Patata	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>		50-60 mL/ha
	<i>P. operculella</i>		125-175 mL/ha
Melo e Pero	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Argyrotaenia pulchellana</i> , <i>Pandemis spp.</i> , <i>Ostrinia nubilalis</i> e <i>Cydia molesta</i>		180-300 mL/ha
Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino	<i>C. molesta</i> , <i>A. pulchellana</i> , <i>Cydia funebrana</i> , <i>Operophtera brumata</i> , <i>A. lineatella</i>		180-300 mL/ha
Vite da vino e da tavola	<i>E. ambiguella</i> , <i>L. botrana</i> , <i>A. pulchellana</i> , <i>P. viitegenella</i>		150-270 mL/ha
Noce, Castagno (in coltura allevata), mandorlo	<i>C. Pomonella</i> , <i>A. lineatella</i>		180-300 mL/ha
Arancio, limone, mandarino (solo su colture non ancora in produzione)	<i>P. citrella</i>		50-75 mL/ha

*Su mais a completamento dello spettro d'azione su adulti di Diabrotica (Diabrotica Virginica) si consiglia di abbinare COSAYR® 200 SC a LAMDEX® EXTRA a base della s.a. lambda-cialotrina, dotata di forte potere abbattente e ampio spettro d'azione.

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.