

# COSAYR® 200 SC



ADAMA

Il tuo alleato più forte contro  
i lepidotteri della vite!



COSAYR® 200 SC è un'insetticida specifico per la lotta ai principali lepidotteri della vite, mais, mais dolce, pomacee, drupacee e della dorifora e tignola della patata.

# COSAYR® 200 SC



INSETTICIDI

## Il tuo alleato più forte contro i lepidotteri della vite!

COSAYR® 200 SC è l'insetticida di riferimento a base di Chlorantraniliprole per un controllo efficace e duraturo dei principali lepidotteri della vite. Grazie alla sua attività citotropica e translaminare, assicura una protezione persistente della vegetazione. Il meccanismo d'azione non neurotossico, efficace per ingestione e contatto, garantisce elevata affidabilità, selettività e piena integrazione nei programmi di difesa moderna.

## Benefici di COSAYR® 200 SC



### PERSISTENZA

Grazie alla lunga persistenza, permette di ridurre in modo significativo il numero di interventi necessari durante la stagione.



### VERSATILITÀ

Grazie alla sua attività multistadio ovolarvicida fornisce un controllo ottimale delle tignole prima che si nutrano o trovino rifugio nel grappolo.



### QUALITÀ PRODUTTIVA

Formulazione di ultima generazione che garantisce performance superiori e maggiore sicurezza per l'operatore.

## Timing Applicativo



Tempismo ideale

Buon tempismo

Tempismo accettabile

Per ottenere la massima efficacia è preferibile applicare COSAYR® 200 SC durante le fasi di deposizione delle uova e di schiusa. Grazie alla sua versatilità d'uso è molto efficace anche sui primi stadi larvali. Un buon monitoraggio e una qualità di irrorazione che garantiscano una buona copertura del fogliame saranno fondamentali per un'applicazione efficace dell'insetticida.

## Impiego per coltura

FORMULAZIONE Sospensione concentrata	COMPOSIZIONE Chlorantraniliprole (200g/L)	IRAC Gruppo 28	N. REGISTRAZIONE n. 18561 del 04/02/2026
Coltura	Fitofago		Dose
Vite da vino e da tavola	<i>E. ambiguella</i> , <i>L. botrana</i> , <i>A. pulchellana</i> , <i>P. vitigenella</i>		150-270 mL/ha
Patata	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> <i>P. operculella</i>		50-60 mL/ha 125-175 mL/ha
Melo e Pero	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Argyrotaenia pulchellana</i> , <i>Pandemis spp.</i> , <i>Ostrinia nubilialis</i> e <i>Cydia molesta</i>		180-300 mL/ha
Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino	<i>C. molesta</i> , <i>A. pulchellana</i> , <i>Cydia funebrana</i> , <i>Operophtera brumata</i> , <i>A. lineatella</i>		180-300 mL/ha
Mais e Mais Dolce	<i>O. nubilalis</i> , <i>S. nonagrioides</i> , <i>H. armigera</i>		100-150 mL/ha
Noce, Castagno (in coltura allevata), mandorlo	<i>C. Pomonella</i> , <i>A. lineatella</i>		180-300 mL/ha
Arancio, limone, mandarino (solo su colture non ancora in produzione)	<i>P. citrella</i>		50-75 mL/ha

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e alle frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.