Brevis®

ADAMA



Unico per selezione. Originale per natura. Il diradante che incorona la qualità.

SPECIALI

Brevis® soluzione semplice ed efficace per il dirado di melo e pero.

Perché Brevis®?

- Massimizza il reddito migliorando la qualità del raccolto: incremento di pezzatura, colorazione e grado zuccherino delle mele.
- Meccanismo d'azione unico, indipendente dal bilancio ormonale della pianta.
- Elevata efficacia diradante, anche su varietà difficili come Fuji, sia in pianura che montagna.
- Migliora il ritorno a fiore, contribuendo a stabilizzare la produzione e a ridurre l'alternanza.
- Significativa riduzione delle ore di dirado manuale, con vantaggi economici e operativi.
- Nessun effetto negativo sulla rugginosità e assenza di frutti pigmei.
- Formulazione dedicata (SG) a base di calcio diformiato, nutriente chiave per le pomacee.
- Veloce assorbimento fogliare e assenza di residui alla raccolta.
- Sicuro per gli organismi utili, ideale per i programmi di difesa integrata.
- Registrato anche su pero.



Brevis®

1kg



Avvertenza: PERICOLO
Indicazioni di pericolo:
H302, H318, H411, EUH401

FORMULAZIONE	COMPOSIZIONE	FAMIGLIA	N. REGISTRAZIONE:
Granuli idrosolubili	Metamitron (15%)	Triazinoni **HRAC** 5 C1	16084 del 16-05-2014


COLTURA	DOSI	NOTE	INT. SICUREZZA
Melo	1,1 - 2,2 kg/ ha	Vedi avvertenze agronomiche	60 giorni
Pero	1,1 kg/ha	Vedi avvertenze agronomiche	60 giorni

ATTIVITÀ
Dopo l'assorbimento per via fogliare, il prodotto viene traslocato nei cloroplasti, dove inibisce la fotosintesi clorofilliana.


SOLUBILITÀ
1,7 g/l in acqua a 20°C (elevata solubilità).

Epoche di intervento

Melo



Pero - Conference








Meccanismo d'azione


BREVIS® agisce a livello della fotosintesi, inducendo una cascola selettiva dei frutti in eccesso e contribuendo al miglioramento della qualità e della produttività.

BREVIS® agisce sul fotosistema II, bloccando il flusso di elettroni con cui la foglia trasforma la luce in energia. Nei giorni successi la capacità fotosintetica si riduce fino a oltre il 60%; l'effetto è temporaneo, in genere entro 3 settimane. La pianta produce così meno zuccheri, andando a creare competizione tra germogli e frutticini per le risorse. Cadono i frutticini laterali, più deboli, mentre il frutto centrale del corimno resta sulla pianta. Il risultato è un diradamento selettivo: meno frutti, ma di pezzatura e qualità superiori.

Sito d'azione di Brevis®



Andamento della riduzione della capacità fotosintetica della pianta



Prova Laimburg 2012 - Varietà: Golden Delicious

Modalità d'impiego

MELO
Applicare BREVIS® alla dose di 1,1-2,2 kg/ha, quando la dimensione media del frutto centrale misura almeno 10mm. Qualora necessario, per aumentare l'effetto diradante, ripetere il trattamento a dimensione del frutto centrale di 12-14 mm e non oltre i 16 mm. La seconda applicazione può essere effettuata non prima di 5-10 giorni dopo la prima applicazione. Valutare una seconda applicazione, anche parziale, solo su varietà dal dirado difficoltoso e in condizioni collinari e montane. Impianti con forte allegagione possono necessitare di un secondo trattamento, come anche impianti noti per la difficoltà di dirado. Si sconsiglia l'impiego di BREVIS® su varietà Jeromine.

PERO
Applicare BREVIS® alla dose di 1,1 kg/ha quando la dimensione media del frutto centrale è di 12 mm. Si consiglia di limitare i trattamenti alla varietà Conference. Non effettuare una seconda applicazione.

Utilizzare volumi di acqua sufficienti ad assicurare un'adeguata copertura dei frutti e delle foglie, evitando un eccessivo gocciolamento e rispettando le dosi ad ettaro indicate (in ogni caso utilizzare volumi d'acqua compresi tra 1000 e 1500 l/ha).



Avvertenze agronomiche

- Applicazioni singole o ripetute possono causare sovra-diradamento, anche senza superare le dosi massime di etichetta. Per ottimizzare il risultato si raccomanda di attenersi alle indicazioni di tecnici esperti in dirado.
- Non applicare BREVIS® entro 5 giorni da una gelata o quando una gelata è attesa.
- In condizioni di stress della pianta (danni da vento, siccità o altri fattori), l'efficacia del prodotto può risultare accentuata; valutare attentamente necessità, dose ed epoca di intervento.
- Non applicare su foglie bagnate; evitare trattamenti nelle prime ore del mattino o subito dopo piogge. Eventuali piogge oltre 2 ore dal trattamento non compromettono l'efficacia.
- La presenza di reti antigrandine può aumentare l'effetto di BREVIS® per la riduzione della radiazione solare disponibile.
- Ridurre la dose in frutteti vigorosi e con abbondante presenza di succhioni. Al contrario, piante vecchie o poco vigorose possono richiedere dosaggi più elevati.
- L'attività di BREVIS®, in quanto inibitore della fotosintesi, è influenzata da condizioni climatiche e vigore della pianta. Tempo nuvoloso e temperature notturne elevate nella settimana precedente e successiva al trattamento possono aumentare l'effetto diradante. Si consiglia di monitorare i dati meteo dalla stazione più vicina da una settimana prima fino a due settimane dopo l'applicazione, soprattutto in caso di interventi successivi. Applicare a temperature diurne >10 °C e <25 °C
- Non utilizzare BREVIS® su meleti con meno di 4 anni e su impianti di pero con meno di 7 anni.
- Sconsigliato l'uso in miscela o in strategia con altri diradanti, oli estivi o coadiuvanti. Prodotti a base di olio o formulazioni EC applicati in prossimità del trattamento possono aumentarne l'effetto.
- Varietà e cloni possono rispondere in modo differente ai prodotti diradanti.

Fitotossicità

- BREVIS® è generalmente ben tollerato dalle principali varietà di melo e pero. In condizioni sfavorevoli possono comparire maculature clorotiche fogliari, senza effetti negativi sullo sviluppo della coltura.
- Dosaggi superiori a quelli indicati in etichetta possono causare gravi necrosi fogliari seguite da filloptosi.
- Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
- Evitare la deriva verso piante non target; in particolare le drupacee risultano molto sensibili, con possibile fitotossicità fogliare.
- Non utilizzare erbicidi volatili nella settimana precedente e seguente l'applicazione di BREVIS® in quanto possono aumentare eventuali clorosi fogliari.

Brevis® non è compatibile con le miscele.

Stampato in Novembre 2026

Impaginazione: DilloStudio

ADAMA

Segui ADAMA
sui nostri canali social

Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Adama Italia non risponde di eventuali danni causati dall'uso dei prodotti in dosi e in modi non conformi a quanto indicato nella etichetta ministeriale. Prodotti fitosanitari Autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.