

유제 **new**

조반니



종합 살균제는 조반니!

유효성분 및 함량 피리클로스트로빈 22.9%

독성구분 저독성 / 어독성 1 급

포장단위 50ml × 50병 / 박스
125ml × 50병 / 박스

작용기작 코드 다3

제품특징

01 적용 병해폭이 매우 넓은 스펙트럼을 자랑합니다.

02 작물체에서 예방 및 침투효과가 있어 사용시기 및 방제기간이 깁니다.

03 강한 침달성 및 침투이행성을 견비 하였습니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가축나무	녹병	발생초기 경엽처리	5ml	발생초기	-
감귤	검은점무늬병			수확 10일 전까지	4회 이내
	더덩이병			수확 7일 전까지	2회 이내
갯기름나물(방풍)	탄저병				
갯기름나물(식방풍)	녹병	파종·정식기 관주처리	5ml(1ℓ/m ²)	파종·정식기까지	1회 이내
고구마	덩굴썩김병	발생초기 경엽처리	5ml	수확 7일 전까지	2회 이내
고려엉겅퀴 (곤드레나물)	탄저병			수확 2일 전까지	3회 이내
	흰가루병				
고추(단고추류포함)	탄저병			수확 7일 전까지	1회 이내
고추(잎)		수확 14일 전까지	2회 이내		
고추냉이잎				잿빛곰팡이병	




주요 병충해



고추 탄저병



사과 탄저병



마늘 잎마름병

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준				
				사용시기	사용횟수			
고추냉이잎	먹들이병	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	2회 이내			
곤달비	흰가루병		5ml	수확 7일 전까지	3회 이내			
	점무늬병							
공심채	탄저병							
구기자	균핵병							
근대	검은점무늬병							
금감(금굴)	균핵병					수확 14일 전까지		
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워포함)	균핵병							
낙엽송	잎떨림병					6.7ml	발생초기	-
냉이	흰가루병					5ml	수확 7일 전까지	2회 이내
녹두	탄저병							
	갈색무늬병							
다채(비타민)	균핵병							
당귀(잎)	잿빛곰팡이병		수확 14일 전까지					
당근	수확 30일전							
대추	탄저병							
더덕	갈색무늬병			수확 14일 전까지				
	수확 7일 전까지							
돌나물	흰가루병			수확 7일 전까지	2회 이내			
들깨(잎)	녹병			수확 5일 전까지	3회 이내			

조반니 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준							
				사용시기	사용횟수						
들깨(잎)	균핵병	발생초기 경엽처리	5ml	수확 5일 전까지	3회 이내						
땅콩	흰비단병	정식(파종) 후 관주처리	5ml(1ℓ/m ²)	파종(정식)기까지	1회이내						
레몬	검은점무늬병	발생초기 경엽처리	5ml	수확 14일 전까지	3회 이내						
마(산약)	잿빛곰팡이병			수확 7일 전까지							
	탄저병										
마늘	잎마름병			수확 14일 전까지	5회 이내						
망고	탄저병			수확 7일 전까지	3회 이내						
매실				수확 14일 전까지							
모과				수확 14일 전까지							
무화과				수확 3일 전까지							
민들레				점무늬병		수확 7일 전까지	2회 이내				
배암차즈기(곰보배추)	탄저병				수확 7일 전까지	3회 이내					
복분자						2회 이내					
부추	잿빛곰팡이병					수확 7일 전까지	3회 이내				
비름	균핵병										
뽕나무(오디)	오디균핵병						탄저병		수확 21일 전까지	4회 이내	
사과	탄저병									수확 7일 전까지	3회 이내
산딸기										수확 14일 전까지	4회 이내
살구										수확 30일 전까지	3회 이내
삼주											
상추	흰가루병								수확 7일 전까지	2회 이내	
	균핵병										
생강	잎마름병	수확 21일 전까지							수확 14일 전까지	3회 이내	
	잎집무늬마름병										
석류	탄저병								수확 14일 전까지		
	열매썩음병										



지파니
균제

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
소나무류	잎마름병	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	발생초기	-
	모잘록병	발생초기 토양분무처리			
수박(복수박포함)	탄저병	발생초기 경엽처리	5mℓ	수확 3일 전까지	5회 이내
	덩굴마름병				
순무유채	균핵병			수확 7일 전까지	2회 이내
신선초					
쑥	흰가루병			수확 7일 전까지	3회 이내
쑥갓	균핵병				
쑥부쟁이					
아스파라거스	콩잎줄기마름병			수확 14일 전까지	2회 이내
아욱	균핵병			수확 7일 전까지	3회 이내
	탄저병			수확 14일 전까지	
앵두	균핵병			수확 21일 전까지	2회 이내
	검은무늬병				
양미나리(샐러리)	균핵병			수확 14일 전까지	3회 이내
양배추	균핵병				
양상추	흰가루병			수확 7일 전까지	2회 이내
	양앵두(체리)			탄저병	수확 14일 전까지
양파	노균병				
영경귀	흰가루병			수확 7일 전까지	4회 이내
오미자	점무늬병	수확 21일 전까지			
옥수수	깜부기병	출수직전 경엽처리	수확 7일 전까지	3회 이내	
왕고들빼기	흰가루병	발생초기 경엽처리	수확 10일 전까지	4회 이내	
유자	탄저병		수확 7일 전까지	3회이내	
유채(잎)	잿빛곰팡이병				

조반니 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
인삼	점무늬병	발생초기 경엽처리	5ml	수확 14일 전까지	4회 이내
	잘록병	파종 1일전 종자 분의처리	10g/kg(종자)	파종기까지	1회 이내
잇꽃(홍화)	탄저병	발생초기 경엽처리	5ml	수확 7일 전까지	3회 이내
	잿빛곰팡이병				
자두	탄저병				
잔디	라이족토니아마름병	발생초기 관주처리	5ml(1ℓ/m ²)	발생초기	-
참다래(키위)	탄저병	발생초기 경엽처리	5ml	수확 14일 전까지	3회 이내
취나물	균핵병			수확 7일 전까지	
	흰가루병				
치커리	균핵병				
케일	균핵병				
콩	균핵마름병			수확 30일 전까지	1회 이내
	탄저병				
	노균병				
파(쪽파포함)	녹병			수확 14일 전까지	3회 이내
파세리(향미나리)	흰가루병				
팥	갈색무늬병				
	탄저병	수확 7일 전까지			

사용상 주의사항

1. 이 농약은 3회 이상 연용 하지 말고, 저항성 관리를 위해 작용기작이 다른 제품과 번갈아 살포하시기 바랍니다.
2. 이 농약은 부착성과 흡수성이 매우 우수하므로 흡수력을 높여주는 기능성 전착제와는 혼용하여 사용하지 마십시오.
3. 이 농약은 인삼의 전엽기에는 약해의 우려가 있으므로 잎이 완전히 전개, 경화된 후 사용하십시오.