

“전 세계 **54개국**에서 같이 사용합니다”

유제

아질



아질은 독일어로 빠르다는 뜻입니다. 빠른 화본과 제초제 아질!

유효성분 및 함량	프로파퀴자포프 10%
독성구분	저독성 / 어독성 II급
포장단위	75ml × 50병/박스
제 조 원	아다마 아간 (이스라엘)
작용기작 코드	H01

| 제품특징

01

경엽처리형 제초제로서 피, 바랭이, 독새풀, 강아지풀 등 화본과 잡초에는 특이한 살초효과가 있으나 광엽잡초에는 효과를 나타내지 않습니다.

02

살포된 약액은 잡초의 잎에서 빠르게 흡수되고 뿌리까지 이행되어 살포 후 약 10~20일 사이에 완전히 고사시킵니다.

03

잡초 체내로 빨리 흡수되므로 약제 처리 후 2~3시간 이후의 경우는 방제 효과에 영향을 미치지 않습니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	1,000m ² (10a)당 사용량	
				약량	살포량
감자	일년생잡초 (화본과)	잡초 3~5엽기 경엽처리	15ml	75ml	100ℓ
고구마					
고추					
당근					
마늘					
배추					


| 주요 대상 잡초



돌피



바랭이



| 사용방법

1. 잡초 발생 후 정해진 양을 잡초 경엽에 골고루 묻도록 뿌리십시오.
2. 광엽잡초에는 효과가 없으므로 화본과 잡초(피, 바랭이, 독새풀, 강아지풀 등)가 많이 발생한 포장에 사용하십시오.

사용상
주의사항

1. 화본과 작물(벼, 보리, 밀, 호밀, 귀리, 조, 옥수수 등)과 잔디밭에는 약해가 심하므로 절대 사용하지 마시고 주위에 화본과 작물이 있을 경우에는 약액이 날아가 묻지 않도록 주의하십시오.
2. 겨울철 저온기 또는 출수기 이후 등 잡초생육이 정지되어 있을 경우에는 방제 효과가 떨어지므로 사용하지 마십시오.
3. 아질 제품 안에는 강력한 전착제가 함유 되어 있어 추가적으로 전착제를 사용하는 경우 엉김 현상이 있을 수 있으니 전착제를 혼용하여 사용하지 마십시오.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	1,000m ² (10a)당 사용량	
				약량	살포량
양파	일년생잡초 (화본과)	잡초 3~5엽기 경엽처리	15ml	75ml	100ℓ
천궁(일천궁)					
콩					
파					