

액상수화제

**쭈머**



잡초 뭉쳐서 이리 빨리 죽어? 뭉주긴 쭈머 주지!

유효성분 및 함량	글리포세이트이소프로필아민 40.5% 옥시플루오르펜 2.5%
독성구분	저독성 / 어독성Ⅲ급
포장단위	250ml × 40병/박스 500ml × 24병/박스 1ℓ × 16병/박스
제 조 원	아다마아간 (이스라엘)
작용기작 코드	H09 + H14

| 제품특징

01

일년생잡초는 물론 숙, 쇠비름, 클로버 등 방제하기 어려운 잡초에도 효과가 우수하며, 그 밖의 일년생 및 다년생 잡초에도 우수한 방제 효과를 나타냅니다.

02

약효가 오래 지속되므로 과원 잡초를 경제적으로 관리할 수 있습니다.

03

기온이 높을 경우 약효가 빨리 나타납니다(2~3일 후 약효 발현).

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	1,000m <sup>2</sup> (10a)당 사용량	
				약량	살포량
감귤밭	일년생잡초 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리	60ml	300ml	100ℓ
비농경지					
사과밭					



## | 주요 대상 잡초



망초



썩



## | 사용방법

1. 이 제품은 잡초 생육기 경엽처리제이므로 잡초가 충분히 자랐을 때 반드시 잡초의 잎이나 줄기에 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
2. 살포 후 2~4시간 이내에 비가 올 경우 약효가 떨어질 수 있으며, 2시간 이내에 비가 많이 내렸을 경우에는 다시 살포하십시오. 또한 살포 후 2일 이내에는 관수하지 마십시오.

### 사용상 주의사항

1. 줌머는 비선택성제초제이므로 주변의 농작물에 약액이 날아가 묻지 않도록 주의하십시오.
2. 살포시 약제가 작물에 묻으면 약해를 입을 수 있으니 헛골, 논뚝, 과수원 등에서 사용할 때는 주변 농작 물에 약액이 묻지 않도록 반드시 노즐부분에 비산방지캡을 씌우고 살포 하십시오.
3. 이 제품은 눈에 약한 자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 약액이 들어 가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
4. 이 농약은 비선택성제초제이므로 반드시 전용살포기를 사용하시고, 희석하거나 저장 또는 뿌릴 때는 스테인레스, 알루미늄, 플라스틱 등의 용기를 이용 하십시오. (아연 도금을 한 양철용기 등을 사용하지 마십시오.)