

“전 세계 15개국에서 같이 사용합니다”

액상수화제

다이몬파스트



다이아몬드와 같이 강력한 다이몬파스트!

유효성분 및 함량	비펜트린 4.7% + 노발루론 4.7%
독성구분	보통독성 / 어독성 1 급
포장단위	100ml × 50병 / 박스 200ml × 50병 / 박스 250ml × 40병 / 박스
제 조 원	아다마 막테심(이스라엘)
작용기작 코드	3a+15

제품특징

01

나방과 노린재 동시 방제

2가지 성분의 작용으로 나방부터 노린재까지 한번에 방제가 가능합니다.

02

빠른 효과와 알까지 죽이는 오랜지속 기간 까지

신경독의 작용으로 빠른 효과를 보이고, 알까지 죽여 오랜 지속효과를 보입니다.

03

비펜트린 최대 함량으로 노린재에 더 강력하게

콩 톱다리개미허리노린재 등록 기준으로 희석배수 당 비펜트린 함량이 가장 많아 노린재에 더욱 효과적 입니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감(단감)	톱다리개미허리노린재	발생초기 10일간격 경엽처리	8ml	수확 14일 전까지	3회 이내
감귤	파리류	발생초기 경엽처리		수확 21일 전까지	
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리		수확 2일 전까지	
	굴굴나방	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
고추(단고추류포함)	담배나방	다발생기 경엽처리		수확 21일 전까지	2회 이내
배	애모무늬잎말이나방	다발생기 경엽처리		수확 14일 전까지	
배추	파밤나방	다발생기 경엽처리		수확 21일 전까지	
복숭아	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	2회 이내
	씩덩나무노린재	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 21일 전까지	
	복숭아순나방	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
사과	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리	10ml	수확 14일 전까지	
	톱다리개미허리노린재	발생초 10일간격 경엽처리			



주요 병충해



사과 썩덩나무노린재



복숭아 복숭아순나방

작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
사과	머판(입상), 캐피즈(액상), 오리우스(유탁), 살루스(액상), 도마크(유), 반조(액상), 델란(수), 매카니(입상), 푸르겐(수), 살림꾼(액상), 해비치(입상), 실바코(수), 프린트(액상), 포리옥신(수), 스포프곤(수), 카디스(액상), 프로키온(액상), 트리후민(수), 삼공헥사코나졸(액상), 차단(액상), 에이플(입상), 살림꾼(입상), 농용신(수)	서머리(입상), 써쿼데드(액상), 쇼크(액상), 시나위(수), 가네마이트(액상), 카스케이드(분산성), 트랜스폼(액상), 모벤토(액상), 올스타(유), 빅스톤(입상), 주움(액상), 지존(액상)
복숭아	머판(입상), 캐피즈(액상), 반조(액상), 살루스(액상), 커스토디아(액상), 금모리(액상), 델란(수), 농용신(수), 용마루(수용), 프로키온(액상), 바이코(수), 에이플(입상), 유닉스(입상), 트리후민(수), 푸르겐(수), 한우물(수용)	서머리(입상), 빅카드(액상), 에스지블루밍(액상), 히어로(수), 트레본(수), 아크라마이트(액상), 가네마이트(액상)
감귤	커스토디아(액상), 반조(액상), 살루스(액상), 델란(수), 푸르겐(수), 다이센엠45(수), 썬업(입상), 벤레이트(수), 라피드(액상), 벨쿠트(수), 델란케이(수), 다코닐(수), 스포르곤(수), 안트라콜(수), 후론사이드(수), 조반니(유)	트리보(분액), 데시스(유), 산마루(수), 팔콘(수), 쇼크(액상), 피레스(유), 가네마이트(액상), 화스탁(유), 아크라마이트(액상), 주움(액상)
배	도마크(유), 머판(입상), 캐피즈(액상), 커스토디아(액상), 금모리(액상), 델란(수), 사천왕(수), 가벤대(수), 스포르곤(수), 카브리오(유), 프로키온(액상), 바이코(수), 유닉스(입상), 푸르겐(수), 후론사이드(수)	트리보(분액), 플레토라(액상), 렘페이지(유), 빅스톤(입상), 빅카드(액상), 천하평정(수), 화스탁(유), 히어로(유)
고추 (단고추류)	머판(입상), 캐피즈(액상), 오리우스(유탁), 살루스(액상), 도마크(유), 반조(액상), 델란(수), 명작(액상), 스포르곤(수), 자부신(수), 조반니(유), 베노밀(수), 실바코(수), 안트라콜(수), 후론사이드(수), 아그리마이신(수)	플레토라(액상), 위록(유), 빅카드(액상), 세티스(입상), 스트레이트(입상), 모벤토(액상), 트랜스폼(액상), 코니도(수), 인섹타(입상)
배추	반조포르테(액상), 선방(액상), 마금(액상), 일품(수), 명작(수), 포룸(수), 가스가민(액), 한우물(수), 방범대(수), 캐스팅(입상), 아그리마이신(수), 퀴텍(액상), 코사이드(입상)	위록(유), 서머리(입상), 플레토라(액상), 세티스(입상)
콩	도마크(유), 미라도(액상), 두아졸(유)	위록(유)

사용상 주의사항

1. 이 농약은 꿀벌에 잔류 독성이 강하므로 봄부터 꽃이 완전히 질 때까지는 사용하지 말아야하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오.
2. 이 농약은 누에에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의 하십시오.
3. 살포 전 후 살포기를 반드시 씻으십시오.