

입상수화제

# 인섹타



유효성분 및 함량	플로니카미드 10%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	100g × 100병 / 박스 250g × 40병 / 박스
작용기작 코드	29

진딧물이 내구역 안에 침범! 난 인섹타로 해결한다.

## 제품특징

01

### 저항성 진딧물에 효과적입니다.

진딧물의 구침을 마비시켜 섭식을 억제하는 작용 기작으로 기존 살충제에 저항성이 생긴 포장에도 작물 피해가 줄어듭니다.

02

### 약효가 오래 지속됩니다.

작물체 내로 빠르게 침투하여 약효를 나타내며, 오랜 기간동안 지속됩니다.

03

### 꿀벌에 안전성이 높습니다.

작물의 개화기에도 살포 가능하며, 천적 및 유용곤충에 대한 영향이 없습니다.

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	목화진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 3일 전까지	2회 이내
	복숭아혹진딧물				
강낭콩	아카시아진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	
갯개미자리 (세발나물)	목화진딧물			수확 7일 전까지	
		싸리수염진딧물	수확 14일 전까지		
고추 (단고추류포함)	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 2일 전까지	3회 이내
	목화진딧물			수확 7일 전까지	
고추(잎)					
근대	복숭아혹진딧물				2회 이내
금감(금굴)	조팝나무진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	
녹색꽃양배추 (브로콜리)	무테두리진딧물	다발생기 경엽처리			
			복숭아혹진딧물		



주요 병충해



고추 복숭아혹진딧물



사과 조팝나무진딧물

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준			
				사용시기	사용횟수		
다청채	목화진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	2회 이내		
단호박	진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 3일 전까지	3회 이내		
당귀 (잎, 뿌리)	복숭아혹진딧물		10g	수확 7일 전까지	2회 이내		
	목화진딧물		6.7g	수확 21일 전까지			
당근	복숭아혹진딧물		10g	수확 7일 전까지			
돌나물				수확 14일 전까지			
돼지감자	미국선녀벌레		발생초기 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	2회 이내	
들깨(잎)	목화진딧물		다발생기 경엽처리	6.7g	수확 14일 전까지	1회 이내	
	복숭아혹진딧물				수확 7일 전까지		
레몬(라임포함)	조팝나무진딧물		다발생기 경엽처리	10g	수확 30일 전까지	2회 이내	
로케트(루꼴라)	복숭아혹진딧물				수확 7일 전까지		
마(산약)	목화진딧물	수확 14일 전까지					
매실	갈색날개매미충	수확 7일 전까지			1회 이내		
	조팝나무진딧물	수확 7일 전까지			1회 이내		
머위	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리			10g	수확 7일 전까지	1회 이내
모과	조팝나무진딧물	발생초기 경엽처리			10g	수확 21일 전까지	3회 이내
	복숭아혹진딧물					다발생기 경엽처리	2회 이내
무화과	목화진딧물	발생초 경엽처리			6.7g	수확 7일 전까지	1회 이내
민들레		발생초기 경엽처리				수확 7일 전까지	2회 이내
보리	보리수염진딧물	발생초기 경엽처리	6.7g	수확 7일 전까지	2회 이내		

## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
복분자(라즈베리)	목화진딧물	다발생기 경엽처리	10g	수확 5일 전까지	2회 이내
부추	파혹진딧물	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지	
블루베리	담배가루이	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리			
비름	아카시아진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 14일 전까지	
비트	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	3회 이내
뽕나무(오디)	목화진딧물			수확 14일 전까지	2회 이내
사과	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
	사과혹진딧물				
산딸기	목화진딧물	발생초기 경엽처리	수확 7일 전까지	2회 이내	
살구	갈색날개매미충				
상추	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	수확 14일 전까지	1회 이내	
석류	목화진딧물				
		석류가루이	발생초기 7일간격 경엽처리	수확 21일 전까지	
순무	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 7일 전까지	
순무양배추(콜라비)					
시금치					
쑥갓	목화진딧물			수확 14일 전까지	
	복숭아혹진딧물				
아로니아	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리	10g	수확 3일 전까지	
	조팝나무진딧물				
아스파라거스	목화진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	2회 이내	
아욱	복숭아혹진딧물		10g		
	양미나리(샐러리)		목화진딧물		6.7g
			복숭아혹진딧물		수확 7일 전까지
양배추		10g			
양상추					
양앵두(체리)	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	
	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리			
어수리	어수리쌍꼬리진딧물	발생초기 경엽처리			



## | 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
오렌지	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리	10g	수확 30일 전까지	3회 이내
오미자	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	
옥수수	보리수염진딧물			수확 14일 전까지	
용과	목화진딧물	다발생기 경엽처리		수확 21일 전까지	
우엉	복숭아혹진딧물			수확 30일 전까지	
유자	조팝나무진딧물			수확 14일 전 까지	
유채	복숭아혹진딧물			수확 7일 전까지	
잇꽃(홍화)	우엉수염진딧물	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	
자두	갈색날개매미충				
차즈기	목화진딧물	다발생기 경엽처리	수확 14일 전까지		
참나물(파드득나물포함)					
치커리	복숭아혹진딧물			10g	
케일					
토란					
토란	목화진딧물	6.7g	수확 7일 전까지		
파	파혹진딧물	10g			
파세리(향미나리)	목화진딧물	6.7g			
	복숭아혹진딧물	10g			
패션프루트	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리	수확 3일 전까지		
호박	목화진딧물	6.7g			
	복숭아혹진딧물	10g			

### 사용상 주의사항

1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 아다마코리아(주)에서 제 공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 살포 전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.
3. 꿀벌은 습도가 높은 경우 활동성이 떨어지므로, 꿀벌과 동시에 사용할 경우에는 환 기 후 습도가 낮아진 후에 사용하는 것이 좋습니다.
4. 이 농약은 처리 직후 해충의 흡즙활동이 중단되나 치사되기까지는 다소 시간이 걸 릴 수 있으므로 중복살포하지 않도록 주의하여 주십시오.