

액상수화제

캐피즈

통 큰 살균제!! 캐피즈!!



유효성분 및 함량	캡탄 26.6% + 테부코나졸 6.6%
독성구분	보통독성 / 어독성 II 급
포장단위	200㎖ × 50병 / 박스 500㎖ × 20병 / 박스
제조 원	아다마 막테심(이스라엘)
작용기작 코드	카 + 사1

| 제품특징
01

두 가지 성분으로 보호 효과와 치료 효과까지

들어 오는 균은 막아주고, 들어 간 균은 잡아주는 두가지 효과를 보실 수 있습니다.

02

액상제형, 1,000배 희석 제품

액상 제형으로 더욱 편리하게 사용하실 수 있고, 수화제 보다 농작업 시 더욱 안전합니다.
약흔이 적습니다.

03

넓은 사용가능 시기

사용가능 시기가 넓어 병이 발생하기 전, 발생 된 후에도 사용하실 수 있습니다.
작물의 전생육기에 효과적으로 사용할 수 있습니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
감 (단감포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	20㎖	수확 14일 전까지	3회 이내	
	흰가루병	발병 초기부터 경엽처리				
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리				
고추 (단고추류포함)	역병	발병직전 10일간격 경엽처리		수확 3일 전까지		
	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리				
배	붉은별무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	20ℓ	수확 14일 전까지		
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리				



| 주요 병충해



배 붉은별무늬병




복숭아 잿빛무늬병




포도 탄저병

| 시험성적

- 고추 역병 (선문그린사이언스(주) 부설연구소 2015)



- 사과 갈색무늬병 (성보화학(주) 부설연구소 2014)



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
복숭아	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리	20㎖	수확 14일 전까지	3회 이내
사과		6월 상순부터 10일간격 경엽처리			4회 이내
수박(복수박포함)	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	20㎖	수확 14일 전까지	3회 이내
포도	탄저병				

캐피즈 액상수화제

| 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
사과	마판(입상), 살루스(액상), 반조(액상), 다이센엠-45(수), 델란(수), 매카니(유현), 스포르곤(수), 차단(액상), 안트라콜(수), 해비치(입상), 벨리스플러스(입상), 카브리오에이(유), 탄보험(수)	플레토라(액상), 다이몬파스트(액상), 위록(유제), 씨커데드(액상), 포위망(액상), 코모란(유제), 지존(액상), 라이몬(액상), 토리치(분산성), 모멘토(액상), 볼리암-타고(액상), 검객(수), 세티스(입상), 쇼크(액상), 시나워(수), 모스피란(수), 가네마이트(액상), 플레토라(액상), 알타코아(입상), 쇼크(액상), 가수나방방(입상), 애니충(액상), 빅스톤(입상), 집중마크(액상), 청실홍실(수), 명타자(유탁), 데스플러스(유), 아타라(입상), 앰풀리고(액상), 인시피오(액상), 슈퍼펀치(액상), 크레모아(분산)
고추 (단고추류)	두아졸(유), 미라도(액상), 오리우스(유탁), 프리퍼(유), 마금(액상), 반조(액상), 반조포르테(액상), 커스토디아(액상), 살루스(액상), 반조포르테(액상), 도마크(유), 듬지칸(액상), 매카니(유현), 방범대(수), 비반도(액상), 양콜(수), 젠프로(액상), 조르벡불씨(액상), 포리옥신(수), 푸름이(액상), 호리쿠어(유), 후론사이드(수), 오티바(액상), 일품(수)	다이몬파스트(액상), 서머리(입상), 위록(유), 코모란(유), 트리보(분액), 검객(수), 격파(입상), 기대찬(입상), 멀리게이트(입상), 런너(액상), 레이서(액상), 리무진(캡현), 바로확(유현), 백만장자(액), 섹큐어(액상), 송골매(수), 슈터(액상), 알타코아(입상), 오신(수), 지존(액상), 천하무적(수), 첨병(유), 코니도(수), 코드원(액상), 트랜스폼(액상), 포워드(액상), 히트런(입상), 모스피란(수), 빅카드(액상), 쇼크(액상), 애니충(액상), 인세타(입상), 플레토라(액상), 모스킬(액상), 포르티스브이(유), 제라진(유), 에이팜(유), 다트롤(유탁), 팬텀(입상), 섹큐어(액), 팔콘(수), 당찬(액상), 액설트(액상), 팡파레에스(입상)
복숭아	반조(액상), 살루스(액상), 커스토디아(액상), 나티보(액상), 부리마이신(수), 실바코(수), 아그리마이신(수), 한우물(수용), 일품(수), 만데스(액상), 바이코(수), 에이플(입상), 미리카트(액상), 성보싸이클린(수)	다이몬파스트(액상), 플레토라(액상), 노블레스(액상), 더스반(수), 라피탄(액), 리무진(캡현), 섹큐어(액상), 알타코아(입상), 트랜스폼(액상), 타이틀(입상), 포워드(액상), 쇼크(액상), 애니충(액상), 스토네트(입상)
배 (신고, 원양)	커스토디아(액상), 나티보(액상), 매카니(유현), 실바코(수), 아미스타(수), 한빛(액상), 다이센엠45(수), 만데스(액상), 바이코(수), 후론사이드(수), 미리카트(액상), 푸르겐(수)	다이몬파스트(액상), 트리보(분액), 플레토라(액상), 라이몬(액상), 모멘토(액상), 세티스(입상), 알타코아(입상), 지존(액상), 하이로(유), 굿원(액상), 노블레스(액상), 돌직구(액상), 리무진(캡현), 백만장자(액), 살비왕(액상), 선두플러스(입상), 세티스(입상), 스튜어드골드(액상), 알타코아(입상), 오신(수), 지존(액상), 코니도(수), 타이틀(입상), 모스피란(수), 빅카드(액상), 쇼크(액상), 스미치온(수), 애니충(액상)



| 작물별 혼용 자료

작물명	살균제	살충제
포도	커스토디아(액상), 마금(액상), 미라도(액상), 선방(액상), 에이플(입상), 칸투스(입상), 베노밀(수), 골고루(수), 균사리(수), 다이센엠45(수), 에스원(액상), 모아모아(수), 안트라콜(수)	
감 (단감포함)	도마크(유), 살루스(액상), 커스토디아(액상), 오리우스(유탁), 보가드(입상), 실바코(수), 아미스타탐(액상), 에이플(입상), 프린트(액상)	트리보(분액), 플레토라(액상), 데시스(유), 백승(액상), 오신(수), 킬총(액상), 트레본(수), 모벤토(액상), 승자(유탁), 총사리(유탁), 리무진(캡슐), 캡처(입상), 타이틀(입상), 프레바톤(수), 스타터(수), 섹큐어(액상)

사용상 주의사항

- 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을 때는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
- 병뚜껑을 열 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의 하십시오.
- 이 농약을 사용한 고춧잎을 식용목적으로 유통하거나 판매할 수 없습니다.
- 복숭아의 경우 잎이 완전히 경화되기 전에 처리하지 마시고, 오일 또는 전착제 성분이 함유된 제품과 혼용 또는 근접살포 하지 마십시오.
- 복숭아의 경우 복숭아 수확기 사용시 유기인계 살충제와 혼용 살포하면 약해의 우려가 있으므로 살포를 금하여 주십시오.
- 과수의 경우 꽃이 피어있는 기간 중에는 약해의 우려가 있으므로 살포를 금하여 주십시오.