



“전 세계 7개국에서 같이 사용합니다”

액제

발리간



잡초가 빨리간다! 빨리게! 발리간!

유효성분 및 함량	글루포시네이트암모늄 18%
독성구분	보통독성 / 어독성Ⅲ급
포장단위	300㎖ × 40병/박스 500㎖ × 20병/박스
작용기작 코드	H10

| 제품특징

- 01** 사람이나 가축에 대한 안전성이 우수합니다.
- 02** 토양 및 작물에 대한 안전성이 우수합니다.
- 03** 광범위한 제초 효과 및 난방제 잡초에 대한 효과가 뛰어납니다.
- 04** 잡초의 지상부만 죽여 경사지, 논둑의 토양 유실을 예방합니다.
- 05** 저항성 잡초(쇠뜨기, 망초 등)에 대한 방제 효과가 뛰어납니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약량	살포량
감(단감 포함)	일년생 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리	60㎖	300㎖	100ℓ
가지	일년생잡초	잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
감귤	일년생잡초 및 다년생잡초	잡초가 발생되었을 때 경엽처리			
강낭콩	일년생잡초	잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
고려엉겅퀴 (곤드레나물)		잡초생육기 발고랑(휴간) 잡초 경엽처리			
고추		잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
근대		잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			



| 주요 대상 잡초



쇠뜨기

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	1,000m ² (10a)당 사용량	
				약량	살포량
기장	일년생잡초	잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리	60mℓ	300mℓ	100ℓ
녹두					
동부					
두릅나무	일년생 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리			
들깨(잎)	일년생잡초	잡초생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
딸기		잡초생육기 발고랑(휴간) 잡초 경엽처리			
마늘					
무화과	일년생 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리			
배초향(방아)	일년생잡초	잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
부추					
비논경지	일년생잡초 및 다년생잡초	잡초가 발생되었을 때 경엽처리	133mℓ	800mℓ	
사과					
산딸기	일년생 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리	60mℓ	300mℓ	
상추	일년생잡초	잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
수박		잡초생육기 발고랑(휴간) 잡초 경엽처리			
수수		잡초생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
아로니아	일년생잡초 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리			
양앵두(체리)					
양파	일년생잡초	잡초생육기 발고랑(휴간) 잡초 경엽처리			
연		잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
오갈피	일년생잡초 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리			
완두	일년생잡초	잡초 생육기 발고랑(휴간) 경엽처리			
유채(잎)					
인삼					

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약량	살포량
작두콩	일년생잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리	60㎖	300㎖	100ℓ
조					
케일		잡초생육기 밭고랑(휴간) 잡초 경엽처리			
토마토					
팥	잡초생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리				
플럼코트	일년생잡초 및 다년생잡초	잡초생육기 경엽처리			
호두					
호박	일년생잡초	잡초 생육기 밭고랑(휴간) 경엽처리			

| 사용방법

1. 잡초 생육기 처리용 제초제이므로 잡초의 줄기가 목질화되기 전에 잡초 잎과 줄기에 골고루 묻도록 살포하십시오.
2. 잡초가 20~30cm정도로 자랐을 때 뿌리면 가장 효과적이며, 잡초가 30cm이상 커지거나 발생밀도가 높을 경우 약량을 증가하여 뿌리십시오. 단, 채소 및 밭작물 밭고랑(휴간) 처리인 경우 잡초가 10~15cm정도 자랐을 때 뿌리십시오.
3. 온도가 높고 날씨가 좋은 날, 이른 아침에 습도가 높을 때 약제를 살포하면 효과발현이 빨라지고 약효가 증진됩니다.
4. 다른 비선택성 제초제와 혼용하여 사용하면 제초효과가 떨어지므로 절대 섞어 쓰지 마십시오.

사용상 주의사항

1. 발리간 액제는 비선택성제초제이므로 뿌릴 때 약액이 농작물의 잎은 물론 어린 줄기나 과실 등에 직접 묻지 않도록 주의하십시오. 특히 밭작물의 생육기 헛골 처리나 논둑에 사용할 경우에는 분무기 노즐에 비산방지덮개를 부착하여 살포된 약액이 작물에 날아가 묻지 않도록 주의하세요.
2. 살포 후 6시간 이내에 비가 오면 제초 효과가 떨어질 수 있으므로 강우가 예상될 때는 살포하지 마십시오.