

입제

땅지기



흑색썩음균핵병 예방과 치료엔 지기 지기 땅지기!

유효성분 및 함량	테부코나졸 2%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	2 kg × 10봉 / 박스 3 kg × 8봉 / 박스
작용기작 코드	사1

제품특징

01

고추 탄저병 예방 약제

정식전 두둑처리로 초기 고추 탄저병을 예방합니다.

02

마늘, 양파 흑색썩음균핵병 예방 약제

정식 및 파종 전 토양 혼화처리를 통하여 보다 간편하게 흑색썩음균핵병을 예방합니다.

03

잔디 병해 방제용 입제

강우 시, 경사지 등에 편리하게 살포할 수 있습니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
고추 (단고추류포함)	탄저병	정식전 두둑처리	3kg/10a	정식기	1회 이내	
	흰비단병					
고추(잎)	탄저병					
땅콩	흰비단병	파종 전 토양처리		파종기		
마(산약)	뿌리썩음병	파종(정식) 전 토양처리	6kg/10a	파종·정식기		
마늘	흑색썩음균핵병	파종전 토양처리	4kg/10a	파종기		
상추(양상추포함)	균핵병	정식전 토양처리	3kg/10a	정식기		
양파	흑색썩음균핵병	파종전 혼화처리	4kg/10a			
잔디	동전마름병	발병초 10일간격 토양처리			발생초기	-



| 주요 병충해



고추 흰비단병



마늘 흑색썩음균핵병



잔디 동전마름병

| ADAMA Tips

땅지기 입제 고추 탄저병, 흰비단병 방제



사용상 주의사항

1. 이 농약은 물에 희석하지 마시고 사용방법에 따라 사용하십시오.
2. 종구파종전 또는 정식전 사용량을 지켜 토양 전면에 골고루 살포한 후 토양과 잘 섞어 주십시오.
3. 이 농약을 기준량 보다 많이 사용할 경우, 이어짓는 작물(벼, 콩, 오이, 토마토, 배추, 무 등)의 생육에 영향이 있을 수 있으니 반드시 기준사용량을 지켜 사용하십시오.