

수화제 **new**

터닝백



과수 화상병 포함, 각종 세균병에는 터닝백!

유효성분 및 함량	옥솔린산 20%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	200g × 50봉 / 박스 500g × 40봉 / 박스
작용기작 코드	가4

제품특징

01

세균성 전문 방제 약제

기존 항상제에 내성이 생긴 병원균에도 약효가 우수하며, 정균 및 살균 작용이 뛰어 납니다.

02

우수한 침투이행성 및 잔효성

퀴노리논계의 세균성 전문 약제로 세포분열 증식을 억제하며, 약효 지속 기간이 길어 예방 및 치료 효과가 뛰어 납니다.

03

안전한 약제

어패류, 꿀벌, 누에 등 유용 곤충에 영향이 적습니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감초	세균점무늬병	발병초 7일간격 경엽처리	20g	수확 14일 전까지	3회 이내
갯	무름병	발병직전부터 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	
강활	궤양병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 30일 전까지	
고추(단고추류포함)	세균점무늬병	발병초부터 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	
근대	무름병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
기장	세균줄무늬병			수확 7일 전까지	
냉이	무름병			수확 14일 전까지	
녹색꽃양배추 (브로콜리)		수확 21일 전까지		2회 이내	
담배	줄기속마름병	적심후 7일간격 경엽처리			수확 21일 전까지

| 주요 병충해



고추 세균점무늬병



마늘 무름병



배추 무름병



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
당근	무름병	발병초 7일간격 경엽처리	20g	수확 14일 전까지	3회 이내
	세균잎마름병	발생초기 경엽처리			
대추	세균열매썩음병	발병초 7일간격 경엽처리			
대황	무름병	발생초기 경엽처리		수확 45일 전까지	1회 이내
마늘		발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	4회 이내
무				수확 14일 전까지	2회 이내
방울다다기양배추	검은썩음병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내
	무름병	발병초 7일간격 경엽처리			
배	화상병	만개 5일후 경엽처리		수확 90일 전까지	2회 이내
배추	무름병	발병초기부터 7일간격 경엽처리		수확 3일 전까지	5회 이내
복숭아	세균구멍병	발생초기 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
부추	무름병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
비름				수확 14일 전까지	3회 이내
비트				수확 60일 전까지	2회 이내
사과	화상병	개화초기, 만개 5일후 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
산마늘	무름병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 30일 전까지	
삼주	세균썩음병	발병초기 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	
상추(양상추포함)	무름병				

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
생강	세균땅속줄기썩음병	발생초기 관주처리	20g(1ℓ/㎡)	파종(정식)기	1회 이내
	무름병	파종·정식기 관주처리	20g(3ℓ/㎡)		
수박	과일썩음병	발병초기부터 7일간격 경엽처리	20g	수확 14일 전까지	3회 이내
순무	무름병	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	
순무양배추(콜라비)		발병초 7일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
쌈추				수확 7일 전까지	2회 이내
쭈갓					3회 이내
아스파라거스		발생초기 경엽처리		수확 3일 전까지	1회 이내
양미나리(셀러리)				수확 7일 전까지	
양배추	검은썩음병	발병초 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
	무름병	발병초 7일간격 경엽처리			
양앵두(체리)	세균구멍병	만개기 10일 후부터 경엽처리		발병초기	-
에케베리아(모닝듀)	무름병	발생초기 경엽처리			
장미	세균성시들음병			삽목전 침지처리	
	뿌리혹병				
청경채	무름병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	3회 이내
콩(태광)	들불병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
	세균점무늬병				
파(쪽파포함)	무름병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일 전까지	1회 이내
향미나리(파슬리)		발생초기 경엽처리			2회 이내

사용상 주의사항


1. 고온 살포 시 약해를 일으킬 우려가 있으므로 사용에 주의하십시오.
2. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도 아다마코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
3. 살포 전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.



수화제

**화상병 개화기 방제
터닝백으로 함께 하세요!**

23년, 24년 아다마코리아 화상병 납품 현황



- 세균성 병해 전문 방제약제
- 우수한 침투이행성, 잔효성
- 유용 생물에 안전한 약제



옥솔린산 수화제 20%

Listen ▶ Learn ▶ Deliver



아다마에 대해 더 알고 싶으시면
스마트폰으로 스캔해 보세요~

