

입상수화제 **new**

갱스터



꿀벌에 안전하고, 약효가 오래가는 진딧물약. 갱스터!

유효성분 및 함량	플로니카미드 10%
독성구분	저독성 / 어독성 Ⅲ급
포장단위	100g × 50병 / 박스 250g × 40병 / 박스
작용기작 코드	29

| 제품특징

01

저항성 진딧물에 효과적입니다.

진딧물의 구침을 마비시켜 섭식을 억제하는 작용 기작으로 기존 살충제에 저항성이 생긴 포장에도 작물 피해가 줄어듭니다.

02

약효가 오래 지속됩니다.

작물체 내로 빠르게 침투하여 약효를 나타내며, 오랜 기간동안 지속됩니다.

03

꿀벌에 안전성이 높습니다.

작물의 개화기에도 살포 가능하며, 천적 및 유용곤충에 대한 영향이 없습니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가죽나무	복숭아가루진딧물	발생초기 경엽처리	10g	발생초기	-
가지	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리		6.7g	수확 3일 전까지
	목화진딧물				
강낭콩	아카시아진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	
갯개미자리(세발나물)	목화진딧물			수확 7일 전까지	
거베라				발생초기	-
고려엉겅퀴(곤드레나물)	싸리수염진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 14일 전까지	2회 이내
고사리	고사리진딧물	발생초기 경엽처리			
고추(단고추류포함)	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 2일 전까지	3회 이내
	목화진딧물				
고추(잎)					
근대	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	10g		2회 이내
금감(금굴)	조팝나무진딧물			수확 14일 전까지	
꽃기린	담배가루이				발생초기



| 주요 병충해



고추 복숭아혹진딧물



사과 조팝나무진딧물

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
나디아	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리	10g	수확 14일 전까지	2회 이내
녹색꽃양배추(브로콜리)	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리			
	무테두리진딧물				
눈개승마	조팝나무진딧물	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	
다청채	목화진딧물				
단호박	진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 3일 전까지	3회 이내
당귀(잎,뿌리)	복숭아혹진딧물		10g	수확 7일 전까지	2회 이내
	목화진딧물		6.7g		
당근	복숭아혹진딧물		10g	수확 7일 전까지	
독활(땅두릅)	미국선녀벌레				
	갈색날개매미충				
돌나물	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리			수확 14일 전까지
돼지감자	미국선녀벌레				
두릅나무			갈색날개매미충		
들깨(잎)	목화진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 7일 전까지	1회 이내
	복숭아혹진딧물				
땅콩	아카시아진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 30일 전까지	2회 이내
레몬(라임포함)	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리			
로케트(루꼴라)	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지	
망고					
마(산약)	갈색날개매미충			다발생기 경엽처리	
매실	조팝나무진딧물				
머위	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리			수확 7일 전까지
모과	조팝나무진딧물			발생초기 경엽처리	
	무	복숭아혹진딧물			다발생기 경엽처리

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
무화과	목화진딧물	발생초 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	1회 이내
미나리	꼬부랑진딧물	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지	2회 이내
민들레	목화진딧물		6.7g	수확 7일 전까지	
방울다다기양배추	복숭아혹진딧물		10g		3회 이내
배추	무테두리진딧물		6.7g		
보리	보리수염진딧물				
복분자(라즈베리)	목화진딧물	다발생기 경엽처리	10g	수확 5일 전까지	2회 이내
부추	파혹진딧물	발생초기 경엽처리		수확 14일 전까지	
블루베리	갈색날개매미충	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 3일 전까지	
	담배가루이				
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 14일 전까지	
비름	아카시아진딧물				
비트	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	3회 이내
뽕나무(오디)	목화진딧물				수확 14일 전까지
사과	사과혹진딧물	다발생기 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
	조팝나무진딧물				
산딸기	목화진딧물	발생초기 경엽처리		수확 5일 전까지	2회 이내
산초				수확 14일 전까지	3회 이내
살구	갈색날개매미충	다발생기 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
상추(양상추 포함)	복숭아혹진딧물				
석류	석류가루이	발생초기 7일간격 경엽처리		수확 21일 전까지	
	목화진딧물				
순무	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리		수확 7일 전까지	
순무양배추(콜라비)				수확 14일 전까지	
시금치				수확 7일 전까지	
쑥				수확 14일 전까지	
쑥갓	미국선녀벌레	발생초기 경엽처리	6.7g	수확 7일 전까지	
	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리			
	목화진딧물				
쌈바귀	쌈바귀수염진딧물	발생초기 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	-
아로니아	갈색날개매미충			다발생기 경엽처리	
	조팝나무진딧물				
아스파라거스	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	
	목화진딧물				
아욱	복숭아혹진딧물	발생초기 경엽처리	발생초기		
안개초					
양미나리(셀러리)	목화진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 7일 전까지	2회 이내
양배추	복숭아혹진딧물				
양앵두(체리)	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리	10g		



| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
양앵두(체리)	미국선녀벌레	다발생기 경엽처리	10g	수확 7일 전까지	2회 이내
어수리	목화진딧물	발생초기 경엽처리	6.7g		
	복숭아혹진딧물				
	어수리쌍꼬리진딧물				
오렌지	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리	10g	수확 30일 전까지	3회 이내
오미자	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
옥수수	보리수염진딧물			수확 14일 전까지	
용과	목화진딧물	다발생기 경엽처리		수확 21일 전까지	
우엉	복숭아혹진딧물			수확 30일 전까지	
유자	애넓적밀빠진벌레	발생초기 경엽처리		수확 30일 전까지	
	조팝나무진딧물	다발생기 경엽처리		수확 14일 전까지	
유채	복숭아혹진딧물				
유채(잎)	무테두리진딧물	발생초기 경엽처리		수확 7일 전까지	
잇꽃(홍화)	우엉수염진딧물				
자두	갈색날개매미충				
차즈기	목화진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 14일 전까지	2회 이내
참나물(파드득나물포함)					
치커리					
케일	복숭아혹진딧물	10g	수확 7일 전까지		
토란	목화진딧물	6.7g			
	복숭아혹진딧물	10g			
파	파혹진딧물			발생초기 경엽처리	6.7g
파세리(항미나리)	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리			
	목화진딧물				
패션프루트	갈색날개매미충	발생초기 경엽처리	10g	발생초기	-
팽나무	팽나무알락진딧물				
호박	복숭아혹진딧물	다발생기 경엽처리	6.7g	수확 3일 전까지	3회 이내
	목화진딧물				

사용상 주의사항

1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해 년도에 아다마코리아(주)에서 제 공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 살포 전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.
3. 꿀벌은 습도가 높은 경우 활동성이 떨어지므로, 꿀벌과 동시에 사용할 경우에는 환 기 후 습도가 낮아진 후에 사용하는 것이 좋습니다.
4. 이 농약은 처리 직후 해충의 흡즙활동이 중단되나 치사되기까지는 다소 시간이 걸 릴 수 있으므로 중복살포하지 않도록 주의하여 주십시오.