

유제 **new**

백전노장



응애는 물론, 다양한 해충의 노련한 장수! 백전노장!

유효성분 및 함량	아바멕틴 1.8%
독성구분	보통독성 / 어독성 I 급
포장단위	100mℓ × 50병 / 박스 200mℓ × 50병 / 박스
작용기작 코드	6

| 제품특징

- 01** **다양한 해충을 한번에 동시방제**
 응애, 총채벌레, 잎굴파리, 배나무이 등 방제효과가 우수합니다.
- 02** **약효가 빠르고, 정확한 약효를 발휘**
 침달성이 뛰어나 숨어있는 해충까지 방제합니다.
- 03** **토양미생물에서 추출한 천연성분의 유도체로 환경에 안전**
 접촉독 및 소화중독에 의한 우수한 살충효과를 나타내며, 빠르게 분해되어 작물 잔류기간이 짧습니다.

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
가지	꽃노랑총채벌레	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	수확 3일 전까지	3회 이내
	아메리카잎굴파리				
	파총채벌레				
	차응애				
	점박이응애				
감귤	파리류			수확 7일 전까지	
	굴응애			수확 14일 전까지	
감초	응애류				
갯	완두굴파리				수확 7일 전까지
강낭콩	차응애				
	점박이응애				
갯기름나물(방풍)					



주요 병충해



점박이응애



아메리카잎굴파리



꽃노랑총채벌레



꼬마배나무이

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
갯기름나물(방풍)	차응애	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
갯기름나물(식방풍)	파총채벌레				
거베라	뿌리응애	발생초기 관주처리	6.7mℓ(1ℓ/m ²)	발생초기	-
	아메리카잎굴파리				
	오이총채벌레				
겨자채	아메리카잎굴파리	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
곤달비	차응애				
공심채	꽃노랑총채벌레			수확 3일 전까지	
구기자	구기자혹응애				
국화	점박이응애			발생초기	-
근대	오이총채벌레			수확 14일 전까지	2회 이내
	차응애				
금감(금굴)	굴응애			발생초기	-
꽃기린	꽃노랑총채벌레				
	차응애			수확 7일 전까지	2회 이내
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워포함)	파총채벌레				
	아메리카잎굴파리			발생초기	-
나디아	점박이응애				
난	난총채벌레			수확 7일 전까지	2회 이내
녹두	차응애				
다채(비타민)	차먼지응애	수확 7일 전까지	2회 이내		
당근	아메리카잎굴파리				

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
대추	점박이응애	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	수확 21일 전까지	2회 이내	
	갈색날개매미충					
더덕	점박이응애			차응애		수확 7일 전까지
	차응애					
돌나물	꽃노랑총채벌레			수확 14일 전까지		
동부	차응애					
들깨(씨)	점박이응애			수확 3일 전까지		
	차응애					
들깨(잎)	아메리카잎굴파리			수확 2일 전까지		
	점박이응애					
	차응애					
딸기	점박이응애			수확 7일 전까지		
땅콩	꽃노랑총채벌레					
라즈베리	점박이응애			수확 3일 전까지		
레몬(라임포함)	볼록총채벌레					
만삼	점박이응애			수확 14일 전까지		
망고	볼록총채벌레					
매실	갈색날개매미충			수확 7일 전까지		
	점박이응애					
	초록애매미충					
머위	점박이응애	수확 14일 전까지				
	차응애					
멜론	파총채벌레	수확 7일 전까지				
	차응애					
	점박이응애					
	아메리카잎굴파리					
무	점박이응애	수확 7일 전까지				
	파총채벌레					
	아메리카잎굴파리					
무화과	응애	2회 이내				

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
미나리	점박이응애	발생초기 경엽처리	6.7ml	수확 14일 전까지	2회 이내
배				꼬마배나무이	수확 7일 전까지
배초향(방아)	차응애			수확 3일 전까지	
배추	완두굴파리				수확 7일 전까지
	파총채벌레				
복분자	볼록총채벌레			수확 3일 전까지	
	점박이응애				
	갈색날개매미충				
부추	차응애			수확 7일 전까지	
	파총채벌레				
블랙베리	볼록총채벌레			수확 3일 전까지	
	점박이응애				
블루베리	볼록총채벌레			수확 7일 전까지	
	갈색날개매미충				
비름	흰띠명나방			수확 3일 전까지	
비트	점박이응애			수확 7일 전까지	
뽕나무(오디)	갈색날개매미충			수확 3일 전까지	
	차응애				
사과	응애(점박이응애,사과응애)	수확 7일 전까지	3회 이내		
	사과유리나방				
산딸기	갈색날개매미충	수확 3일 전까지			
	차응애				
산마늘(명이나물)	파총채벌레	수확 7일 전까지	2회 이내		
살구	점박이응애	수확 14일 전까지			
	갈색날개매미충				
상추 (양상추 포함)	점박이응애	수확 7일 전까지			
	아메리카잎굴파리				
소나무	소나무재선충	1월~2월 나무주사	발생초기	1회 이내	
소나무류	솔나방	월동유충 활동기 나무주사			
쇠무릎(우슬)	흰띠명나방	발생초기 경엽처리	6.7ml	수확 14일 전까지	2회 이내



백진노장 유제

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준														
				사용시기	사용횟수													
수국	차응애	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	발생초기	-													
수박	목화바둑명나방			수확 10일 전까지	3회 이내													
순무	아메리카잎굴파리			2회 이내	수확 7일 전까지	3회 이내												
	파총채벌레																	
순무양배추(콜라비)	아메리카잎굴파리						2회 이내	수확 7일 전까지	3회 이내									
	파총채벌레																	
시금치	아메리카잎굴파리									2회 이내	수확 7일 전까지	3회 이내						
	시금치꽃파리																	
신선초	차응애												3회 이내	수확 3일 전까지	2회 이내			
	점박이응애																	
쑥갓	아메리카잎굴파리															3회 이내	수확 3일 전까지	2회 이내
	파총채벌레																	
아로니아	갈색날개매미충			3회 이내	수확 3일 전까지	2회 이내												
	점박이응애																	
	볼록총채벌레																	
아스파라거스	파총채벌레						3회 이내	수확 7일 전까지	2회 이내									
양미나리(셀러리)	차응애									2회 이내	수확 7일 전까지	3회 이내						
	아메리카잎굴파리																	
	꽃노랑총채벌레																	
양배추	파총채벌레												2회 이내	수확 14일 전까지	3회 이내			
	아메리카잎굴파리																	
양양두(체리)	갈색날개매미충															2회 이내	수확 14일 전까지	3회 이내
	점박이응애																	
어수리	차응애	2회 이내	수확 7일 전까지	3회 이내														
여주	꽃노랑총채벌레																	
오렌지	볼록총채벌레				2회 이내	수확 14일 전까지	3회 이내											
오미자	점박이응애																	
	볼록총채벌레																	
	갈색날개매미충																	
오이	아메리카잎굴파리							2회 이내	수확 3일 전까지	3회 이내								
옥수수	차응애										수확 7일 전까지							

| 적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
옥수수	기장테두리진딧물	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내	
우엉	차응애			수확 21일 전까지	1회 이내	
유자	볼록총채벌레			수확 7일 전까지	3회 이내	
유채(잎)	아메리카잎굴파리				2회 이내	
익소라	점박이응애			발생초기	-	
자두				갈색날개매미충	수확 14일 전까지	2회 이내
장미	짚레수염진딧물			발생초기	-	
	점박이응애					
	꽃노랑총채벌레					
지황	점박이응애			수확 21일 전까지	2회 이내	
차	오누키애매미충			수확 7일 전까지	1회 이내	
차즈기	점박이응애				2회 이내	
				차응애	3회 이내	
착색단고추	점박이응애			발생초기	-	
참나물(파드득나물)						2회 이내
참두릅						3회 이내
참외						2회 이내
천궁	파총채벌레			수확 2일 전까지	2회 이내	
청경채	아메리카잎굴파리			수확 45일 전까지	1회 이내	
취나물				차응애	수확 7일 전까지	2회 이내
치커리	점박이응애			발생초기	-	
카네이션	꽃노랑총채벌레					
케일	아메리카잎굴파리			수확 7일 전까지	2회 이내	
	파총채벌레					
콩	점박이응애			수확 14일 전까지	2회 이내	
	차응애					
큰조롱(백수오)	점박이응애			수확 7일 전까지	1회 이내	
토란						
파(쪽파포함)	파총채벌레	수확 7일 전까지	1회 이내			



백진노장 유제

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용시기 및 방법	물20ℓ(1말)당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
항미나리(파슬리)	차응애	발생초기 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일 전까지	2회 이내
호박 (단호박포함)	파총채벌레			수확 3일 전까지	3회 이내
	차응애				
	점박이응애				
	아메리카잎굴파리				
호프	점박이응애			수확 14일 전까지	2회 이내
홍화	완두굴파리			수확 7일 전까지	3회 이내
	점박이응애			수확 14일 전까지	2회 이내
황기	점박이응애	수확 14일 전까지	2회 이내		

사용상
주의사항

1. 이 농약을 다른 농약과 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 아다마코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
2. 응애류는 번식력이 강하여 밀도가 높으면 방제가 곤란하기 때문에 발생초기에 한 잎당 2~3마리 정도 발생시 약액이 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
3. 소나무재선충은 1~2월 지상 50cm 높이에 드릴 등을 이용해 수관부까지 구멍을 뚫고 홍고직경 cm당 원액 1mℓ씩 흘러 들어가게 나무주사합니다.
4. 살포전 후 살포기를 반드시 씻으십시오.